Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie)
Año 2016 | Vol. 21 | N° 2 | Pág. 1-569 | ISSN 0325-3856

AVES ARGENTINAS: DESCRIPCIÓN, COMPORTAMIENTO, REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Mimidae a Passeridae

Actualizado en Septiembre de 2016







Martín R. de la Peña

Colaborador: Sergio Salvador

Dibujos de nidos: Elda Krüger

Museo Provincial
de Ciencias Naturales
«Florentino Ameghino»

CALANDRIAS

FAMILIA:MIMIDAE

Aves de pico y cola largos. Alas cortas.

Se alimentan de insectos, gusanos, frutos.

Construyen el nido en los árboles o en los arbustos, a baja altura. Ponen de 3 a 5 huevos.

Frecuentan praderas, sabanas, estepas, orillas de bosques, parques, áreas rurales y urbanas, prepuna, serranías.

TENCA *Mimus thenca* (Molina, 1782)

DESCRIPCIÓN
Largo:
Coloración. Pico y patas negros. Iris amarillo-oliva.
Peso: Cody (2005): 66 g
Dorsal marrón clara. Cabeza rayada de negro. Cejas blancas. Garganta blanca, orillada de negruzco. Ventral gris. Abdomen blanco sucio. Flancos marrónes amarillentos con rayas longitudinales negras.
Alas pardas oscuras con las primarias, las secundarias y las cubiertas bordeadas de blanco.
Cola larga, escalonada. Plumas centrales negras. Las externas terminadas en una mancha blanca.



COMPORTAMIENTO

Alimentación
Se alimenta de insectos, larvas, frutos, granos.

HÁBITAT
Laderas de cerros, arbustales.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Neuquén.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

El nido tiene forma de tazón. Es construido con palitos, internamente lanas, musgos.

Matarasso y Seró López (2008). Las Ovejas, dpto. Minas, Neuquén, 2 nidos. Uno parasitado por *Molothrus bonariensis.*

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, verdes claros con pintas castañas y grises distribuidas por toda la superficie.



Medidas
Goodall et al. (1946): 29,4 a 32,6 x 19,8 a 21,1 (N= 14)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Amplias cejas blancas. Línea ocular oscura y línea malar negra.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Mimus thenca (Molina, 1782)en el oeste de Neuquén.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Endémico en región central de Chile y Neuquén (Argentina) cerca del límite con Chile.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Neuquén
Citas: Cusano y Cusano (2015); Matarasso (2007); Matarasso y Seró López (2008); Veiga y Perez (2014)

CALANDRIA MORA *Mimus patagonicus* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Burlón patagónico. Calandria gris. Calandria chica. Calandria grande. Calandria de la Patagonia. Calandria de la sierra. Quererinca. Pájaro imitador.

DESCRIPCIÓN
Largo: 22,5 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 1 80,0 g; Contreras (1975): N= 11 (?) X= 57,82 g (Rango 53,8 a 64,2); Salvador (1988): N= 2 (?) 54,0 y 55,0; N= 3 (?) X= 45,2 g (Rango 44,5 a 46,0); Salvador (1990a): N= 1 (M) 52,3 g, N= 1 (H) 62,5 g; Navas y Bó (2000): N= 22 (M) X= 52,4 g (Rango 44,4 a 61,8); Camperi (1992c): N= 7 (M) X= 55,3 g (Rango 52,0 a 57,0); N= 1 (H) 50,0 g; Camperi y Darrieu (2005): N= 3 (M) 66,0, 67,6 y 68,5 g, N= 2 (H) 61,0 y 64,0 g; Salvador (2014a) N= 12 (?) X= 54,8 g (Rango 48,6 a 58,5)
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Dorsal gris pardusca uniforme. Cejas blanquecinas. Ventral ocrácea. Alas pardas con las secundarias orilladas de blanquecino. Cubiertas alares con ápice blanco. Cola negra con punta blanca.

COMPORTAMIENTO
Anda sola, en pareja o en grupos familiares. Es de hábitos terrícolas y arborícolas. Camina y corre detrás de insectos.
Su canto es variado y musical, más delicado que el de la Calandria grande. También imita voces de otras especies, tanto de aves como de mamíferos.

Alimentación
Christie et al. (2004).**Insectos.**
Haene et al. (2007). **Vegetales:**Fruto*Berberis buxifolia.*
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:**Fruto*Condalia microphylla,Cotoneaster* sp.*,Pyracantha coccinea,Trichocereus pasacana*.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:**Semilla*Chenopodium* sp.*,Panicum miliaceum,Sorghum* sp.*,Zea mays.* Fruto*Cestrum* parqui. **Insectos:** Blattaria. Coleoptera (Carabidae, Cucurlionidae, Scarabaeidae). Hemiptera. Hymenoptera (Formicidae, Vespidae). Lepidoptera (orugas, crisálidas, polillas).Orthoptera (Acridiidae, Gryllidae, Gryllotalpidae). **Artrópodos:** Miriápodos (ciempiés).**Arácnidos:**arañas, escorpiones. **Crustáceos:** Isópodos terrestres.

De la Peña (2010c). **Insectos.**

HÁBITAT
Montes xerófilos, jarillales, cardonales, estepas patagónicas y andinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Tucumán, Mendoza, San Juan, Córdoba, Buenos Aires, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N



El nido tiene forma de tazón. Es construido con palitos. Internamente raicillas, pastos, lanas, hilos. Sostenido en arbustos.Expuesto. Elaborado.

Reed (1913). Mendoza, parasitado por *Molothrus bonariensis*;
Friedmann (1929). Tucumán, Girard parasitado por *Molothrus bonariensis*;
Renard (1933). Buenos Aires, parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Nores e Yzurieta (1975). Córdoba, parasitado por *Molothrus bonariensis*;
Masramón (1975). Nidifica en San Luis.
Friedmann et al. (1977). Río Negro, Pemberton parasitado por *Molothrus bonariensis*;
Friedmann et al. (1977). Buenos Aires, Narosky parasitado por *Molothrus bonariensis*;
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre noviembre y enero.
Salvador y Salvador (1984). Potrerillos, dpto. Luján, Mendoza, 21-11-1982, 1 huevo propio y 1 de *Molothrus bonariensis*; Tanti, dpto. Punilla, Córdoba, 16-10-1983, 3 huevos propios y 1 de *Molothrus bonariensis;* Pedro Luro, pdo. Villarino, Buenos Aires, 23-11-1983, 3 huevos propios y 1 de *Molothrus bonariensis*; Viedma, dpto. A. Alsina, Río Negro, 16 y 22-11-1983, 4 nidos parasitados: 2 huevos propios y 3 de *Molothrus bonariensis*, 3 pichones de *Molothrus bonariensis*, 2 pichones de *Molothrus bonariensis*, 3 huevos propios y 2 pichones de *Molothrus bonariensis*; Arroyo Verde, dpto. Biedma, Chubut, 20-11-1983, 3 nidos parasitados: 4 huevos propios y 1 de *Molothrus bonariensis,* 4 huevos propios y 1 de *Molothrus bonariensis*, sin huevos propios y 2 de *Molothrus bonariensis.*
Albrieu et al. (2004). Estuario del río Gallegos, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, nidifica en la primavera.
Salvador y Bodrati (2014a). Salina de la Espuma, pdo. J. B. Casá, Salinas de Piedras, pdo. La Colorada Chica, pdo. y Guadal Amarillo, pdo. Buenos Aires, A. Di Giacomo localizó nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Bodrati (2011). Humahuaca, dpto. Humahuaca, Jujuy, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
De la Peña (2013c). Península Valdés, dpto. Biedma, Chubut, 26-11-1976, nido en arbusto con 2 huevos; Humahuaca, dpto. Humahuaca, Jujuy, 23-02-1979, sin postura; San Juan, dpto. Capital, San Juan, 14-01-1982, en arbusto, 4 huevos; Talacasto, dpto. Ullún, San Juan, 15-01-1982, 2 nidos, uno con 4 huevos y el otro con 5.



Medidas: Diámetro total: de 21 a 24 cm. Diámetro interno: de 9 a 10 cm. Profundidad: de 4 a 6 cm. Alto: de 12 a 17 cm.



San Juan.14-01-1982

Huevos

Pone 4 ó 5 huevos, ovoidales, verdosos o verde azulados, con pintas castañas y grises distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.



Medidas

Smyth (1928): 25,5 a 27,5 x 19,5 a 20,5
De la Peña (2013c): 24,6 a 27,5 x 18,3 a 19,6 X= 26,3 x 18,8 (N= 15)

Pesos


De la Peña (2013c): cáscara 0,247 a 0,310 X= 0,288 (N= 15)

Otros

Salvador en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Salvador y Salvador (1984). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Dorsal parda uniforme. Ventral ocráceo. Alas con blanco en la punta de las cubiertas y ribetes en las secundarias. Cola negra con punta blanca. Diferenciarla de la Calandria grande.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Mimus patagonicus (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837) desde Jujuy y Salta por el oeste y Córdoba, La Pampa y sur de Buenos Aires hasta Santa Cruz. En otoño migra al norte. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica.Argentina, Chile. Islas Malvinas; Georgias y Sandwich del sur.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Camperi (1992c); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Gochfeld (1978b); Morici (2014); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Zapata (1998)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Salvador (1990a)

Chubut
Citas: Bó (1958); Camperi (1998); Daciuk (1977c); Darrieu y Camperi 2000 (2001); De la Peña (2013c); Gochfeld (1978); Sainz-Trápaga (2014); Straneck (1990a); Vidoz (1995); Vuilleumier (1993)

Observaciones: De la Peña (Península Valdés, 05-02-1972; Puerto Madryn, 27-11-2000; Gaiman, 30-11-2000)

Córdoba
Citas: Brandolín et al. (2007); Castellanos (1934); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1975); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas:Soriano Grandes et al. (2014)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Earnshawy Earnshaw (2000a); Salvadory Bodrati (2011); Smyth (1928)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Navas y Bó (1986b); Noriega et al. (1993); Pereyra (1937b); Salvador y Bodrati (2013a); Siegenthaler (1984); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Puelches, 22-01-1972)

La Rioja
Citas:Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1907, 1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980a); Contreras y Roig (1976); Darrieu y Segura (2015); Gómez (2006); Gómez y Capllonch (2009); Jahn et al. (2009); López de Casenave (2001); López de Casenave et al. (2008); Lucero (2013f); Marone (1992a); Martínez et al. (1997a); Navas y Bó (2000); Pereyra (1927e); Salvador y Salvador (1984); Sosa (1995d); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (Villavicencio, 12-01-1982; Malargüe, 14-10-2004)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (2004); Contreras (1975, 1976, 1977b); Gorgoglione (2005); Hellmayr (1934); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (Zapala, 27-01-1976; Neuquén, 20-11-1998)

Río Negro
Citas:Becerra Serial y Grigera (2005); Bettinelli y Chebez (1986); Camperi (1998); Camperi y Darrieu (2005); Casas (1992a); Christie et al. (2004); Contreras (1975); Gelain (2001, 2012b); Gelain y Tolosa (2011); Gochfeld (1978); Llanos et al. (2005, 2011); Navas y Bó (1990); Paz Barreto (1997b); Pérezy Petracci (1998)

Observaciones: De la Peña (San Antonio Oeste, 03-11-1979; Chichinales, 28-11-1998)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Camperi y Darrieu (2004); Contreras y Roig (1976); De la Peña (2013c); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Lucero (2013f, 2013i); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (2000)

San Luis
Citas: Casares (1944b); Masramón (1975, 1983); Nellar Romanella (1993); Salvador (1988); Salvador y Bodrati (2013a)

Observaciones: De la Peña (Salinas del Bebedero, dpto. La Capital, 13-10-2004)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Burmeister (1890); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2009); De Lucca y Saggese (1992); Humphrey et al. (1985); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Salvadori (1900); Stone (1928); Zapata (1967)

Observaciones: De la Peña (Puerto Deseado, dpto. Deseado, 07-11-1979)

Santa Fe
Citas: Wilson(1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991); Salvador (1988)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970)

Tucumán
Ciutas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz et al. (2013c)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

CALANDRIA GRANDE *Mimus saturninus* (Lichtenstein, 1823)

Otros nombres: Burlón de cejas blancas. Calandria blanca. Calandria común. Calandria pampa. Calandria de monte. Cháuca.

DESCRIPCIÓN

Largo: 25 cm.

Peso: Fiora (1934): N= 2 X= 60,0 g; Camperi (1992a): N= 1 (M) 81,5 g, N= m1 (H) 74,3 g; Camperi (1992c): N= 1 (M) 85,0 g; N= 1 (H) 69,0 g; Camperi (1992a): N= 2 (M) 47,2 y 50,7 g; Di Giacomo (2005h): N= 1 67,0 g; Salvador (2014a): N= 21 (?) X= 77,7 g (Rango 70,3 a 82,5); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 74,0 y 75,0 g

Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo oliváceo o amarillento.

Dorsal parda con leve estriado pardo oscuro. Rabadilla canela. Cejas y parte ventral blancas. Alas pardas oscuras. Ápice de las cubiertas alares blanco. Fino ribete blanquecino en las secundarias. Cola parda oscura con ancha punta blanca, excepto en el par central.

COMPORTAMIENTO

El canto es variado, imita las voces de otras aves e incluso voces de otros animales. Suele cantar desde una rama, postes, cables, alambrados, expuesta, y acompaña sus cantos con cortos saltos hacia arriba y luego se deja caer otra vez en su percha sin interrumpir el canto. A veces planea unos metros y se posa. Puede estar varios minutos realizando esta maniobra.

Es de hábitos terrícolas y arborícolas. Camina y corre detrás de insectos.

De la Peña (2011a). Recorre desde el suelo hasta los 7 m de altura buscando alimento, en ramas y follaje.Traga enteros los frutos de Tala y Curupí.

Alimentación

De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Fruto Chili (*Lycium americanum*), Lantana (*Lantana camara*).

Friedmann (1927).**Insectos:**Coleópteros. Langostas.

Aravena (1928).**Vegetales:** semillas. **Insectos:** Coleópteros (Curculiónidos). Hormigas. **Otros:** Piedritas.

Zotta (1932).**Insectos:**Coleópteros (Chrysomelidae, Cerambycidae). Himenópteros.Orthópteros.

Liebermann (1935). **Insectos:**Langostas.

Zotta (1936g).**Insectos:**Coleópteros (Curculiónidae,Phaenus,Ciclocephala).

Zotta (1940).**Vegetales:** Semillas*Acacia caven.* **Insectos:**Coleópteros (Curculiónidos). **Otros:**Minerales.

Olrog (1956a).**Insectos.**

Martínez et al. (1975).**Crustáceos:**Isopoda.

Baliño (1984). **Vegetales:** Fruto *Melia azedarach.*

Mason (1985). **Insectos:**Curculionidae. Gryllidae. Gryllotalpidae. Lumbricidae. Scarabaeidae.

Klimaitis (1993). **Insectos:**Coleópteros.**Crustáceos:** Isopoda (Bicho bolita). **Vegetales**.

Roitman et al. (1997).**Vegetales:** Pétalo *Myrrhinum atropurpureum.*

De la Peña y Pensiero (2003).**Vegetales:** Fruto *Celtis tala, Morus alba.*

Di Giacomo (2005h). **Vegetales:** Fruto *Celtis iguanea, Cissampelos pareira, Lycium moronguii, Schinus fasciculata,*

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** frutos, semillas *Panicum mileaceum, Pyracantha coccinea, Schinus molle,* Solanácea. Semilla *Chenopodium* sp *Sorghum* sp., *Sapium haematospermum, Triticum aestivum.* **Insectos:** Blattaria. Coleoptera (Curculionidae, Elateridae, Prionidae, Scarabaeidae, no identificado). Diptera (Tabanidae). Hemiptera (Pentatomidae, no identificado). Hymenoptera (Formicidae, Vespidae). Lepidoptera (orugas, crisálidas, polillas). Orthoptera (Acridiidae, Gryllidae). **Arácnidos:** arañas. **Crustáceos:** Isópodos terrestres.

Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Isoptera (termitas aladas)

De la Peña (2011a). **Vegetales:** Frutos *Asparagus densiflorus, Celtis ehrenbergiana, Zanthoxylum coco, Ficus carica*, *Ligustrum lucidum, Morus alba, Muehlenbeckia sagittifolia, Pyracantha angustifolia, Rubus ulmifolius, Sapium haematospermum*, *Styphnolobium japonicum,* semilla arilada *Passiflora morifolia, Passiflora caerulea.***Insectos:** Hormigas (*Atta* sp.). Langostas. **Reptiles:** Víbora ciega (*Amphisbaena* sp.*).* **Otros:** Grasa animal.

SalvadoryBodrati (2013c). **Anfibios:** *Hyl*a sp. **Reptiles:** *Amphisbaena darwini*

Salvador (2013e). **Insectos:** Hormigas Isaú (*Atta vollenweideri*).

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Praderas arboladas, sabanas, matorrales, orillas de bosques, parques, poblaciones.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Tucumán, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N



El nido tiene forma de tazón. Es construido con palitos con y sin espinas. Internamente raicillas, pajitas, cerdas, hilos. Es sostenido en arbustos, árboles, matorrales, construcciones.Expuesto. Elaborado.

Hudson (1874). Buenos Airesnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Barrows (1883). Entre Ríos nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Miller (1917). Salta nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Dinelli (1918b). Tucumán, nidifica desde setiembre a enero. Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, nidifica.
Smyth (1928). Esparasitado por *Molothrus bonariensis*.
Friedmann (1929). Tucumán, nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Renard (1933).Puerto Belgrano, pdo. Coronel de Marina Leonardo Rosales, Buenos Aires. Nido con un pichón de *Molothrus bonariensis*.
Pereyra (1933b).Río Luján, pdo. Pilar, Buenos Aires, 2 nidos con 4 y 5 huevos cada uno.
Pereyra (1938b). Río Luján, Zelaya, pdo. Pilar, Buenos Aires, varios nidos.
Zuberbühler (1956a). Junín, pdo. Junín, Buenos Aires, nido en el suelo.
Friedmann et al. (1977). Entre Ríos, Narosky nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Wilson (1979). Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes, nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Salvador (1983b). Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 1979 a 1983, el 86,9 % (40 de 46) de los nidos estaban parasitados por *Molothrus bonariensis*.
Fraga (1983c). Estancia La Candelaria, pdo. Lobos, Buenos Aires. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador (1984c). Villa María, dpto. Gral. San Martín, Córdoba, entre 1979 y 1984 se localizaron 92 nidos.
Salvador y Salvador (1984). Unión, dpto. Gobernador Dupuy, San Luis, 24-11-1982, 2 pichones propios y 3 huevos de *Molothrus bonariensis*; Humahuaca, dpto. Humahuaca, Jujuy, 25-02-1983, una pareja alimentaba a un juvenil de *Molothrus bonariensis*.
Mason (1986). Buenos Aires, nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando.Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, un nido.
Maceda et al. (2001).La Pampa, es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 2 nidos en octubre y noviembre.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre setiembre y enero. Se estudiaron 37 nidos.Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Fiorini et al. (2005a). Reserva Privada de Flora y Fauna Autóctona "El Destino", pdo. Magdalena, Buenos Aires, temporada reproductiva 2002-2003 y 2003-2004 nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*
FioriniyReboreda (2006). Buenos Aires, es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Rabuffetti y Reboreda (2007). Buenos Aires, es parasitado por *Molothrus bonariensis*.



Salvador y Bodrati (2011). San Pedro, dpto. San Pedro, Misiones, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador (2012f). Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, nidos parasitados por *Molothrus bonariensis*
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 98, desde el 02-10-1970 al 04-11-2012, 3 en Córdoba, uno en Entre Ríos y los restantes en Santa Fe. Es parasitada por *Molothrus bonariensis.*
Medidas: Diámetro total: de 13 a 23 cm. Diámetro interno: de 6 a 13 cm. Profundidad: de 4 a 10 cm. Alto: de 13 a 15 cm.Altura: Nido más bajo: 0,50 m. Nido más alto: 6,50 m.
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Nacional Chaco, Chaco, Bodrati en noviembre de 1997, localizó uns nido parasitados por *Molothrus bonariensis.*
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", 2 nidos con 3 huevos cada uno.
Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 4 nidos. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, verdes con pintas castañas y grises distribuidas por toda la superficie.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 27,0 a 29,0 x 20,5 a 21,0
Dinelli (1918b): 26,0 a 28,0 x 19,0 a 20,0 X= 27,0 x 19,5 (N= 2)
Serié y Smyth (1923): 27,0 a 30,0 x 21,0 a 23,0
Smyth (1928): 26,1 a 30,0 x 20,0 a 22,0
Pereyra (1938b): 29,0 x 20,0 a 21,0
Di Giacomo (2005h): 24,0 a 29,2 x 18,6 a 21,0 X= 27,0 x 20,0 (N= 52)
De la Peña (2013c): 26 a 29,5 x 19,0 a 22 X= 27,4 x 21,2 (N= 31)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 4,0 a 6,7 X= 5,4 (N= 49)
De la Peña (2013c): 5,4 a 7,1 X= 6,25 (N= 23)
De la Peña (2013c): cáscara 0,320 a 0,385 X= 0,338 (N= 11)

PICHONES
Descripción.
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Comisura blanco-amarillenta. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranja. Pico claro. Plumón gris oscuro. Ventral implume.

4 días.
Ojos cerrados. Plumón gris oscuro.
5 días.
Ojos cerrados. Pico color natural. Comisura blanquecina-amarillenta. Cavidad bucal, paladar, lengua, naranjas.
Piel oscura en la parte dorsal, clara en ventral.
Plumón gris oscuro. Vainas alares grises. Apenas se ven las vainas de la cola. Lados del pecho plumas muy chicas blanquecinas.
6 días.
Ojos abiertos, marrones.
8 días.



Piel clara. Pico pardusco. Comisura amarillenta. Plumón gris.
Ventral blanquecino. Cañones de primarias grises con punta clara. En dorsal queda algo de plumón.
9 días.
Lados del pecho plumas blanquecinas. Aparecen las láminas en las plumas de las alas y de la cola. También en dorsal.
Cubiertas y secundarias con láminas ocráceas.
12 días.
Punta de las plumas de cubierta, blancas. Ventral blanco jaspeado de pardo. Plumaje de adulto.
Si se los molesta se van del nido.
13-14 días.
Dejan el nido.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,6	1,3	1,6						5,5-6,0
2	0,7	1,4	1,8						7,0-9,1
3	0,8	1,5-1,8	2,0-2,3						9,1-13,2
4	0,8	2,0	2,7						
5	0,9	2,4	3,2	0,4					
6	1,0	2,8	3,5	1,0		0,8			
7	1,1	3,1	4,0	1,7		1,3			
8	1,3	3,5	4,5	2,4	0,3	1,6	0,2	0,7	

Generalidades
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 15 días. Los pichones permanecen en el nido 14 días.

De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 10 a 12 días. Período de incubación 14-15 días. Los huevos son puestos en días corridos. Los pichones nacen en 24-36 horas y permanecen en el nido 13-14 días.

Otros
De la Peña y Bruno (2008). Un ejemplar Albino (Martín de la Peña).
Urcola (2011). Un ejemplar con Leucismo parcial.

Otros
García (1952).Fraga (1984a).Mason (1985); De la Peña et al. (2003a).Couri et al (2005).Rabuffetti y Reboreda (2007). Antoniazzi et al. (2011). Salvador y Klavins en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Di Giacomo (2005h): De un total de 37 nidos estudiados, 20 de ellos estaban parasitados por *Molothrus bonariensis*.

Salvador (1984c). De la Peña (2013c).Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

Depredación
Tyto alba (Morici 1990a)

Más información:
Salvador (1983b, 1984c).Mason (1985). De la Peña (2013c)




Esperanza.Santa Fe.14-01-2008



Esperanza.Santa Fe.19-01-2006



Esperanza.Santa Fe.16-11-2004
Parasitado por *Molothrus bonariensis*



Esperanza.Santa Fe.03-05-2008



Esperanza.Santa Fe.21-01-2008



Esperanza. Santa Fe.21-06-2005



Esperanza. Santa Fe.21-06-2007



Esperanza. Santa Fe. 28-01-2005. Juvenil



Jesús María. Córdoba. 15-10-2010



Esperanza. Santa Fe. 16-11-2004



Esperanza.Santa Fe.04-10-2012. Ubicación de un nido



Esperanza.Santa Fe.19-01-2006
Pichón con larvas de *Philornis*



Esperanza.Santa Fe.21-01-2008. Juvenil



Esperanza. Santa Fe. 21-06-2007

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Cola larga con punta blanca. Cejas, parte ventral y manchas en las cubiertas alares blancas. Dorso suave estriado.

Se diferencia de la Calandria mora por ser de mayor tamaño, tener el dorso estriado, cejas más notables y menos destacado el ribete blanquecino de las secundarias.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Mimus saturninus modulator (Gould, 1836)desde el norte del país hasta Río Negro, Neuquén y este noreste de Chubut.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cuatro subespecies. Amplia área de distribución que comprende: Surinam, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Mimus saturninus modulator (Gould, 1836)

Buenos Aires
Citas: Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Codesido et al. (2011); Dabbene (1919b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Fraga (1979b, 1984); Gibson (1918); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1977c, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2004b, 2005, 2006, 2011b); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Mason (1985); Montaldo y Claver (1986); Morici (2012b, 2014); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b,1933b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Rabufeti y Reboreda (2007); Salvador y Bodrati (2013a); Salvador y Di Giacomo (2014); Soave et al. (1999b); White (1882); Zapata (1998)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 07-02-1976)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Vides Almonacid (1999); White (1882)

Observaciones: De la Peña (El Alto, dpto. El Alto, 29-01-1977)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Salvador y Bodrati (2014a)

Chubut
Citas: Navas (1994); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Garcia (1952); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador(1983a); Sferco y Nores (2003); White (1883b); Salvador (2013e); Salvador en Salvador y Bodrati (2013a); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Los Reartes, dpto. Calamuchita, 29-04-2000; Marull, dpto. San Justo, 23-05-2002; Ascochinga, dpto. Colón, 07-12-2004)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b, 1990b); Darrieu y Camperi (1993b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto San Miguel, 17-09-1979; Paso de los Libres, dpto. Paso de los Libres, 11-12-2002)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b, 2013c); Hartert y Venturi (1909); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Roitman et al. (1997); Salvador y Bodrati (2013a); Serié y Smyth (1923); Straneck (1990b); Zapata (1975)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Esteban (1953); Fiora (1934); Moschione y Segovia (2005); Zotta (1932)

Observaciones: De la Peña (Tilcara, dpto. Tilcara, 02-02-1977)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Güller (2008); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler (1984); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Catriló, dpto. Catriló, 01-12-2000)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Giacomelli (1907); Hayward (1967)

Mendoza,
Citas: Darrieu y Segura (2015); Gómez (2006); Reed (1916); Roig (1965); Sosa (1995d)

Observaciones: De la Peña (San Rafael, dpto. San Rafael, 13-10-2004)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010); Chebez (1996a); Capmourteres et al. (2015); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2008); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1993); Salvadory Bodrati (2011)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Babarskas et al. (1996); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas:Gelain (2001); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2005, 2011); Pérezy Petracci (1998)

Salta
Citas: Capurro y Bucher (1988); Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Cachi, dpto. Cachi, 05-12-1977)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Camperi y Darriu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Ortiz y Murúa (1994)

San Luis
Citas: Casares (1944); Nellar Romanella (1993)

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Santa Fe
Citas: Antoniazzi et al. (2011); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Fernández, dpto. Robles, 29-01-1977)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Dinelli (1918); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz et al. (2013c)

CALANDRIA REAL *Mimus triurus* (Vieillot, 1818)

Otros nombres: Andrea. Burlón. Calandria. Calandria blanca. Calandria chica. Calandria coliblanca. Calandria de bandas blancas. Calandria de cola blanca. Calandria de invierno. Calandria de tres colas. Calandria overa. Tenca.

DESCRIPCIÓN
Largo: 22 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 1 42,0 g; Contreras (1975): N= 1 (?) 49,5 g; Camperi (1992a): N= 2 (M) 47,2 y 50,7 g; Salvador (2014a) N= 15 (?) X= 51,5 g (Rango 48,9 a 54,6); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 46,0 g
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Dorsal gris pardusca. Rabadilla canela. Cejas y garganta blancas. Ventral ocrácea. Alas pardas con las láminas internas de las secundarias mayormente blancas, las externas orilladas de igual color. Cubiertas blancas con la parte central parda. Cola con las plumas centrales negras, externas blancas.

COMPORTAMIENTO
Anda sola, en pareja o en grupos familiares. Es de hábitos terrícolas y arborícolas. Camina y corre detrás de insectos.
Se alimenta de insectos, semillas, frutos. Recolecta desde el suelo hasta los 5 m. en ramas y follaje.
Su canto es complejo y variado. Imita voces de otras especies.

Alimentación
Marelli (1919).**Insectos. Vegetales:** Semillas.
Aravena (1928). **Insectos:** Coleópteros (Escarabajos) (Curculiónidos).
Zotta (1932).**Vegetales:** Semillas. **Insectos:** Coleópteros.Himenópteros.
Haro (1998). **Insectos:** Coleoptera.Lepidoptera.
Christie et al. (2004). **Insectos:** Gusanos.
Di Giacomo (2005h).**Vegetales:** Fruto *Lycium moronguii.*
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semillas*Amaranthus* sp.*Chenopodium* sp.*Sorghum halepense,* frutos, hojas, semillas no desterminados **Insectos:** Coleoptera (Coccinellidae,Curculionidae, Elaterida, Scarabaeidae, Tenebrionidae: larvas, no identificado). Diptera (pupas). Hemiptera (Pentatomidae).Hymenoptera (Formicidae, Vespidae). Isoptera (termitas aladas). Lepidoptera (orugas, crisálidas). Orthoptera (Acridiidae, Gryllidae). **Arácnidos**: arañas.**Crustáceos:**Isópodos terrestres.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Fruto *Cotoneaster* sp*., Morus alba.*
De la Peña (2011a). **Vegetales:**Fruto*Melia azedarach*.**Insectos:** Hormigas (*Atta* sp.).
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Estepas arbustivas, praderas, montes abiertos, matorrales, sabanas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	



El nido tiene forma de tazón. Es construido con palitos. Internamente fibras vegetales, raicillas, flores. Sostenido en arbustos.Expuesto. Elaborado.

Reed (1913). Mendoza, nido parasitado por *Molothrus bonariensis*
Goodal (1923). Córdoba-San Luis, nido parasitado por *Molothrus bonariensis*
Wetmore (1926a). La Pampa, nido parasitado por *Molothrus bonariensis*
Reed (1919). Mendoza, desde la llanura hasta una altitud de 2600 m, se ven nidos.
Pereyra (1937b). La Pampa, nido parasitado por *Molothrus bonariensis*
Masramón (1975). Nidifica en San Luis.
Salvador y Salvador (1984). Unión, dpto. Gobernador Dupuy, San Luis, 24-11-1982, sin huevos propios y 2 de *Molothrus bonariensis*; Cardenal Cagliero, pdo. Paragones, Buenos Aires, 15-11-1983, un pichón *Molothrus bonariensis*; Pedro Luro, pdo. Villarino, Buenos Aires, 15-11-1983, 4 huevos propios y 2 de *Molothrus bonariensis*; Viedma, dpto. A. Alsina, Río Negro, 16 y 22-11-1983, 6 nidos: 1 huevo propio y 1 de *Molothrus bonariensis*, 3 huevos propios y 1 de *Molothrus bonariensis*; 3 huevos propios y 1 de *Molothrus bonariensis*; 2 huevos propios y 1 de *Molothrus bonariensis*; 1 huevo propio y un pichón y un huevo y un pichón de *Molothrus bonariensis*; 2 huevos propios y 5 de *Molothrus bonariensis.*



Mezquida y Marone (2001). Reserva Ñacuñán, Mendoza.Nidifica.
De la Peña (2013c). San Antonio Oeste, dpto. San Antonio, Río negro, 03-11-1979, nido en un arbusto a 3 m del suelo, 4 huevos.
Medidas: Diámetro total: 16 cm.Diámetro interno: 8 cm. Profundidad: 4 cm. Alto: 15 cm.
Salvador y Bodrati (2014a). Médanos, pdo. Salina de la Espuma, pdo. Emilio Lamarca, pdo. La Colorada Chica, pdo. Guadal Amarillo, pdo. La Chiquita, pdo. Buenos Aires, A. Di Giacomo, localizó nidos parasitados y adultos alimentando pichones de *Molothrus bonariensis.*
Segura et al. (2014b). Daireaux, Buenos Aires y Conhello, La Pampa, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 5 nidos. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*



Huevos
Pone 4 huevos, ovoidales, celestes con pintas castañas y grises.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 25,0 a 28,0 x 18,0 a 20,5

Reed (1919): 27,0 x 20,0
Pereyra (1938b): 25,0 x 19,0
De la Peña (2013c): 24,1 a 25,1 x 17,9 a 18,7 X= 24,5 x 18,3 (N= 4)

Peso
De la Peña (2013c): cáscara 0,248 a 0,302 X= 0,283 (N= 3)

Otros
Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal gris pardusca. Rabadilla canela. Alas pardas con notable mancha blanca. Cola blanca con la parte central negra.
Se diferencia de la Calandria castaña por tener el dorso gris pardusco y el blanco de las alas más notable.


Esperanza.Santa Fe.07-06-2007



Esperanza.Santa Fe.13-07-2008


San Antonio Oeste.Río Negro.03-11-1979


Esperanza.Santa Fe. 02-05-2008

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Mimus triurus (Vieillot, 1818) por el centro-oeste del país hasta Neuquén, Río Negro y Chubut. En el otoño migra por el noreste.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Se reproduce en Argentina. En su temporada no reproductiva es migratoria hacia el norte y este dede Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y sur de Brasil. Se piensa que alguna población puede reproducirse en Paraguay y Bolivia así como en Chile.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas:Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Gochfeld (1978); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987a); Leveauy Leveau (2001); Lucero,et al. (2011); Morici (2012b, 2014); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Salvador y Bodrati (2014a); White (1882); Zapata (1998)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Vides Almonacid (1999)

Chaco

Citas:Bodrati y Pietrek (2000); Moschione y Bishels (2004)

Observaciones: De la Peña (Basail, 16-08-1987)

Chubut

Citas: Gochfeld (1978); Harris (2008); Sainz-Trápaga (2014); Salvador y Narosky (1987); Vuilleumier (1993)

Córdoba

Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Castellanos (1934); Haro (1998); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador(1983a); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Los Reartes, dpto. Calamuchita, 30-04-2000; Chancani, dpto. Pocho, 30-03-2002; Cañada de Luque, dpto. Totoral, 22-05-2002)

Corrientes

Citas: Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005b); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Fiora (1934); Moschione y Segovia (2005); Zotta (1932)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Pereyra (1937); Siegenthaler (1984); Siegenthaler et al. (1990); Straneck (1990d); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Cueto et al. (2008); Darrieu y Segura (2015); Ferrer et al. (2015); López de Casenave (2001); López de Casenave y Marone (1996); López de Casenave et al. (2008); Lucero (2013f); Marone (1991, 1992a, 1992b); Mezquida y Marone (2001, 2003a); Milesi et al. (2002); Reed (1919); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (San Rafael, dpto. San Rafael, 13-10-2004; Llancanelo, dpto. Malargüe, 15-10-2004)

Misiones
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Chebez (1996a); Navas y Bó (1993); Zotta (1940)

Neuquén
Citas:Acerbo (2000); Christie et al. (2004); Contreras (1975); Contreras y Roig (1975, 1977b); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Hellmayr (1934); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas:Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras y Roig (1977); De la Peña (2013c); Gelain (2001); Gelain y Tolosa (2011); Gochfeld (1978); Llanos et al. (2005, 2011); Paz Barreto (1997b); Paz, D. (1991); Pérez y Petracci (1998)

Observaciones: De la Peña (Chichinales, dpto. Gral. Roca, 28-11-1998)

Salta
Citas: Alabarce y Lucero (1977); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Rodríguez(2012b)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Talacasto, dpto. Ullún, 15-01-1982)

San Luis
Citas: Casares (1944); Masramón (1975, 1983); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2002, 2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Aráoz (2007); Echevarría, et al. (2011b); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014)

Alta mar
Citas: Seco Pon y Favero (2013)

CALANDRIA CASTAÑA *Mimus dorsalis* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otro nombre: Calandria de la sierra.

DESCRIPCIÓN
Largo: 23 cm.
Peso: Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 47,5 g
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Dorsal parda con tono canela. Supracaudales canelas. Cejas blancas. Ventral blanca ocrácea. Alas negras con banda blanca. Secundarias y cubiertas alares con las puntas blancas. Cola con las plumas centrales negruzcas, las laterales blancas.



COMPORTAMIENTO

Alimentación
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:**Coleoptera.Orthoptera (Acridiidae).
SalvadoryBodrati (2013c). **Reptiles:** Pequeña lagartija.

HÁBITAT
Estepas y quebradas arbustivas en la puna y prepuna.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N								N	N

El nido tiene forma de tazón. Es construido con palitos, claveles del aire. Internamente raicillas, pelos, lanas y "pelusas" de cardones.Expuesto. Elaborado.

Dinelli (1918b). Jujuy, noviembre, nido con un huevo y 2 de *Molothrus bonariensis*.
Smyth (1928). Humahuaca, dpto. Humahuaca, Jujuy, 05-11-1917, nido con 3 huevos.
Fraga (2005c). Jujuy nido parasitado por *Molothrus bonariensis*
Salvador y Bodrati (2011). Humahuaca, dpto. Humahuaca, Jujuy, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
De la Peña (2013c). Humahuaca, dpto. Humahuaca, Jujuy, 23-02-1979 y 09-02-1983, nidos en arbustos a 2,5 y 2,0 m del suelo, ambos con un huevo.
Medidas: Diámetro total: de 14 a 15 cm. Diámetro interno: de 8 a 9 cm. Profundidad: de 5 a 7 cm. Alto: de 10 a 13 cm.

Salvador (2015). Humahuaca, dpto. Humahuaca, Jujuy, 26-02-1983, nido con 3 pichones, 19-02-1995, nido con 2 pichones y un huevo y otro con 3 pichones, 27-02-2007, nido con 2 pichones y en huevo de *Molothrus bonariensis*. Tres Cruces, dpto. Humahuaca, Jujuy, 20-02-1995, un nido con 3 huevos y otro con 2 pichones. Coraya, dpto. Humahuaca, Jujuy, 21-02-1995, un nido con un huevo y 2 de *Molothrus bonariensis* y dos nidos con 2 y 3 pichones respectivamente. Purmamarca, dpto. Tumbaya, Jujuy, 24-02-2007, nido con 3 huevos, 02-03-2008, dos nidos, uno con 2 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis* y el otro con 3 pichones.



Humahuaca.Jujuy.09-02-1983



Humahuaca. Jujuy.23-02-1979

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, verdes pálidos con pintas castañas y algunas grises, más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Dinelli (1918b): 29,0 a 30,0 x 20,0 a 21,0 X= 29,5 x 20,5 (N= 2)
Smyth (1928): 27,0 a 30,0 x 20,0
De la Peña (2013c): 28,4 a 30,5 x 20 a 20,9 X=29,4 x 20,4 (N= 2)
Salvador (2015): 27,9 a 30,2 x 20,1 a 21,2 X= 29,2 x 20,7 (N= 9)



Peso
De la Peña (2013c): 4,80 (N= 1)
De la Peña (2013c): cáscara 0,370 a 0,609 X= 0,489 (N= 2)

PICHONES
Descripción
Salvador (2015). Nacen con los ojos cerrados, la piel es color carne oscuro en lo dorsal con abundante y largo plumón negruzco y la piel de zona ventral carne naranja. El pico anaranjado pálido con ápice pardusco, las comisuras blanco amarillentas y el interior de la boca anaranjado.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal pardo-canela. Manchas alares blancas. Cola negra y blanca. Diferenciarla de la Calandria real.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Mimus dorsalis (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837) hasta los 3000 m de altura en Jujuy, Salta y Catamarca.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Cordillera de los Andes en Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Catamarca
Citas: Carma (2009)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Cormenzza Méndez et al. (2011); De la Peña (2013c); Di Giacomo et al. (2007) ; Dinelli (1918b); Fraga (2005c); Lillo (1909); Salvadory Bodrati (2011); Salvador y Di Giacomo (2014); Salvador (2015); Smyth (1928)

Salta
Citas: Höy (1969a); Moschione et al. (2013)

ESTORNINOS

FAMILIA: STURNIDAE

Aves gregarias, de pico largo, puntiagudo. Cola corta.


Se alimentan de insectos, frutas.

Nidifican en cavidades.

Frecuentan parques, áreas rurales, poblaciones.

ESTORNINO CRESTADO *Acridotheres cristatellus* (Linnaeus, 1766)

DESCRIPCIÓN
Largo: 25 cm.
Peso: Craig y Feare (2009): 108-140 g
Coloración. Pico marfil. Patas amarillas. Iris naranja o amarillo.
Negro con reflejos verdosos en la parte ventral. Mancha blanca en la base de las primarias, notable en vuelo. Cola con punta azulina.



COMPORTAMIENTO

Alimentación
Zelaya et al. (2001). **Vegetales:** Frutos *Eucalyptus* sp.*, Citrus reticulata, Hedera* sp*.* Semillas *Zea mays*. **Otros:** Basura. Carne.
Chiurla y Martínez (1995). **Vegetales:** Fruto *Ficus carica, Tuna* sp*.*
De la Peña (2011a).**Desperdicios.**

HÁBITAT
Parques, poblaciones.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Nidifica en huecos en árboles, edificios. Emplea materiales vegetales, plumas y otros elementos.
Chiurla (1999). Mar de Cobo, pdo. de Mar Chiquita, Buenos Aires, 16-12-1995, nido en uno de Carpintero real (*Colaptes melanochloros*), pichones.
Montalti y Kopij (2001). Nidifica en La Plata, pdo. La Plata, Buenos Aires.
Aguerre et al. (2008). Plaza Islas Malvinas, La Plata, Buenos Aires, 24-02-2004, pichón muerto en la base de una palmera.

Más información:
Chiurla (1999).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Negro. Mancha blanca en las alas. Pico y patas amarillos.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Acridotheres cristatellus formosanus (Hartert, 1912)en el este de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Acridotheres cristatellus formosanus (Hartert, 1912)

Buenos Aires
Citas: Aguerre et al. (2008); Chiurla (1999); Chiurla y Martínez (1995); Darrieu y Camperi (2001a); Di Giacomoet al. (1993); La Grotteria (2010); Leveau y Leveau (2005); Montalti y Kopij (2001); Moschione (1989); Narosky y Di Giacomo (1993); Navas (2002); Pagano et al. (2012); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Saidón et al. (1988); Zelaya et al. (2001)

Córdoba
Citas: Gómez (2011a)

Salta
Citas: Rodríguez(2012a)

Santa Fe
Citas: Fandiño y Giraudo (2010)
Observaciones: De la Peña (Esperanza, 02-11-2002)

ESTORNINO PINTO *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758

DESCRIPCIÓN
Largo: 22 cm.
Peso: Craig y Feare (2009): 55-100 g
Coloración. Pico amarillento. Patas pardo rojizas. Iris pardo.
Negruzco con reflejos purpúreos y verdosos. Plumas con punta blanca.
El juvenil es grisáceo.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Pérez (1988). **Vegetales:** Semilla de *Lagunaria papersoni*.Frutos de *Phoenix canariensis.*

HÁBITAT
Parques, áreas rurales, poblados.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



Nidifica en huecos en árboles, edificios, roquerías, nidos abandonados. Emplea materiales vegetales y plumas.

Schmidtutz y Agulián (1988). Bernal, pdo. Quilmes, Buenos Aires, 29-10-1988, nido en uno abandonado de Carpintero.
Rivero et al. (1996). Ciudad de Buenos Aires, 10-10-1993, nido en un foco roto a 21 m de altura. Tenía un huevo y 2 pichones.
Montalti y Kopij (2001). Nidifica en La Plata, pdo. La Plata, Buenos Aires.
Turienzo y Di Iorio (2010). Buenos Aires, nido en nido de Hornero.
Rizzo (2010). Ranelagh, pdo. de Berazategui, Buenos Aires, octubre de 2007, nido en nido de Hornero (*Furnarius rufus*).
Ibañez et al (2011). Parque Pereyra Iraola, pdo. Berazategui, Buenos Aires, setiembre-diciembre de 2010, nidos en caja-nidos.
Di Sallo y Segura (2014). Estancia La Matilde, pdo. de Punta Indio, Buenos Aires, 13-10-2012, nido en uno abandonado de Leñatero (*Anumbius annumbi*), tenía 3 pichones y un huevo.
Carro et al (2014). Gral. Lavalle, pdo. Gral. Lavalle, Buenos Aires, noviembre-diciembre de 2013, nidificando en huecos en árboles.
Chimento (2015). La Plata, pdo. La Plata, Buenos Aires, 03-10-2010 entre 10 y 15 nidos en huecos en una barranca de una cantera, con 2 a 3 huevos cada uno.

Huevos
Pone de 5 a 7 huevos, azul pálido.

Medidas
Rivero et al. (1996): 31,4 x 21,9
Di Sallo y Segura (2014): 28,6 x 20,7

Otros
Turienzo y Di Iorio (2010). Ibañez et al (2011). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

Más información:
Rizzo (2010).Ibañez et al (2011).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Negruzco con puntos blancos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sturnus vulgaris vulgaris Linnaeus, 1758 en el este de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Trece subespeciesAlrededor de 100 individuos fueron introducidos en el Central Park de New York en 1891 y ahora se calcula que hay 200 millones en Estados Unidos y distribuido por todo el continente.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Buenos Aires
Citas: Carro et al (2014); Chimento (2015); Darrieu y Camperi (2001a); Di Giacomo et al. (1993); Di Sallo y Segura (2014); Ibañez (2011); Isacch y Isacch (2004); Lucero et al. (2011); Montalti y Kopij (2001); Narosky y Di Giacomo (1993); Navas (2002b); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pérez (1988); Peris et al. (2005); Petracci et al. (2004); Pugnali y Chamorro (2008); Rivero et al. (1996); Rebolo Ifran y Fiorini (2010); Roda y Danti (2015); Schmidtutz y Agulián (1988); Turinzo y Di Iorio (2010)

Córdoba
Citas:Klavins y Álvarez (2012)

Entre Ríos
Citas: Chimento (2015); Jensen (2008); Peris et al. (2005)

Mendoza
Citas: Zanotti (2013)

San Juan
Citas: Lucero (2013g)

Santa Fe
Citas: Fandiño y Giraudo (2010); Zamorano en Peris et al. (2005)

Tucumán
Citas: Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014)

CACHIRLAS

FAMILIA:MOTACILLIDAE

Aves terrícolas. Tienen la uña del dedo posterior larga. Alas largas. Vuelo nupcial alto, con planeos. Coloración del plumaje muy mimética.

Se alimentan de gusanos, larvas e insectos.

Construyen el nido en el suelo.

Frecuentan pastizales, praderas, estepas.

CACHIRLA CHICA *Anthus lutescens* Pucheran, 1855

Otros nombres: Cachila. Cachirla amarillenta. Cachirla enana. Zoncito.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12 cm.
Peso: Salvador (2014a) N= 6 (?) X= 16,3 g (Rango 15,8 a 17, 2)
Coloración. Pico e iris pardos. Patas pálidas.
Dorsal parda oscura jaspeada de ocráceo. Garganta blanquecina. Ventral ocre amarillenta con el pecho jaspeado de pardo oscuro. Alas pardas oscuras con ribetes ocráceos. Cola parda con las timoneras externas ocráceas con parte de las barbas internas pardas oscuras.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Antelo y Alabarce (2002). **Insectos:**Coleópteros.Hymenópteros (Apidae).**Arácnidos.**
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:**Coleoptera (Curculionidae, Scarabaeidae, no identificado). Homoptera (Aphidae). Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas).**Arácnidos:**arañas.
Friedmann (1927).**Insectos:**Coleópteros.

Voces
Straneck (*in litt*.). Su canto es emitido en vuelo, en planeo descendente hace un Tiki tyyyyyyyiiieeeh ....., luego reinicia el vuelo y repite este despliegue con el canto.

HÁBITAT
Praderas, pastizales, bañados.


NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

El nido tiene forma de tacita. Emplea pastos. Lo oculta entre yuyos.
Se reproduce desde setiembre a diciembre.

Friedmann (1929). Tucumán, nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pereyra (1938b). Zelaya, pdo. Pilar, Buenos Aires, nidos.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, 23-09-2002, nido con 3 huevos.
De la Peña (2013c). Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 22-09-1989, nido con 3 huevos; Cacique Ariacaiquín, dpto. San Javier, Santa Fe, 08-12-1990, nido con 3 huevos; Santa Fe, dpto. La Capital, 29-09-2000, un huevo.







Esperanza.Santa Fe.22-09-1989

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, blanquecinos con pintas y manchitas castañas y grises, por toda la superficie. Algunos con puntos pardos más concentrados en el polo mayor.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 18,6 a 20,4 x 14,0 a 15,6
Smyth (1928): 20,0 x 14,5
Pereyra (1938b): 20,0 x 15,0
Di Giacomo (2005h): 18,0 a 18,7 x 14,4 a 14,6 X= 18,3 x 14,5 (N= 3)
De la Peña (2013c).



Pesos
Di Giacomo (2005h): 1,6 a 1,7 X= 1,6 (N= 3)
De la Peña (2013c).
De la Peña (2013c).

Observaciones
Salvadoren Salvador y Bodrati (2014a). Villa María, dpto. Gral. San Martín, Córdoba, 12-12-2013, una pareja alimentando un pichón de *Molothrus bonariensis.*



Otros
Friedmann (1929). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Partes ventrales amarillentas. Pecho jaspeado. El canto.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Anthus lutescens lutescens Pucheran, 1855desde el norte del país hasta Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Panamá, Venezuela, Guayanas, Colombia, Brasil (no en Amazonia), Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay. Población en costa Perú y norte de Chile.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Anthus lutescens lutescens Pucheran, 1855

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Codesido et al. (2013); Darrieu y Camperi (2001a); Hartert y Venturi (1909); Leveau y Leveau (2001); López-Lanús et al. (2013c); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Moschione (1989b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Roesler (2001a); Savigny (2002d); Straneck (1987)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Córdoba
Citas: Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b); Salvador (1983a); Straneck (1987, 1990c); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Jesús María, dpto. Colón, 28-08-2008)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1993b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); Hellmayr (1921); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 18-09-1979; Paso de los Libres, dpto. Paso de los Libres, 11-12-2002)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); De la Peña (2012b); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013), Chebez et al. (1998, Moschione y Segovia (2005),

La Pampa
Citas:De la Peña y Tittarelli (2011); Rivero en Darrieu et al. (2011a)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Darrieu y Segura (2015); Lucero (2013f); Pereyra (1927e)

Misiones
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Partridge (1954)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas:Lucero (2013f, 2013i)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2005, 2011); Di Giacomo et al. (2001); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Alabarce (2002); Antelo y Brandán (2006); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Echevarría et al. (2008c); Hartert y Venturi (1909); Hellmayr (1921); Ortiz et al. (2011, 2013); Ortiz y Aráoz (2014)

CACHIRLA DE UÑA CORTA *Anthus furcatus* d´Orbigny y Lafresnaye, 1837

Otros nombres: Cachila. Cachirla de pico corto. Cachirla uña corta. Zoncita. Zoncito.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 1 (?) 20,5 g; Camperi (1992c): N= 2 (M) 20,0 y 21,0 g; Salvador (2014a) N= 10 (?) X= 20,2 g (Rango 18,1 a 21,3); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 19,0 g
Coloración. Pico e iris pardos. Patas rosadas.
Dorsal ocre, jaspeada de oscuro. Garganta y pecho, ocráceos jaspeados de pardo oscuro. Abdomen blanquecino. Alas pardas. Cola parda con las plumas ribeteadas de ocráceo. Timoneras externas ocráceas con parte de las láminas internas parda oscura.

COMPORTAMIENTO



Alimentación

Zotta (1936g). **Insectos:** Coleópteros (Curculiónido)(Cásido) (Chrysomelidae).Hemíptero.Lepidópteros (larvas) (Noctuidae). Orthópteros (Grillidae).**Arácnidos.**

Plotnick (1953).**Insectos:** Dípteros.Orugas. Tucuras (juveniles).

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Curculionidae, Scarabaeidae, no identificado). Hemiptera. Hymenoptera (Formicidae). Isoptera (temitas aladas). Lepidoptera (orugas, polillas).**Arácnidos:**arañas.

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces

Stranck (*in litt*.). Se remonta a una altura de unos 40 metros o más , hace un corto planeo acompañado de un zumbido y un trino: tyyyyyclicli .. Tyyyyyh . clicliclicli ... Tyyyyyh . clicliclicli ...

HÁBITAT

Praderas, estepas, pastizales.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nido en Córdoba, La Pampa, San Luis, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N



Estructura semiesférica (con forma de tacita) de pajitas. Oculto. Elaborado.

Pereyra (1938b). Nido en La Pampa, en noviembre.

Plotnick (1953). Las Flores. pdo. Las Flores, Buenos Aires. Diciembre de 1951, varios nidos.

Salvador y Salvador (1988). Pampa de Achala, Córdoba, 19-12-1987, nido con 4 huevos; 24-01-1988, nido con 3 pichones.

Andors y Vuilleumier (1995), Punta Delgada, Península de Valdes, Chubut, 8-11-93, nido con 2 pichones.

Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.

Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, Córdoba, se localizaron 6 nidos, entre octubre y enero.

Salvador (2012f). San Luis,nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.

De la Peña (2013c). Arteaga, dpto. Caseros, Santa Fe, 30-09-1985, nido con un huevo y 3 pichones.

Medidas: Diámetro total: 8 cm. Diámetro interno: 5,5 cm. Profundidad: 4 cm.

Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 6 nidos.

Huevos

Pereyra (1938b): 19,0 x 15,0 a 16,0

Salvador y Salvador (1988): 29,8 a 22,5 x 15,3 a 15,6 X= 21,9 x 15,5 (N= 4)

Salvador y Salvador (2012):20,6 a 22,5 x 14,4 a 15,6 X= 21,6 x 15,2 (N= 12)

De la Peña (2013c): 20 x 15 (N= 1)



Peso
Salvador y Salvador (1988): 2,8
Salvador y Salvador (2012):2,6 a 2,9 X= 2,8 (N= 12)
De la Peña (2013c): cáscara 0,140 (N= 1)

PICHONES
Descripción
Salvador y Salvador (2012). Los pichones nacen con los ojos cerrados. Piel color carne rosada con plumón dorsal largo y abundante pardo claro. Pico pardo amarillento claro, comisuras blanco amarillentas, interior de la boca anaranjado.

Observaciones
Plotnick (1953). Período de incubación aproximadamente 12-13 días.
Salvador y Salvador (2012). Los padres alimentan a los pichones.

Otros
Pereyra (1937c)**.**Un ejemplar con Albinismo parcial.


Arteaga.Santa Fe.30-09-1985


Copina.Córdoba.14-11-1980

Más información:
Plotnick (1953).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Uña posterior relativamente corta. El jaspeado del pecho contrasta con el abdomen blanquecino. Flancos poco jaspeados.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Anthus furcatus furcatus d´Orbigny y Lafresnaye, 1837desde el norte del país hasta Chubut y *Anthus furcatus brevirostris* Taczanowski, 1875entre los 3000 y los 3500 m de altura en Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Su área de distribución se extiende por Uruguay, sur Brasil, Argentina hasta Chubut y hacia el norte hasta la Puna enArgentina, Bolivia y Perú.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Anthus furcatus furcatus d´Orbigny y Lafresnaye, 1837

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Codesido et al. (2011); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Hartert y Venturi (1909) , Hellmayr (1921); Isacch y Martínez (2001); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Marelli (1933); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Plotnick (1953); Pugnali y Chamorro (2008); Salvador y Di Giacomo (2014); Savigny (2002a); Straneck (1990c)

Catamarca
Citas : Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (El Portezuelo, dpto. Valle Viejo, 11-03-1981; El Alamito, dpto. Andalgalá, 16-12-1999)

Chubut
Citas: Andors y Vuilleumier (1995); Sainz-Trápaga (2014); Vuilleumier (1993)

Córdoba
Citas: Castellanos (1934); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b); Ordano (1996); Partridge (1953c); Salvador(1983a); Salvadory Salvador (1988); Salvador y Salvador (2012); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Copina, dpto. Punilla, 14-11-1980; Ascochinga, dpto. Colón, 15-11-2005)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Cano et al. (2010); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1993b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); De la Peña (2012b); Raffo et al. (2008)

Formosa
Citas:Contreras (1987c); López Lanús (1997)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013), Olrog (1959); Di Giacomo et al. (2007); Chebez et al. (1998

La Pampa
Citas: Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Sigenthaler (2004); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)

La Rioja
Citas: Di Giácomo et al. (2007)

Mendoza
Citas: Peters (1923a); Sosa (1995d)

Observaciones: De la Peña (Llancanelo, dpto. Malargüe, 15-10-2004)

Misiones
Citas:Chebez (1996a); Heinonen y Chebez (1989)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Chebez et al. (1998); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Hellmayr (1921); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993).

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Hellmayr (1921); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Wilson(1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991); Salvador (1988)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2011b); Lucero (1983); Marigliano et al. (2010); Ortiz et al. (2013c);

Anthus furcatus brevirostris Taczanowski, 1875

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Olrog (1959c)


CACHIRLA TRINADORA *Anthus chacoensis* J. T. Zimmer, 1952

Otros nombres: Cachirla. Cachirla chaqueña.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12 cm.
Coloración. Pico e iris pardos. Patas rosadas.
Dorsal parda oscura jaspeada de ocráceo. Ventral blanquecina poco jaspeada en el pecho de pardo oscuro. Alas pardas. Cola parda con parte de las timoneras externas, ocráceas.

COMPORTAMIENTO

Voces
Straneck (*in litt*.). Se remonta a una altura de unos 70 m y canta una larga estrofa de trinos, 50 aproximadamente, mientras realiza un corto planeo: Clicliclicliclitlitlitlitlütlütlütlütlietlietlie ... luego asciende a la altura anterior para repetir el despliegue.



HÁBITAT
Praderas, pastizales.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Se parece a la Cachirla chica, pero difieren en el canto y en el despliegue nupcial.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Anthus chacoensis J. T. Zimmer, 1952 en Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y San Luis.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Está asociada a campos cultivados, alfalfa, soja, etc. Nidifica en el centro de Argentina migrando en invierno austral a provincias argentinas norteñas y a Paraguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Canevali et al. (1991); Casañas et al. (2007); Darrieu y Camperi (2001a); Narosky y Di Giacomo (1993); Roda y Danti (2015); Roesler (2001a); Savigny et al. (2005a); Straneck (1987, 1990c)

Chaco
Citas: Casañas et al. (2007)

Córdoba
Citas: Casañas et al. (2007); Nores (1996); Straneck (1987); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Cano et al. (2010); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b)

Entre Ríos
Citas: Casañas et al. (2007)

Formosa
Citas:Contreras (1987c); Casañas et al. (2007)

La Pampa
Citas: Casañas et al. (2007), De la Peña y Tittarelli (2011)

Misiones
Citas: Casañas et al. (2007); Chebez (1996a); Chebez et al (1998); Rydgely y Tudor (1989)

Salta
Citas:Moschione et al. (2013)

San Luis
Citas: Casañas et al. (2007); Isacc et al. (2003)

Santa Fe
Citas:De la Peña (1997b, 2011f)

CACHIRLA COMÚN *Anthus correndera* Vieillot, 1818

Otros nombres: Bailarín. Cachila. Cachirla de unas largas. Cachita. Pil-pil. Primita. Zoncita. Zoncito.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Humphrey et al. (1970): N= 1 20 g; Navas y Bó (1990); 1 hembra 19,8 g: Camperi (1992a): N= 1 (M) 19,7 g; Camperi (1992c): N= 1 (M) 20 g; Navas y Bó (2000): N= 2 (M) 20,2 y 20,3 g; Christie et al. (2004): N= 1 22 g; Camperi y Darrieu (2005): N= 3 (M) 17,2, 20,0 y 21,0 g, N= 3 (H) 18,5, 18,9 y 20,5 g, N= 1 (?) 18,6 g; Salvador (2014a) N= 8 (?) X= 20,2 g (Rango 19,2 a 21,7)
Coloración. Pico pardo, base de la mandíbula pálida, punta oscura. Patas pardo rosadas. Iris pardo.
Dorsal parda oscura jaspeada de ocre. Garganta y abdomen grises blanquecinos. Pecho ocráceo moteado de pardo oscuro. Alas pardas con las plumas ribeteadas de ocráceo. Cola parda con las plumas externas blanquecinas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Marelli (1919).**Insectos.**
Aravena (1928).**Insectos:** Coleópteros (Curculiónido) (Cásido) (*Chelimorpha*). Hormigas. Lepidópteros (larvas). Orugas. Tucura.Silphidae (*Hyponecrodes erythroptera*).**Vegetales:** Semillas.
Zotta (1936g).**Insectos:** Coleópteros (Curculiónido, Scarabaeidae) (Carabidae, Chrysomelidae). Hemípteros. Himenópteros. Lepidópteros (larvas). Ortópteros.
Klimaitis (1993).**Insectos:** Coleópteros (Coccinellidae). **Vegetales.**
Albrieu et al. (2004).**Insectos.**
Christie et al.(2004).**Insectos:** insectos, orugas.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Curculionidae, Scarabaeidae, Tenebrionidae: larvas, no identificado). Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas). Orthoptera (Acridiidae, Gryllotalpidae).**Crustáceos:** (Isópodos terrestres).**Arácnidos:** (arañas). **Vegetales:** Gramíneas (semillas).
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Strancek (*in litt*.). Asciende en vuelo repitiendo una estrofa: Tlutlitlutlip .. tlutlitlutlip ... hasta llegar al suelo, luego remonta el vuelo repitiendo este despliegue.

HÁBITAT
Praderas, pastizales, estepas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



El nido es una tacita de pajitas en el suelo, entre los pastos.
Oculto. Elaborado

Hudson (1870). Buenos Aires, nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Holland (1892). Estancia Espartillo, Buenos Aires, nido en forma de copa se compone de hierbas, y está forrada de crin de caballo, debajo de una mata de hierba corta en el suelo, ponen 4 huevos.
Crawshay (1907), Est. Sara, Tierra del Fuego, 16-10, 3 huevos. Est. Camarón, Tierra del Fuego, 17-12, un huevo
Reed (1913). Mendoza nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Wetmore (1926), Dolores, Bunos Aires, 21-10-1920, nido con 3 huevos.
Smyth (1928). Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pereyra (1938b). Noreste de la provincia de Buenos Aires, nidifica.
Humphrey et al. (1970), Punta María, Tierra del Fuego, 15-12-1960, nido con 3 huevos.



Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, 02-12-1973, nido con un pichón.
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando.nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Brocca (1997). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nidos con 2 huevos.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 2 nidos, uno con huevos y el otro con un pichón, en setiembre y octubre.
Christie et al. (2004). Nidos con huevos en novienbre, pichones en diciembre.
Albrieu et al. (2004). Estuario del río Gallegos, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, nidifica entre octubre y diciembre.
Salvador (2011c). Córdoba, nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
De la Peña (2013c). Cayastacito, dpto. San Justo, Santa Fe, 13-10-1972, 2 nidos, uno con 3 huevos y el otro 2 huevos y uno de *Molothrus bonariensis*; San Vicente, pdo. San Vicente, Buenos Aires, 10-12-1972, 4 huevos; Junín de los Andes, dpto. Huiliches, Neuquén, 26-11-1998, 3 pichones. Es parasitada por *Molothrus bonariensis*
Medidas: Diámetro total: de 8 a 10 cm. Diámetro interno: de 5,5 a 8 cm. Profundidad: de 3 a 4,5 cm.
Salvador (2015). El Infiernillo, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 02-12-1987, nido con 2 huevos.



Cayastacito. Santa Fe.13-10-1972
Parasitado por *Molothrus bonariensis*



Cayastacito.Santa Fe.13-10-1972



San Vicente.Buenos Aires.10-12-1972



San Vicente.Buenos Aires.10-12-1972

Huevos

Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, crema con pintas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.



Medidas

Hartert y Venturi (1909):
Wetmore (1926): 21,1 a 21,7 x 14,9 a 15,4 X= 21,5 x 15,1 (N= 3)
Smyth (1928): 19,5 a 20,5 x 14,0 a 15,5
Pereyra (1938b): 19,0 x 14,0
De la Peña (2013c): 20 a 20,5 x 14,9 a 15,3 X= 20,2 x 15,1 (N= 2)
Salvador (2015). 21,6 x 15,3 y 21,3 x 15,1

Peso

De la Peña (2013c): cáscara de 0,138 a 0,140 X= 0,139 (N= 2)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Dos líneas blanquecinas en la parte dorsal. Pecho con puntos oscuros. Uña larga.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Anthus correndera correndera Vieillot, 1818desde el norte del país, excepto Misiones, hasta Chubut; *Anthus correndera chilensis* (Lesson, 1839) desde Chubut hasta Tierra del Fuego; *Anthus correndera grayi* Bonaparte, 1850en las islas Malvinas; *Anthus correndera catamarcae* Hellmayr (1921) entre los 3000 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cinco subespecies. Amplia zona de distribución en centro y sur de los Andes y en el llano del sur de Sudamérica. Comprende: Perú, Bolivia, Chile, Argentina, sureste de Brasil, Paraguay y Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Anthus correndera correndera Vieillot, 1818



Buenos Aires
Citas: Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Codesido et al. (2011, 2013); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); De la Peña (2013c); Fiameni (1994); Hellmayr (1921); Isacch y Martínez (2001); Klimaitis (1993, 1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Savigny (2002a); Straneck (1990b); White (1882); Zapata (1998)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Harris (2008); Pereyra (1951); Sainz-Trápaga (2014); Vidoz (1985); Vuilleumier (1993)

Córdoba
Citas: Baldo y Ordano (1993); Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b); Ordano (1996); Salvador(1983a); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1993b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 18-09-1979)

Entre Ríos
Citas:Camperi (1992a); López-Lanús et al. (2013c); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas:Contreras (1987c); López Lanús (1997)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007) (*); Bonkewitzz (1990) (*); Bruno et al. (2007) (*); Chebez et al. (1998) (*); Darrieu et al. (2011a) (*); Maceda et al. (2001) (*); Siegenthaler (1984, 2004) (*); Tejerina et al. (2006) (*)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu y Segura (2015); Lucero (2013f); Martínez et al. (1997a); Navas y Bó (2000); Olivera et al. (2009); Pereyra (1927e); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d); Wetmore (1926b)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Cheherbar et al. (1992); Christie (1984, 1998); Contreras (1977b); De la Peña (2013c); Gorgoglione (2005); Hellmayr (1921); Heredia y Funes (1987); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b); Yepes (1939)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Camperi y Darrieu (2005); Casas (1992a); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Gelain (2001); Gelain et al. (2003); Hecker y Vidoz (1998); Hellmayr (1921); Llanos et al. (2011); Navas y Bó (1990); Paz Barreto (1997b)

Observaciones: De la Peña (Arroyo La Fragua, dpto. Pilcaniyeu, 21-11-1998)

Salta
Citas:Moschione et al. (2013); Vides Almonacid (1990)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Navas y Bó (2000)

San Luis
Citas: Casares (1944); Nellar Romanella (1993).

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2005, 2011); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Wilson(1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2011b); Lucero (1983); Marigliano et al. (2010); Ortiz et al. (2013c);

Anthus correndera chilensis (Lesson, 1839)

Chubut

Observaciones: De la Peña (Península Valdés, dpto. Biedma, 28-11-2000)

Río Negro
Citas:Gelain (2012b); Gelain y Tolosa (2011)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Burmeister (1890); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2009); De Lucca y Saggese (1992); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Stone (1928); Zapata (1969)

Observaciones: De la Peña (Río Turbio, dpto. Güer Aike, 09-11-1979)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1984, 1986); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948, 1950)

Anthus correndera grayi Bonaparte, 1850

Islas Malvinas
Citas: Bonaparte (1850); Wace (1921); Woods (1988, 2006); Zotta (1944)

Anthus correndera catamarcae Hellmayr (1921)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Hellmayr (1921); Vides Almonacid (1999)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Olrog (1959c)

Observaciones: De la Peña (Abra Pampa, dpto. Cochinoca, 22-02-1979)

Salta
Citas:Moschione et al. (2013)

Tucumán
Citas: Capllonch (2007a); Echevarría et al. (2008c); Lucero (1983); Salvador (2015)

CACHIRLA DORADA *Anthus nattereri* P. L. Sclater, 1878

Otros nombres: Cachirla. Cachirla grande. Cachirla del cerrado. Cachirla de los campos.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Belton (1985): N= 2 (M) 19 y 20 g.
Coloración. Pico e iris pardos. Patas pardo amarillentas.
Dorsal ocrácea estriada de pardo oscuro. Garganta blanquecina. Ventral ocre amarillento con el pecho estriado de pardo oscuro. Alas pardas. Cola parda con las timoneras externas ocráceas.



COMPORTAMIENTO


Alimentación

HÁBITAT
Pastizales húmedos.

NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en Corrientes.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N		

Short (1971), Itunzaingó, Corrientes, 22-10-1967, nido en el suelo, al lado de una mata de hierbas, en un pastizal, 4 huevos.



Más información:
von Ihering (1900)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Ventralmente amarillenta con el pecho poco estriado de oscuro. El canto y el vuelo nupcial.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Anthus nattereri P. L. Sclater, 1878 en el norte y noreste de Corrientes. Posiblemente sur de Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Circunscripto a área reducida de pastizal en el sureste de Brasil, sureste de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes
Citas: Capllonch et al. (2005a, 2005c); Codesido y Fraga (2009); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1993b) ; Fraga (2001b); Giraudo et a. (2003, 2006); Krauczuk y Di Giacomo (2005h); López-Lanús et al. (2013b); Partridge (1962); Short (1971)

Misiones
Citas: Olrog (1979)

CACHIRLA PÁLIDA *Anthus hellmayri* Hartert, 1909

Otros nombres: Bailarín chico del Sur. Cachila. Cachilo del Sur. Cachirla cimarrona. Cachirla variada. Corredora de unas largas.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 1 (M) 19,0 g; Camperi (1992a): N= 1 (M) 19,5 g, N= 1 (H) 18,2 g; Camperi (1992c): N= 4 (M) 17,0 , 17,5 , 17,0 y 18,0 g; N= 1 (H) 17,00 g; Christie et al. (2004): N= 1 (?) 20,0 g
Coloración. Pico negruzco. Patas rosadas. Iris pardo.
Dorsal parda oscura jaspeada de ocre oscuro. Ventral grisácea con tono ocre en el pecho, escasamente jaspeado de pardo oscuro. Alas pardas oscuras. Cola parda oscura con las timoneras externas ocres con pequeña franja parda oscura en las barbas internas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Olrog (1956a): **Insectos:**Coleópteros.
Christie et al.(2004).**Insectos.**
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Insectos: Lepidoptera (orugas).Orthoptera (Acridiidae).


Voces
Straneck (*in litt*.). Su canto, en vuelo de planeo descendente, es un insistente Tsilij . tsilij . tsilij .y también un Tyyy ... tyyy ... tyyy ... hasta llegar al suelo. Luego remonta vuelo para repetir este despliegue.

HÁBITAT
Estepas, praderas, pastizales.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron ndios en Tucumán, Córdoba, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N									N	N

Nidifica en el suelo, oculta el nido entre los pastos. Tiene forma de taza. Es construido con pastitos. Oculto. Elaborado.



Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Christie et al. (2004). Pichones en noviembre-diciembre.
Güller et al. (2004). Reserva Natural Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 24-11-2002, nido con 3 pichones.
De la Peña (2013c). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, 25-11-1990, nido en el suelo, entre pastos, 3 huevos. (Nido hallado junto a R. Straneck, A. Gutierrez Márquez y A. Casas).
Medidas: Diámetro total: 9 cm. Diámetro interno: 6 cm. Profundidad: 5,5 cm. Alto: 8 cm.
Salvador (2015). El Infiernillo, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 27-02-2007, nido con 3 huevos.



Pampa de Achala.Córdoba.25-11-1990

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, grisáceos con pintas castañas y grises distribuidas por toda la superficie pero más concentradas en el polo mayor.


Medidas
De la Peña (2013c): 21,4 a 21,8 x 15 a 15,9 X= 21,5 x 15,5 (N= 3)
Salvador (2015): 19,9 a 20,3 x 14,6 a 14,8 X= 20,1 x 14,7 (N= 3)

Pesos
De la Peña (2013c): 2,4 a 2,6 X= 2,5 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscara 0,145 X= 0,145 (N= 3)



PICHONES
Descripción
Güller et al. (2004). Plumçon gris pardusco. Pico gris rosado, comisura amarilla. Interior de la cavidad bucal anaranjado rojizo.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal oscura jaspeada de pardo y ocre. Ventral grisácea jaspeada en el pecho.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Anthus hellmayri hellmayri Hartert, 1909entre los 3000 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja y Córdoba; *Anthus hellmayri dabbenei* Hellmayr, 1921en Buenos Aires y desde Mendoza, Neuquén y Río Negro hasta Santa Cruz. (En otoño migra al norte) y *Anthus hellmayri brasilianus* Hellmayr, 1921en Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Rango de distribución fragmentado con 3 poblaciones: una de las pampas del noreste de Argentina, sureste de Brasil y Uruguay. Una segunda población en la Patagonia argentina y Chile y una tercera en el Altiplano de Perú, Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Anthus hellmayri hellmayri Hartert, 1909

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Nores (1995); Vides Almonacid (1999)

Córdoba
Citas: Baldo y Ordano (1993); Casañas (1977); De la Peña (2013c); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Partridge (1953c); Straneck (1990d)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988); Veiga et al. (2014)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Esteban (1953); Giacomelli (1923)


Rio Negro
Citas: Llanos et al. (2011)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Esteban (1953); Moschione et al. (2013); Nores (1995)

San Juan
Citas: Moschione y Banchs (1992)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Echevarría et al. (2008c); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Hellmayr (1921); Lucero (1983); Marigliano et al. (2010) (*); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c); Salvador (2015)

Anthus hellmayri dabbenei Hellmayr, 1921



Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Güller et al. (2004); Narosky (1983); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Roda y Danti (2015)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Esquel, dpto. Futaleufú, 04-02-1976)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Giraudo et al. (2003b, 2006)

La Pampa
Citas: De la Peña y Tittarelli (2011);

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Chebez et al. (1993); Darrieu y Segura (2015); Navas y Bó (2000); Sosa (1995d)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Christie et al. (1988); Contreras (1977b); Gorgoglione (2005); Hellmayr (1921); Matarasso (2007); Olrog (1979); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Acevedo et al. (1995); Bettinelli y Chebez (1986); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Gelain (2001); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Paz Barreto (1997b)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1988); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Roesler et al. (2014)

Santa Fe
Citas: Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a); Manassero et al. (2006)

Observaciones: Straneck y Viñas (Wildermut, doto. San Martín, 01-03-1992)

Tucumán
Citas: Hellmayr (1921); Lucero (1983)

Anthus hellmayri brasilianus Hellmayr, 1921

Buenos Aires
Citas: Camperi (1992c); Camperi y Darrieu (1995); Narosky (1983b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pereyra (1938b, 1940b)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Camperi y Darrieu (1995); Capllonch et al. (2005a); Contreras (1987a, 1987b); Fraga (2001b); López-Lanús et al. (2013b); Nores (1986a)

Entre Ríos
Citas:Camperi (1992a); Camperi y Darrieu (1995); López-Lanús et al. (2013c); Raffo et al. (2008)

Misiones
Citas: Camperi y Darrieu (1995, 2001)

CACHIRLA ANDINA *Anthus bogotensis* P. L. Sclater, 1855

Otros nombres: Cachirla anaranjada. Cachirla de las pajas.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Coloración. Pico pardusco amarillento. Patas color carne. Iris pardo.
Dorsal jaspeada de ocre y pardo oscuro. Ventral ocre con pocas estrías pardas oscuras en el pecho. Alas pardas. Cola parda oscura con las plumas externas ocráceas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

HÁBITAT
Estepas y pastizales altoandinos.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Ventralmente ocre canela con pocas estrías en el pecho.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Anthus bogotensis shiptoni (Chubb, 1923)entre los 3000 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.Observada en Mendoza.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Cordillera de los Andes por encima de 2.000 metros. Comprende noroeste de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y rgentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Anthus bogotensis shiptoni (Chubb, 1923)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Nores (1995)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013), Narosky (1983); Di Giacomo et al. (2007)

Mendoza
Citas:Olivera et al. (2009)

Salta
Citas:Moschione et al. (2013); Nores (1995)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Chubb (1923); Hellmayr (1921); Lillo (1902); Lucero (1983); Nores (1995); Ortiz et al. (2005, 2013c)

CACHIRLA GRANDE *Anthus antarcticus* Cabanis, 1884

Otros nombres: Cachirla. Cachirla antártica. Cachirla austral. Cachirla de las Georgias. Cachirla Geórgica.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16 cm.
Coloración. Pico negruzco. Patas grises. Iris pardo.
Dorsal parda oscuro jaspeado de ocre oscuro. Ventral ocrácea profusamente jaspeada de pardo oscuro. Alas pardas oscuras. Cola parda oscura con las plumas orilladas de ocráceo. Timoneras laterales con vexilo externo ocráceo.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Murphy (1923). **Insectos**: Coleopteros (*Hydromedion sparsutum*: adultos y larvas, *Perimilops antarcticus*: adultos y larvas). Collembola (*Isotoma georgiana*). Diptera (*Actoceles georgiana*).
Zotta (1940). **Insectos:** Coleópteros (Tenebrionidae).

HÁBITAT
Estepas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Georgia del Sur.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

Murphy (1923), Georgia del Sur, 2 nidos, 15-12-1912, nido terminado sin postura; 06-01-1913, 4 pichones. Uno estaba a 20 m s.n.m. junto a una barranca, entre pastos, construido sobre todo de finas raíces, y lo cubría una mata en forma de cúpula. El otro nido estaba en el centro de una densa aglomeración de matas de hierbas, tenía forma de copa profunda, construido de trozos de pajas, en el fondo había restos de coleópteros y copépodos marinos, estaba a solo 2 m de un nido de *Macronectes*.



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Muy jaspeada de pardo oscuro y ocre dorsal y ventralmente.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Anthus antarcticus Cabanis, 1884 en Georgias del Sur.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Islas Georgias del Sur.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Georgias del Sur
Citas: Carcelles (1931); Murphy (1923); Princey Croxall (1996); Zotta (1944)

FRUTEROS

FAMILIA:THRAUPIDAE

Aves de pico corto y fuerte o cónico.

Se alimentan de frutas, semillas, hojas, flores, granos, larvas, arácnidos,insectos.

Nidifican en los árboles. Ponen hasta 4 huevos.

Frecuentan montes, bosques, selvas, orillas de selvas, parques, plantaciones frutales.

CARDENAL COMÚN *Paroaria coronata* (J. M. Müller, 1776)

Otros nombres: Cabeza colorada. Cabeza roja. Cardenal. Cardenal colorado. Cardenal copete rojo. Cardenal cresta

DESCRIPCIÓN
Largo: 19 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 1 (?) 36,0 g; Di Giacomo (2005h): N= 7 X= 37,1 g (Rango 31,5 a 42,2); Salvador (2014a): N= 6 (?) X= 39,9 g (Rango 36,6 a 41,6); Alderete y Capllonch (2012): N= 15 (?) X: 34 g (Rango 28 a 40); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 15 X= 38,3 g (Rango 34,5 a 42,5)
Coloración. Pico rosado o blancuzco con culmen y ápice negruzco. Patas negruzcas. Iris pardo rojizo. Cabeza, copete, garganta y parte superior del pecho rojos. Cuello posterior gris con puntos blancos. Resto de la parte dorsal gris. Ventralmente blanco. Alas y cola negruzcos.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja, en grupos o en bandadas. (a veces hasta de 50 ejemplares). Bastante terrícola. Se posa en ramas de árboles o de arbustos.
De la Peña (2006d).Busca el alimento desde el suelo hasta los 6 m de altura.

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** semillas de Canutillo (*Echinochloa crus-galli*), Sorgo (*Sorghum caffrorum*), Brachiaria (*Urochloa plantaginea*)
Marelli (1919).**Vegetales:** Semillas. **Otros:** Piedritas.
Zotta (1940c). Piedritas.
Antelo y Alabarce (2002). **Insectos:** Formicidae. **Otros**: Hongos.
De la Peña y Pensiero (2003). **Vegetales:** futos *Celtis ehrenbergiana, Morus alba, Lycium boerhaviaefolium, Holmbergia tweedii, Sapium haematospermum*. Semillas *Chloris virgata, Eleusine tristachya, Setaria parviflora, Spergula villosa*.
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:** Frutos *Celtis iguanea, Cereus forbesii, Lycium morongui.* Semillas *Cirsium vulgare, Hymenachne amplexicaulis.* **Insectos:** Hormigas aladas (*Acromyrmex* sp.). Termitas aladas. **Otros:** Granos. Desperdicios.
De la Peña (2011a). **Vegetales:** Pimpollo *Aspidosperma quebracho-blanco*. Fruto *Celtis ehrenbergiana, Ficus carica, Lycium boerhaviaefolium, Holmbergia tweedii, Morus alba, Muehlenbeckia sagittifolia, Rumex crispus, Sapium haematospermum*. Semillas *Chloris virgata, Eleusine tristachya, Glycine max, Panicum bergii, Phoradendron* sp., *Setaria parviflora, Sorghum halepense, Soghum* sp., *Spergula villosa, Zea mays*. **Insectos:** Homoptera (Chernoideae), Chicharra (*Quesada gigas*), Langostas, Mosquitos. **Otros:** pan.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.). Emite un canto compuesto por varias notas gorgeadas y silbadas: Tibiutibuytip chekike . tiublitiu . tubiptiebip . tiekiki.

HÁBITAT
Praderas, montes, bosques, sabanas, áreas rurales, arboledas, parques, jardines, áreas urbanas y periurbanas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N



El nido tiene forma de taza o semiesfera, sostenido en ramas. Emplea en la construcción fibras vegetales. Internamente raicillas o cerdas.Expuesto. Elaborado. Puede ocupar el mismo nido más de una vez en la misma temporada.

Gibson (1880a). Cabo San Antonio, pdo de la Costa, Buenos Aires. Posturas octubre y noviembre.
Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, nidifica.
Smyth (1928). Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Friedmann (1929). Tucumán nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Friedmann (1929). Tucumán Girardnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pereyra (1938b). Zelaya, pdo. Pilar, Buenos Aires, nidifica.
Wilson (1979). Corrientesnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 2 nidos.
Moreyra (1997).Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, un nido.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 2 nidos en setiembre.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre setiembre y enero. Se observaron 50 nidos.
Segura y Reboreda (2012a). Punta Indio, pdo. Buenos Aires, 9 de 130 nido fueron parasitados por *Molothrus bonariensis.*
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 159, desde el 22-11-1970 al 08-01-2013, todos en provincia de Santa Fe. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*



Medidas: Diámetro total: de 11 a 13 cm. Diámetro interno: de 7 a 8 cm. Profundidad: de 3 a 5,5 cm. Alto: de 6 a 8 cm.
Altura: Nido más bajo: 1,30 m. Nido más alto: 20,00 m
Salvador y Bodrati (2014a). Reserva El Bagual, Formosa, A. Di Giacomolocalizó nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, un nido con 2 huevos.
Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 4 nidos.

Huevos



Pone 3, a veces 4 huevos, ovoidales, verde o pardo verdosos con pintas y manchitas ocres, pardas o castañas, distribuidas por toda la superficie. Algunos pueden tener líneas negras.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 20,4 a 26,5 x 16,4 a 18,0
Serié y Smyth (1923): 24,0 a 26,0 x 18,0
Smyth (1928): 22,5 a 25,5 x 15,0 a 17,0
Pereyra (1938b): 24,0 x 18,0
Di Giacomo (2005h): 21,6 a 25,7 x 15,7 a 18,1 X= 23,3 x 16,7 (N= 42)
De la Peña (2013c): 22 a 24,7 x 15,7 a 19,3 X= 23,4 x 17,0 (N= 34)

Pesos

Di Giacomo (2005h): 2,7 a 3,8 X= 3,1 (N= 41)
De la Peña (2013c): 2,75 a 3,90 X= 3,2 (N= 25)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,186 a 0,245 X= 0,225 (N= 16)

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,5	0,8	1,0-1,3						3,2
2	0,5-0,6	0,9-1,0	1,3-1,7						3,9-6,5
3	0,6	1,1-1,2	1,41,8						5,2-9,0
4	0,6	1,2-1,4	1,7-1,9	0,1-0,5		0,2-0,4			9,6-14,0
5	0,7	1,8-2,0	2,4-2,8	0,8-1,4		0,7-1,0			14,2-17,3
6	0,8-0,9	1,9-2,1	2,8	1,0-1,6	0,2	1,0-1,1	0,1-0,2	0,2	17,3-21,6
7	0,9	2,1-2,4	2,9	1,3-1,7	0,2	1,1-1,4	0,3	0,3-0,4	18,3-22,0
8	0,8-0,9	2,3-2,4	2,9	1,5-1,9	0,3	1,2-1,6	0,3	0,5-0,6	19,7-23,0

PICHONES

Descripción.

De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel y patas oscuras. Pico gris, comisura blanquecina. Cavidad bucal y lengua rosados. Plumón fino, gris en la cabeza, dorso inferior y dorsal de las alas.
4 días
Abre los ojos, marrones.
Aparecen las vainas en la cola y en la parte dorsal.
5 días
Plumón gris oscuro. Lados del pecho y muslos vainas blanquecinas. Vainas alares grises.
Abriendo las láminas de las plumas alares. Aparecen las vainas en la cola.
6 días
Pequeña mancha marrón-rojiza en la garganta.
8 días
Se nota el color marrón-rojizo en las plumas del copete y en la garganta. Ventralmente blanquecino. Flancos ocráceos. Plumas de las alas y de la cola con láminas. Dorsalmente con el color del adulto.

Vivaracho.
10 días
Muy activo. Si es molestado se va del nido.Grita. Corona y garganta, marrón rojiza. A los lados de la cara se notan plumitas rojizas. Collar nucal blanco. Ventral blanco. Dorsalmente, alas y cola, grises. Algunas plumas del abdomen jaspeadas de marrón. Patas y uñas grises.

Generalidades
Contreras (1990b). Los huevos son puestos en días corridos. El período de incubación es de 16 días.
El pichón permanece en el nido 14 días.
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 12 ó 13 días.
La pareja alimenta a los pichones y permanecen en el nido entre 11 a 15 días.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 6 a 8 días. Período de incubación 14-15 días. Los huevos son puestos en días corridos. Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido 14-15 días.

Otros
Urcola (2011). Un ejemplar con Eumelanismo parcial.
Chebez (1987f). Un ejemplar albino.


Otros
De la Peña et al. (2003a).Antoniazzi et al. (2011).Segura y Reboreda (2011). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Smyth (1928). Friedmann (1929). Wilson (1979). De la Peña (2013c). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*
De la Peña (2003a). En la Reserva de la Escuela Granja de Esperanza se realizó un estudio de la nidificación simultánea y dio como resultado en el año 1998, 0.41 nidos por hectárea y en el año 2002, 0,41 nidos.

Más información:
De la Peña (2013c)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Copete, cabeza y garganta rojos. Dorsal gris. Ventral blanca.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Paroaria coronata (J. M. Müller, 1776) desde el norte del país hasta Mendoza, La Pampa y Río Negro. Ocasional hasta Gaiman (Chubut)

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Bolivia, Paraguay, sur de Brasil, Argentina y Uruguay.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1919b); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré (2006); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987a); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Segura y Arturo (2009); Segura y Reboreda (2011); Soave et al. (1999b); White (1882)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chaco
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2005)

Observaciones: De la Peña (Basail, dpto. San Fernando, 26-08-1987)



Esperanza.Santa Fe.09-11-1995
Parasitado por *Molothrus bonariensis*



Esperanza.Santa Fe.22-06-2009



Esperanza.Santa Fe.24-12-2005.Pichón de un día.



Esperanza.Santa Fe.30-10-1983



Esperanza.Santa Fe.16-08-2007. Melánico



Esperanza.Santa Fe.26-04-2007



Esperanza.Santa Fe.23-10-2009

Chubut
Citas: Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones:Salvador, S (en las costas del Río Chubut cerca deGaiman. Noviembre de 2005)

Córdoba
Citas: Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Balnearia, dpto. San Justo, 19-07-2007; Jesús María, dpto. Colón, 16-10-2010; Ascochinga, dpto. Colón, 16-10-2010)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b, 1990b); Darrieu y Camperi (1996); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918); Wilson (1977)

Observaciones: De la Peña (Mercedes, dpto. Mercedes, 19-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Straneck (1990c); Zapata (1975)

Formosa
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Banchs y Fraga (1994); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009) ; Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Darrieu et al. (2011a); Güller (2008); Maceda et al. (2001); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1907, 1923); Hayward (1967)

Misiones
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2008); Martínez Gamba (2014)

Mendoza
Citas: Roig (1965)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas:Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Seewald y Pérez (2009)

Salta
Citas: Alabarce yLucero (1977); Alderete y Capllonch (2012); Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b); Salvador (1988)

Observaciones: De la Peña (San Ramón de la Nueva Orán, dpto. Orán, 02-02-1977)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas:Antoniazzi et al. (2011); De la Peña (2003a, 2011a, 2011f, 2013c); De la Peña et al. (2003a); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Alderete y Capllonch (2012); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Echevarría et al. (2011b); Lucero(1983); Lucero et al. (2002); Ortiz et al. (2011b, 2013c); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014)

CARDENILLA *Paroaria capitata* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Cardenal chico. Cardenal sin copete. Cardelina. Cardenalina. Cardenalillo. Cardenila. Cardenillo. Carmensí. Copete rojo. Crestudilla. Crestudo negro. Monjita.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17 cm
Peso: Contreras (1979f): N= 3 (M) X: 22,4 g (Rango 22 a 23,2), N= 2 (H) 20,2 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 2 (?) 18 y 25 g; Salvador (2014a): N= 5 (?) X= 21,7 g (Rango 20,7 a 23,0)
Coloración. Pico naranja-amarillento. Patas rosado-naranja. Iris rojizo.
Cabeza roja. Dorsal gris con tono pardo. Garganta negruzca. Lados del cuello y parte ventral blancos. Flancos y abdomen con tono ocráceo. Alas y cola negruzcas.

COMPORTAMIENTO
Andaen pareja o en pequeños grupos. Camina sobre la vegetación flotante en esteros u orillas de ríos. Se posa en las ramas de árboles o arbustos.
De la Peña (2006d).Se alimenta desde el suelo hasta los 5 m de altura.

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Semilla de Cerraja (*Sonchus oleraceus*)
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:** Fruto *Citrus* sp. (Naranja), *Musa* sp. (Banana). **Otros:** Desperdicios.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** fruto de *Sapium haematospermum,* frutos y semillas no determinados.
De la Peña (2011a). **Vegetales:** semillas de *Cuscuta indecora*, *Zea mays*, Fruto de *Lycium americanum.*
Insectos: mosquitos. **Otros:** Carne, Pan.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Matorrales y bosques costeros, selvas en galería, orillas de esteros, bañados, arroyos, ríos.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Formosa, Corrientes, Chaco, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N						N	N	N	N

El nido tiene forma de taza o semiesfera, es sostenido o atado a ramitas de arbustos o árboles, a veces cubierto por enredaderas. Emplea fibras vegetales. Internamente pelos, raicillas, cerdas, hilos.Expuesto. Elaborado.



Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 7 nidos.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre setiembre y marzo. Se estudiaron 21 nidos.Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 15, desde el 17-02-1976 al 08-01-2013, todos en provincia de Santa Fe.
Medidas: Diámetro total: de 9 a 10 cm. Diámetro interno: de 6 a 6,5 cm. Profundidad: de 2,5 a 3,5 cm. Alto: de 5,5 a 6 cm.Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Nacional Chaco, Chaco, Bodrati en diciembre de 1999, localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*



Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, de color crema, ocres o verdosos con pintas marrones, grises u ocres, distribuidas por toda la superficie.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 20,4 a 26,5 x 16,4 a 18,0
Smyth (1928): 22,5 a 25,5 x 15,0 a 17,0
Di Giacomo (2005h): 19,5 a 23,0 x 14,0 a 15,8 X= 21,0 x 15,1 (N= 30)
De la Peña (2013c). 19 a 22,8 x 14,9 a 16,4 X= 21,0 x 15,5 (N= 17)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 1,8 a 2,7 X= 2,3 (N= 27)
De la Peña (2013c): 2,5 a 2,6 X= 2,55 (N= 5)
De la Peña (2013c): cáscaras de 0,116 a 0,162 X= 0,143 (N= 12)



PICHONES
Descripción
Nacen con los ojos cerrados. Piel oscura. Comisura amarilla. Cavidad bucal y lengua, rosados. Abundante plumón gris oscuro, en cabeza, dorso y dorsal de las alas.
4 días
Abre los ojos.
6 días
Ventralmente y muslos con vainas blancas. Resto vainas grises. Abriendo las láminas.
9días
Vivarachos. Gritan. Rojizo en la garganta. Ventral blanco.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,5	1,2	1,4						3,5
2	0,5	1,2	1,6						4,7
3	0,5	1,3-1,4	1,8						5,8
4	0,5	1,5-1,6	2,0						7,2-8,3
5	0,5	1,7-1,9	2,3	1,0-1,2		0,8-0,9			10,5-11,0
6	0,6	1,8-2,0	2,5-2,6	1,4-1,5	0,1	1,3-1,4		0,1	13,0-15,2
7	0,7	2,0-2,1	2,7-2,8	1,4-1,6	0,3	1,3-1,4	0,1	0,3	15,0-17,2
8	0,7-0,8	2,1-2,3	2,8-3,0	1,4-1,7	0,7	1,2-1,3	0,6	0,6	17,0-20,0
9	0,7-0,8	2,2-2,5	3,0-3,1	1,4-1,7	1,0-1,2	1,0-1,2	0,8-1,2	0,8-1,0	20,5-22,0

Generalidades

Contreras (1990b). El pichón permanece en el nido 12-24 días.

Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 12 ó 13 días. La pareja alimenta a los pichones y permanecen en el nido entre 10 a 14 días.

De la Peña (2013c).Demora en la construcción del nido de 6 a 8 días. Período de incubación 14-15 días. Los huevos son puestos en días corridos. Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido 14-15 días.

Otros

Di Giacomo (2005h). De 21 nidos, estudiados 4 estaban parasitados por *Molothrus bonariensis*.

Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). De la Peña (2013c). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

Di Giacomo (2005h). De la Peña (2013c). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*



Santa Rosa.Santa Fe.11-12-1990
Parasitado por *Molothrus bonariensis*



Esperanza.Santa Fe.01-10-2007



Santa Rosa.Santa Fe.11-12-1990



Villa Roda. Santa Fe. 17-01-2013. Ubicación nido



Villa Roda. Santa Fe. 24-01-2013



Esperanza. 31-08-2015

Más información:
De la Peña (2013c).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza roja. Garganta oscura. Parte ventral blanca. Dorsal gris pardusca.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Paroaria capitata capitata (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)desde el norte del país y sur de Misiones hasta Tucumán, Córdoba, Santa Fe, noreste de Buenos Aires, Neuquén y noreste de Río Negro.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies.Sureste de Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Paroaria capitata capitata (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Buenos Aires
Citas:Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Chimento et al. (2012); Darrieu y Camperi (2001a); Klimaitis y Moschione (1986, 1987a); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo

(1993); Núñez Chas y Sorensen (1992); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pugnali y Chamorro (2008)



Chaco
Citas:Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Bodrati (2013a, 2014)

Observaciones: De la Peña (Cerrito, dpto. Bermejo, 06-05-1988)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979a, 1980b); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b, 1990b); Darrieu y Camperi (1996); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Pereyra(1923a)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Martelli (1995); Pujalte et al. (1995); Straneck (1990e); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Esteban (1953); Moschione y Segovia (2005)

Misiones
Citas: Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Chebez y Heinonen Fortabat (1987b); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2008); Martínez Gamba (2014)

Neuquén
Citas:Matarasso (2007); Bianchini y Arenas (2013b)

Río Negro
Citas:Nores (1986b)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

Santa Fe
Citas: Beltzer et al. (2003-2004); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Esteban (1953); Lucero (1983); Ortiz et al. (2013c)

FRUTERO CANELA *Schistochlamys ruficapillus* (Vieillot, 1817)

DESCRIPCIÓN
Largo: 18 cm.
Peso: Willis y Oniki (2002): N= 5 (?) 37 a 45 g; Hilty (2011): 24-39 g
Coloración. Pico gris azulino, punta de la mandíbula negra. Patas oscuras. Iris pardo rojizo.
Cara negra. Corona parda. Dorso gris azulino. Alas y cola más oscuras. Lados de la cabeza, garganta y pecho, ocráceos con tono rojizo. Pecho inferior y abdomen blancos. Flancos grises. Subcaudales rojizas.

HABITAT
Arboledas, orillas de bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico gris azulino con punta negra. Cara negra. Dorsal azulina. Ventral ocrácea rojiza y blanca.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Schistochlamys ruficapillus (Vieillot, 1817)en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies.**Sureste de** Brasil y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Chebez (1996a, 2009); Saibene et al. (1996)

FRUTERO OVERO *Cissopis leverianus* (Gmelin, JF, 1788)

Otros nombres: Acaé morotí. Acaemorotí michí. Calandria. Moriche blanco. Moriche de Misiones. Tangará overo. Tic-tic. Urraquita.

DESCRIPCIÓN
Largo: 27,5 cm.
Peso: Belton (1985): N= 1 (H) 71 g; Storer (1989): N= 2 (H) 70 y 74 g; Oniki y Willis (1999): N=5 (?) X: 66,6 g (Rango 51,5 a 78)
Coloración. Pico corto, negro. Patas negruzcas. Iris amarillo.
Cabeza, espalda y pecho negros. Resto de la parte dorsal, cubiertas alares y abdomen blancos. Alas negras con las plumas ribeteadas de blanco. Tapadas internas de las alas blancas. Cola negra con punta blanca.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Bodrati (2006b).Frutode *Plinia trunciflora*.

Voces
Straneck (*in litt*.).Suele cantar a dúo estrofas silbadas y agudas ritmicamente: Sipsilí .. sipsilí ... siupsip siulí .. siupsip siulí ..



HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Iris amarillo. Blanco y negro. Cola larga, escalonada, negra con puntas blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Cissopis leverianus major Cabanis, 1851en Misiones y Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Ampliamente distribuida por toda Sud América, hasta Argentina. Existen 3 regiones separadas. Una que incluye: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil al sur de Amazonia. Otra región en Venezuela y las Guayanas y la otra sureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Cissopis leverianus major Cabanis, 1851

Misiones
Citas: Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2008); Martínez Gamba (2014); Straneck (1990g)

Observaciones: De la Peña (Puerto Iguazú, dpto. Iguazú, 18-09-1971; Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 08-02-1973)

FRUTERO DE CABEZA NEGRA *Nemosia pileata* (Boddaert, 1783)

Otros nombres: Fruterito cabeza negra. Frutero cabeza negra.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13 cm.
Peso: Short (1971): N= 1 (M) 25,1 g; Contreras (1983c): N=5 (M) X= 17,1 g (Rango 16,3 a 18,0 g), N= 1 (H) 21,4 g; Darrieu y Camperi (1994): N= 5 (M) X: 17,1 g (Rango 16,3 a 18), N= 5 (H) X: 18,5 g (Rango 17,4 a 21,4)
Coloración. Pico oscuro. Patas naranja-amarillento. Iris amarillo.
Macho. Cabeza y lados del cuello negros. Lorum y parte ventral blancos. Dorsal, alas y cola grises azuladas.
Hembra. Dorsal gris azulada. Lorum blanco. Ventral blanquecina con tono ocráceo en la garganta y en el pecho.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:**Frutos de*Ficus luschnathiana,Phoradendron balansae.*

HÁBITAT
Bosques.

NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en Formosa.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Semiesfera de fibras vegetales liadas con telas de arañas.



Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, 01-12-2003, nido en construcción a 6,5 m del suelo. Puso un huevo y fue depredado. El 8 de diciembre a 200 m del sitio anterior nido en construcción a 13 m de altura. El día 16 incubaba 2 huevos. Los nidos eran semiesferas traslúcidas de fibras amarillentas, revestidas con líquenes, liados a las ramitas y en el borde superior con telas de arañas.

HUEVOS
Color celeste grisáceo con manchas oscuras.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: cabeza negra. Lorum y parte ventral blancos. Dorsal, alas y cola grises azuladas. Hembra: sin la cabeza negra. Garganta y pecho ocráceos. Ambos sexos con iris y patas amarillos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Nemosia pileata caerulea (Wied-Neuwied, 1831) en el sureste de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, norte de Corrientes y Misiones. Observado en Mendoza.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Seis subespecies. Extensa área por casi toda Sud América hasta Argentina. Comprende: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Nemosia pileata caerulea (Wied, 1831)

Chaco
Citas:Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2002b)

Corrientes
Citas: Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1983c, 1987b); Darrieu y Camperi (1994); Giraudo et al. (1993, 2006); Short (1971)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); López Lanús (1997); Nores (1992); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Malizia et al. (2005)

Mendoza
Citas: Pérez (2012)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Heinonen y Chebez (1989); Krauczuk (2005, 2008); Martínez Gamba (2014); Militello y Chebez (2009); Saibene (1986)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

TANGARÁ GRIS *Thlypopsis sordida* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Fruterito cabeza dorada. Fruterito jilguero. Fruterito de cabeza amarilla. Tangará de cabeza naranja. Tangará de sombrero.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14 cm.
Peso: Contreras (1979f): N= 2 (M) 15,2 y 16,3 g, N= 3 (H) X: 17,2 g (Rango 16,3 a 17,8); Salvador (1990a): N= (?) 14, 2 g; Darrieu y Camperi (1994): N= 4 (M) 16,0, 16,1, 16,2 y 16,8 g, N= 5 (H) 16,9, 18,1, 18,8, 19,2 y 15,5 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 3 X= 13,7 g (Rango 13,0 a 14,0)
Coloración. Pico pardo. Patas grises. Iris pardo.
Frente y corona naranjas. Cara y garganta amarillas. Dorsal gris olivácea. Ventral ocrácea. Flancos grisáceos. Alas y cola, pardas.

HÁBITAT
Bosques, selvas, selvas en galería.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N



Semiesfera de fibras vegetales. Internamente hojas.

Dinelli (1918b).Tafi Viejo, dpto. Tucumán, Girard halló un nido en el mes de diciembre, construido con pecíolos de hojas, fibras vegetales y crines. Mide 8 cm de diámetro y 4,5 cm de alto.
Friedmann (1929). Tucumán, Girard nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.

HUEVOS
Pone 3 huevos blanco-azulados con pintas pardas y canelas.

Medidas
Dinelli (1918b): 19,0 a 20,0 x 15,0 a 16,0 X= 19,5 x 15,5 (N= 2)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza amarilla naranja. Dorsal gris. Ventral ocrácea.
Diferenciarlo del Tangará alisero.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Thlypopsis sordida sordida (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Observada además en el noreste de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Amplia distribución geográfica que abarca Venezuela, la costa Atlántica de Brasil y por el oeste, desde Colombia hasta el norte de Argentina. Comprende: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Thlypopsis sordida sordida (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Buenos Aires
Citas: Narosky (1983b)


Catamarca
Citas: Carma (2009); Nores e Yzurieta (1982a); Nores et al. (2000); Vides Almonacid (1999)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a)

Observaciones: De la Peña (Cerrito, dpto. Bermejo, 26-10-1973)

Corrientes
Citas: Capllonch et al. (2005); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1980-81, 1987b); Darrieu y Camperi (1994); Esteban (1953); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá, 19-09-1979)



Entre Ríos
Citas: De la Peña et al. (2003b)

Formosa
Citas: Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Nores (1992)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005); Straneck (1990f)

La Rioja
Lobo Allende y Bortnyk (2013)

Misiones
Citas:Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Chebez (1996a); Savigny (2013)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Salvador (1990a); Salvador y Di Giacomo (2014)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011); Hartert y Venturi (1909); Pautasso (2002a)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Dinelli (1918b); Echevarría et al. (2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014); Rougés y Blake (2001)

TANGARÁ ALISERO *Thlypopsis ruficeps* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Fruterito de cabeza rojiza. Tangará de cabeza rojiza.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13 cm.
Peso: Salvador (1988):N= 1 (H) 12,0 g, N= 1 (?)12,0 g; Darrieu y Camperi (1994): N= 4 (M) X: 16,3 g (Rango 16 a 16,8), N= 5 (H) X: 17,7 g (Rango 15,5 a 19,2)
Coloración. Pico gris oscuro. Patas grises. Iris pardo.
Cabeza rojiza. Dorsal, alas y cola oliváceas. Ventral amarilla. Flancos oliváceos.
El juvenil tiene la cabeza amarillenta verdosa.



HÁBITAT
Bosques.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Catamarca, Tucumán.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N



El nido tiene forma de taza. Es construido con tallos de enredaderas, pajas y hojas. Internamente fibras finas y unas cerdas. Lo sostiene en arbustos.Expuesto. Elaborado.

Dinelli (1918b).Nidifica en Tucumán.
De la Peña (2013c). Cuesta del Clavillo, dpto. Andalgalá, Catamarca, 18-12-1999, nido en un arbusto a 2,70 m del suelo, 2 huevos.
Medidas: Diámetro total: 9,5 cm. Diámetro interno: 4,5 cm. Profundidad: 3,5 cm. Alto: 12 cm.

Huevos

Pone 2 huevos, ovoidales, de color crema con pintas y líneas castañas y pardas, distribuidas por toda la superficie.

Medidas
De la Peña (2013c): 19,7 a 19,9 x 13,8 a 13,9 X= 19,8 x 13,8 (N= 2)
De la Peña (2013c): cáscara 0,090 X= 0,090 (N= 2)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza rojiza. Dorsal olivácea. Ventral amarilla.
Se diferencia del Tangará gris por no tener cara amarilla y es más oliváceo en la parte dorsal. De la hembra del Tangará alisero por ser más amarillo en la parte ventral y tener distinta distribución geográfica. Diferenciarlo además del Cerquero cabeza castaña.


Cuesta del Clavillo.Catamarca.18-12-1999


Cuesta del Clavillo.Catamarca.18-12-1999

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Thlypopsis ruficeps (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)entre los 1800 y los 2500 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Vertiente oriental de los Andes entre 1.500 y 3.500 metros de altura en Perú, Bolivia ynoreste de Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Carma (2009); De la Peña (2011a); Nores e Yzurieta (1983b); Vides Almonacid (1999)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Salvador (1988)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Höy (1969a); Moschione et al. (2013)

Tucumán

Citas: Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Dinelli (1918); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011b, 2013c); Ortiz y Aráoz (2014)

PIORÓ *Pyrrhocoma ruficeps* (Strickland, 1844)

Otros nombres: Cabecita castaña. Carita negra. Fruterito de cabeza castaña. Tangará de cabeza castaña.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12,5 cm.
Peso: Belton (1985): N= 1 (M) 15 g, N= 2 (H) 15 g; Storer (1989): N= 6 (M) X: 14,5 g (Rango 14 a 15), N= 1 (H) 15 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 (M) 13,5 y 15,0 g, N= 1 (H) 14,0 g
Coloración. Pico gris oscuro. Patas grises. Iris pardo.
Macho. Gris plomizo oscuro. Frente, lorum y mejillas negros. Resto de la cabeza y garganta castaños.
Hembra. Dorsal olivácea. Cabeza canela, garganta más clara. Ventral amarilla grisácea. Flancos grisáceos. Alas y cola grises parduscas.

COMPORTAMIENTO

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto está compuesto por tres o cuatro silbos agudos: Sipsipsip . suísuí ... sipsip . suísuí

HÁBITAT
Estrato bajo y medio en selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: gris con la cabeza castaña. Hembra: olivácea y grisácea con cabeza canela.
Diferenciar la hembra del Tangará alisero.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844) en Misiones, Corrientes e isla Martín García (Buenos Aires)



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Selva Atlántica o Paranaense en el este de Paraguay, sureste de Brasi y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Bertonatti et al. (1994); De Francesco (2005)

Corrientes
Citas: Capllonch et al. (2005a, 2005c); Contreras (1987b, 1988); Darrieu y Camperi (1988)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Chebez et al (1998); Chebez (1996a); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Krauczuk y Baldo (2004); Krauczuk (2008); Martínez Gamba (2014); Salvador y Di Giacomo (2014); Straneck (1990h)

FRUTERO DE CORONA AMARILLA *Trichothraupis melanops* (Vieillot, 1818)

Otros nombres: Copete amarillo. Frutero corona amarilla. Pardito copete amarillo. Tangará de corona amarilla.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16 cm.
Peso: Short (1971): N= 1 (M) 16,2, N= 1 (H) 18,6 g; Contreras (1983c): N=3 (M) 21,8, 22,3 y 22,2 g, N= 3 (H) 23,7, 22,5 y 21,3 g; Darrieu y Camperi (1994): N= 3 (M) X: 22,7 g (Rango 21,6 a 23,8), N= 3 (H) X: 23,5 g (Rango 23,1 a 24,4); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 3 (M) X= 22,2 g (Rango 21,5 a 23,0)
Coloración. Pico gris azulino. Patas grisáceas. Iris pardo rojizo.
Macho. Frente y franjas oculares negras. Corona amarilla, formando una cresta. Dorsal parda oliváceo. Ventral ocráceo. Alas negras con mancha blanca en las láminas internas de las remeras. Cola negra.
Hembra. Más pálida. Sin negro ni amarillo en la cabeza.

COMPORTAMIENTO



Alimentación
Bodrati (2006b).Frutode *Plinia trunciflora*.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Estrato medio en selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
von Ihering (1900). Hilty (2011)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho:franjas oculares y cola, negras. Copete amarillo. Alas negras con banda blanca, visible en vuelo. Hembra: sin negro ni amarillo en la cabeza.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Trichothraupis melanops (Vieillot, 1818) en Misiones, norte de Corrientes, este de Chaco, Entre Ríos, Salta y Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Dos poblaciones separadas, una en la ladera este de Los Andes en Perú, Bolivia y extremo noroeste de Argentina y la segunda en la Selva Atlántica en el sureste de Brasil, noreste de Argentina, este de Paraguay y norte de Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes

Citas: Capllonch et al. (2005a); Contreras (1980-81, 1983c, 1987b); Darrieu y Camperi (1994); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Nores (1986a); Short (1971)

Entre Ríos
Citas: Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009) Camperi et al. (2013)

Misiones
Citas: Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Krauczuk (2008); Martínez Gamba (2014); Pereyra (1951); Salvador y Di Giacomo (2014); Straneck (1990g); White (1882)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Olrog (1979d)

FRUTERO CORONADO *Tachyphonus coronatus* (Vieillot, 1822)

Otros nombres: Frutero de corona roja. Tangará negro chico. Tordo de bosque.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16,5 cm.
Peso: Short (1971): N= 2 (M) 26 y 27,3 g; Belton (1985): N= 2 (M) 26 y 28 g, N= 1 (H) 27 g
Coloración. Pico negro, mandíbula gris azulina. Patas pardo grisáceas. Iris pardo.
Macho. Negro con la corona semioculta roja. Tapadas internas de las alas, blancas. Alas y cola, negras.
Hembra. Cabeza parda. Dorsal castaña. Ventralmente canela con escasas estrías grisáceas en el pecho. Alas pardas oscuras con las barbas externas castañas. Cola castaña.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Cazetta et al. (2002).**Vegetales:**Fruto*Talauma ovata.*
Bodrati (2006b). **Vegetales:**Fruto*Pliniatrunciflora*.
Bodrati y Haene (2006).**Vegetales:**Fruto*Psychotria carthagenensis.*
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.).El canto está compuesto por fuertes silbos, Tibie . sidip .. tibeg .. sibip .. tiep .. sibig .. tibep .

HÁBITAT
Estrato bajo y medio en selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
von Ihering (1900):

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Macho: negro con la corona roja. Tapadas internas de las alas, blancas, visibles en vuelo. Hembra: castaña. Ventralmente canela con el pecho estriado.
Diferenciarlos del Frutero negro.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) en Misiones y norte de Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Margenes de la Selva Atlántica en el sureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes
Citas: Capllonch et al. (2005); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1994); López-Lanús et al. (2013b); Short (1971)

Misiones
Citas: Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b, 2912b); Bodrati y Salvador (2015a); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Krauczuk (2008); Martínez Gamba (2014); Straneck (1990g)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguzú, dpto. Iguazú, 07-02-1975)

FRUTERO NEGRO *Tachyphonus rufus* (Boddaert, 1783)

Otros nombres: Boyerín. Boyerín de ala blanca. Boyero ala blanca. Frutero. Tangará negro grande. Tordo de bosque.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17 cm.
Peso: Contreras (1983c): N=3 (M) 30,5, 37,6 y 35,6 g, N= 1 (H) 34,5 g; Di Giacomo (2005h): N= 12 (M) X= 35,5 g (Rango 31,7 a 39,5), N= 18 (H) X= 35,0 g (Rango 31,2 a 42,8); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 13 (M) X= 36,9 g (Rango 33,0 a 40,0), N= 10 (H) X= 35,7 g (Rango 28,0 a 42,0)
Coloración. Pico negro con base de la mandíbula gris plomizo. Patas negras o gris oscuro. Iris pardo.
Macho. Negro con blanco en los "hombros". Cubiertas internas de las alas blancas.
Hembra. Castaña. Alas pardas oscuras con las barbas externas castañas. Cola castaña.

COMPORTAMIENTO
Anda en parejas. Se alimenta de insectos (caza al vuelo), frutas, flores.

Alimentación
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:** Pétalos *Achmea distichantha*. Frutos*, Celtis iguanaea, Citrus* sp.*, Chrysophyllum gonocarpum, Harrisia martinii, Lycium moronguii, Rivina humilis, Schinus fasciculatus, Trichilia catigua, Vassobia breviflora, Urera baccifera,* Inflorescencia *Syagrus romanzoffiana.* Flor *Urera baccifera, Rhipsalis lumbricoides,* **Insectos:** Termitas aladas. **Otro**s: Desperdicios y restos de comida.
De la Peña (2011a).**Vegetales:**Frutos de*Carica papaya,Citrus grandis,Citrus reticulatus,Citrus sinensis*.



Esperanza.Santa Fe.22-07-1972. Hembra.

HÁBITAT

Estrato medio y alto en sabanas, bosques, claros de selvas, selvas. También plantaciones frutales, en áreas urbanas y periurbanas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Formosa, Chaco.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Semiesfera de fibras vegetales y hojas.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica en noviembre y diciembre. Se hallaron 4 nidos.

Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Parque Nacional Pilcomayo, Formosa, 23-11-1985, nido con 3 huevos. Se hallaba en una isleta de bosque, en un manchón de caraguataes, a 55 cm de altura en el centro de un caraguatá (*Pseudoananas sagenaria*) de gran tamaño, semiesfera bien elaborada de tallos blandos, tallos de helechos y por fuera trozos de hojas de caraguatá, por dentro forrado con fibras de hongos, tiene un diámetro externo de 11 cm, diámetro interno 7 cm, altura 12 cm y 5 cm de profundidad.

Salvador y Bodrati (2014a). Parque Provincial Pampa del Indio, Chaco, Bodrati en noviembre de 1999, localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*



HUEVOS

Pone 3 huevos, blancuzcos con leve tinte rosáceo, con notables pintas y manchas negro violáceas, algo más comunes hacia el polo obtuso.

Medidas

Di Giacomo (2005h): 24,3 a 25,4 x 18,4 a 19,6 X= 24,7 x 18,9 (N= 4)

Salvador y Salvador en De la Peña (2010b): 23,7 x 17,6, 23,0 x 16, 7, 24,7 x 18,0

Pesos
Di Giacomo (2005h): 4,0 a 5,0 X= 4,4 (N= 4)
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b): 3,5, 3,0, 3,7

Otros
Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: negro con "hombros" blancos. Hembra: castaña.
El macho se diferencia del macho del Frutero coronado por no tener la corona roja y visibles, con el ave asentada, las plumas blancas de los "hombros". La hembra, de la correspondiente del Frutero coronado por ser de mayor tamaño y no tener estrías en el pecho.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Tachyphonus rufus (Boddaert, 1783)Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, sur de Misiones, Corrientes Entre Ríos, centro y norte de Santa Fe y noreste de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Distribución en parches en: Costa Rica, Panamá y Ecuador por un lado.Norte de Sudamérica: Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, las Guayanas y desde Brasil, Paraguay, Argentina, completando Perú y Bolivia por el oeste.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Darrieu y Camperi (2001a); Klimaitis y Moschione (1987a); Moschione (1989); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938a, 1938b, 1951); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Schmidtutz y Aguilán (1989)

Chaco
Citas:Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras (1983c); Hartert y Venturi (1909); Moschione y Bishels (2005)

Observaciones: De la Peña (Cerrito, dpto. Bermejo, 05-10-1972)

Córdoba
Citas:Nores et al. (1983); Nores y Yzurieta (1981); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Capllonch et al. (2005); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1983c, 1987b); Darrieu y Camperi (1994); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá, 19-09-1979)

Entre Ríos
Citas: De la Peña et al. (2003, 2012b); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008)



Formosa
Citas: Contreras (1987c, 1993b); Chebez et al. (1998); Di Giacomo(2005h); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Coconier et al. (2007); Moschione y Segovia (2005),

Misiones
Citas: Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: De la Peña et al. (2003b, 2011f); Giai (1950); Pautasso (2002b)

FUEGUERO OSCURO *Ramphocelus carbo* (Pallas, 1764)

Otro nombre: Fueguero pico plateado.Sangre de toro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18 cm.
Peso: Hilty (2011): 23,5-37,5 g
Coloración. Maxilar pardo grisáceo. Mandíbula plateada. Patas pardo grisáceas. Iris pardo rojizo.
Macho. Mancha blanca plateada en la mandíbula. Dorsal marrón-castaña. Garganta y pecho rojizos. Resto de la parte ventral negro.
Alas y cola negruzcas.
Hembra. Mandíbula grisácea. Parda rojiza.

HÁBITAT
Bordes de selvas, jardines.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: mandíbula blanca. Rojizo y negro. Hembra: parda rojiza.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Ramphocelus carbo (Pallas, 1764) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Ocho subespecies. Amplia área de distribución por Sud América desde el norte hasta Paraguay y noreste de Argentina. Comprende: Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Moller Jensen (2006); Villegas (2014)

FUEGUERO ESCARLATA *Ramphocelus bresilius* (Linnaeus, 1766)

Otros nombres: Pipirá roja. Tangará escarlata.


DESCRIPCIÓN
Largo: 18,5 cm.
Peso: Hilty (2011): 27,9-35,5 g
Coloración. Pico negruzco. Base de la mandíbula más claro. Patas pardo grisáceas. Iris rojizo.
Macho. Rojo. Alas y cola negras.
Hembra. Cabeza y cuello pardos. Dorsal parda rojiza. Rabadilla y parte ventral castañas. Alas y cola pardas oscuras.

HÁBITAT
Estrato alto en capueras y orillas de selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
von Ihering(1900)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: alas y cola, negras. Mancha plateada en la base de la mandíbula.
Hembra: parda. Rabadilla y parte ventral, castañas.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Ramphocelus bresilius dorsalis (P. L. Sclater, 1855) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Selva Atlántica en el sureste de Brasil y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Ramphocelus bresilius dorsalis (P. L. Sclater, 1855)

Misiones
Citas:Chebez (1996a, 2009); Chebez et al. (1984); Höy (1973a); Saibene et al. (1996)

FRUTERO AZUL *Stephanophorus diadematus* (Temminck, 1823)

Otros nombres: Cardenal azul. Cardenal imperial. Imperial.

DESCRIPCIÓN
Largo: 19 cm.
Peso: Belton (1985): N= 1 (M) 35 g; Montaldo (2005): N= 2 X= 37,6 g
Coloración. Pico negruzco. Patas grisáceas. Iris pardo.
Frente, lorum, barba y garganta negros. Anterior de la corona rojo. Resto blanco. Dorsal y ventralmente azul brillante. Alas negruzcas con las barbas externas ribeteadas de azul. Cola negruzca con ribetes azules.

COMPORTAMIENTO



Alimentación
Brocca (1977). **Vegetales:**Frutos de Tala.
Baliño (1984). **Vegetales:** Fruto*Melia azedarach.*
Montaldo (1993). **Vegetales:**Fruto*Ligustrum* sp.
Roitman et al. (1997). **Vegetales:** Pétalo*Myrrhinium atropurpureum*.
Montaldo (2000). **Vegetales:***Allophylus edulis, Blepharocalyx salicifolius, Ligustrum lucidum*, *Myrsine laetevirens.*
Babarskas et al. (2003). **Vegetales:**Frutos de Zarzapatilla colorada y brotes de Sauce.
Montaldo (2005). **Vegetales:***Blepharocalyx salicifolius, Ligustrum lucidum, Ligustrum sinense*, *Myrsine laetevirens,Myrceugenia glaucescens*, *Rubus ulmifolius.*
Olson y Alvarenga (2006). **Insectos:**Isoptera (Termitas).
Bodrati (2006b). **Vegetales:** Fruto *Plinia trunciflora.*
Bodrati y Haene (2006). **Vegetales:** Fruto *Psychotria carthagenensis.*
Sazima y Sazima (2007). **Vegetales:** Pétalo *Acca sellowiana*.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es la repetición de una estrofa silbada: Tiuglítiuglítidiutidiliuihh ...

HÁBITAT
Estrato medio y alto en selvas, bosques, selvas en galería.

NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en Entre Ríos, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	

Semiesfera de fibras vegetales. Internamente hojas o raicullas.

Uranga (*in litt*.). Aldea San Antonio, dpto. Gualeguaychú, Entre Ríos, 23-11-2012, nido con 2 huevos.
Hartert y Venturi (1909), Barracas, Buenos Aires, nidos a 4 o 5 m de altura en árboles frutales, huevos similares a los de *Thraupis bonariensis*.
Babarskas y López Lanús (1993). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 09-11-1991, nido a 2,10 m del suelo en una rama envuelta por una enredadera. Semiesfera traslúcida de zarcillos de enredaderas en la parte externa y raicillas compactas en la interna. Mide: 10,5 cm de diámetro externo; 7,5 en el interno; 8,5 cm de alto y 5 cm de profundidad. Tenía un huevo.

HUEVOS
Pone 4 huevos blanco azulados con pintas rojizas.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 25 a 26,5 x 16 a 17,5
Babarskas y López Lanús (1993): 23,0 x 16,3



Aldea San Antonio. Entre Ríos. 23-11-2012 Foto: Máximo Uranga

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Azul, cara negra, corona blanca.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Stephanophorus diadematus (Temminck, 1823) en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y noreste de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Restringida área de distribución en el sueste de Brasil, este de Paraguay,Argentina y Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas:Babarskas y López Lanús (1993); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis y Moschione (1986, 1987a); Mérida y Bodrati (2006); Montaldo (1993, 2000, 2005); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra(1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Sclater y Hudson (1888); Soave et al. (1999b)



Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Roitman et al. (1997) Straneck (1990c)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1994)

Misiones
Citas: Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2008); White (1882)

SAÍRA DE ANTIFAZ *Pipraeidea melanonota* (Vieillot, 1819)

Otros nombres: Tangará de antifaz. Viuda.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Contreras (1983c): N=2 (M) 21,8 y 21,5 g
Coloración. Pico oscuro, mandíbula gris pálido. Patas grises. Iris pardo rojizo.
Macho. Frente y antifaz negros. Corona, rabadilla y "hombros" celestes. Espalda negro azulada. Ventral ocrácea. Alas negras con las barbas ribeteadas de celeste. Cola negra.
Hembra. Más pálida.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Estrato medio y alto de selvas, bosques, capueras, yungas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N								N		



El nido es una plataforma de tallos de yuyos. Internamente nervaduras y algunas cerdas. Sostenido en ramas.
Expuesto. Elaborado.

Castelino (1985b). Parque Nacional Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 14-10-1984, nido en construcción a 1 m del suelo. Puso 3 huevos. Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
De la Peña (2013c). Yatasto, dpto. Metán, Salta, 06-02-1983, nido a 3,50 m de altura, en una enredadera, 3 huevos.
Medidas: Diámetro total: 14 cm. Diámetro: 6 cm. Profundidad: 3,5 cm. Alto: 6 cm.

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, verdes pálidos con pintas castañas, pardas y grises, distribuidas por toda la superficie pero más concentradas en el polo mayor.



Medidas
Castelino (1985b): 21,5 x 16,0 y 22,6 x 15,0
De la Peña (2013c):22,4 a 23,1 x 17,8 a 18 X= 22,6 x 17,9 (N= 3)
Peso
De la Peña (2013c): 3,694 a 3,765 X= 3,727 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,195 a 0,200 X= 0,198 (N= 3)

Otros
Castelino (1985b). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.



Yatasto.Salta.06-02-1983

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Antifaz negro. Corona, rabadilla y "hombros" celestes. Ventral ocráceo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Pipraeidea melanonota melanonota (Vieillot, 1819) en Misiones, Corrientes, noreste y sur de Buenos Aires.Observada además en Córdoba y La Pampa; *Pipraeidea melanonota venezuelensis* (P. L. Sclater, 1857) entre los 1000 y los 2500 m de altura en Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Dos poblaciones separadas, una viene por el oeste por la cordillera en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y noroeste de Argentina y la otra por la Selva Atlánticaen Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Pipraeidea melanonota melanonota (Vieillot, 1819)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey y Carrete (1999); Döke (2001); Hartert y Venturi (1909); Jaramillo (2000); Moschione y San Crsitóbal (1991b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Savigny (2003)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Nores e Yzurieta (1982a, 1983a); Nores et al. (2000); Nores y Cerana (1990)

Córdoba
Observaciones: S. Salvador (Proximidades de Villa María. Posiblemente escapado de cautiverio)

Corrientes
Citas: Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1983c, 1987b); Contrerasy Contreras (1993); Darrieu y Camperi (1988); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos
Citas: Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008)

Misiones
Citas: Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Castelino (1985b); Chebez (1996a); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2008); Martínez Gamba (2014); Straneck (1990g)

Pipraeidea melanonota venezuelensis (P. L. Sclater, 1857)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Ortiz y Capllonch (2008)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009) ; Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

La Rioja
Citas:Lucero (2012f)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1988, 1990); Coconier et al. (2007); De la Peña (2013c); Moschione et al. (2013); Ortiz y Capllonch (2008); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (Camino de Cornisa, dpto. La Caldera, 04-12-1977; 30-11-1978; 11-02-1983)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Luceroy Chebez (2011)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Echevarría et al. (2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Capllonch (2008); Ortiz y Aráoz (2014); Rougés y Blake (2001)

NARANJERO *Pipraeidea bonariensis* (Gmelin, 1789)

Otros nombres: Chouí. Festé.Frutero.Frutero naranjero.Santa Lucía.Siete colores.Siete colores naranjero. Siete cuchillas. Siete cuchillos. Siete vestidos. Virreina.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 8 X= 31,3,3 g (Rango 30,0 a 34,0); Salvador (1988): N= 3 (M) X= 32,7 g (Rango 32,0 a 34,0); Darrieu y Camperi (1994): N= 1 juvenil 41,7 g, N= 1 (H) 39,5 g; Salvador (2014a) : N= 7 (M) X= 33,1 g (Rango 31,2 a 35,5); N= 6 (H) X= 31,8 g (Rango 30,2 a 33,8)
Coloración. Pico: maxilar negruzco, mandíbula gris pálido. Patas pardo grisáceas. Iris rojizo.

Macho. Cabeza celeste. Lorum y dorsal negros. Rabadilla y pecho anaranjados. Abdomen anaranjado pálido. Alas y cola negruzcas con las barbas externas ribeteadas de celeste.
Hembra. Dorsal gris con tono oliváceo. Rabadilla canela. Ventral ocrácea. Alas pardas oscuras con las secundarias ribeteadas de ocre-celeste. Cubiertas alares con tono celeste verdoso. Cola parda oscura, con las barbas externas con tono celeste verdoso.

COMPORTAMIENTO
Solitario, en pareja o en grupos. Rápidos desplazamientos.
De la Peña (2006d). Recolecta alimentos en ramas y follaje, entre 3 y 9 m de altura. Caza en vuelo insectos. Utiliza distintas técnicas. Puede cazar en vuelo insectos. Deglute entero los frutos de Tala, los pellizca sin cortarlo de la planta y también tritura. A los frutos de Ligustro y de Naranjillo (Solanum chroniotrichum) los tritura y tira las semillas o a veces los traga enteros. A las Moras las tritura (como si masticara)

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales: Frutos** Helecho plumoso (*Asparago setaceus*), Lantana (*Lantana camara*), Chili (*Lycium americanum*), Banana (*Musa paradisiaca*). Hojas de Cina cina (*Parkinsonia aculeata*)
Zotta (1932). **Vegetales.**
Zotta (1936). **Vegetales:** Semillas. Vegetales.
Williamson (1975). **Vegetales:** Brotes *Broussonetia papyrifera, Ulmus pumila.*
Roitman et al. (1997). **Vegetales:** Pétalo *Myrrhium atropurpureum*.
De la Peña y Pensiero (2003). **Vegetales:** Exudado gomoso *Acacia caven.* Fruto *Celtis ehrenbergiana, Holmbergia tweedii, Araujia brachystephana, Morus alba, Phoradendron* sp., *Sapium haematospermun, Schinus longifolia.* Flor *Gleditsia triacanthos.* Semilla con arilo *Passiflora caerulea*. Corteza de agalla *Prosopis alba.*
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:** Fruto *Celtis iguanea, Citrus* sp., *Lycium moronguii.*
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Fruto *Celtis* sp., *Cestum* sp., *Ligustrum* sp., *Pyracantha coccinea, Melia azedarach, Passiflora caerulea*, Hojas y frutos no determinados
Bodrati (2006b). **Vegetales:** Fruto *Plinia trunciflora.*
Bodrati y Haene (2006). **Vegetales:** Fruto *Psychotria carthagenensis.*
De la Peña (2011a). **Vegetales:** Exudado gomoso *Acacia caven*, Pimpollo *Accacia atramentaria, Acacia caven, Celtis ehrenbergiana.* Frutos de *Carica papaya, Castella coccinea, Celtis ehrenbergiana, Citrus grandis, Citrus reticulatus, Citrus cinensis, Condalia buxifolia, Ficus carica, Grabowskia duplicata, Holmbergia tweedii, Ligustrum lucidum, Lycium cestroides, Morus alba*, *Muehlenbeckia sagittifolia, Phoradendron liga, Pyracantha angustifolia, Sapium haematospermun, Schinus fasciculata, Schinus longifolius*, *Solanum chroniotrichiu, Styphnolobium japonicum, Ulmus procera, Vitis vinifera, Zizyphus mistol*. Semilla con arilo *Passiflora caerulea, Passiflora morifolia*. Hoja *Baccharis salicifolia*. Flor *Citrus cinensis, Eucaliptus* sp. *Gleditsia triacanthos*. Hoja *Geoffroea decorticans, Morrenia brachystephana, Schinus fasciculatus.* Corteza de agalla *Prosopis alba.*
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es la repetición de agudos silbos: Siusit . siut .. siusuithh.

HÁBITAT
Sabanas, bosques, parques.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

El nido tiene forma de taza. Es construido con fibras vegetales entrelazadas. Sostenido en las ramas.Expuesto. Elaborado





Miller (1917). Salta, nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Dinelli (1924). Tucumán, nido en diciembre y enero.
Pereyra (1938b). La Pampa, nidifica.
Pereyra (1938b). Noreste de la provincia de Buenos Aires, nidifica en noviembre.
Höy y Ottow (1964). Salta nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 13 nidos.
Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nido en noviembre de 2000.
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Coraya, Humahuaca, Jujuy, 21-02-1995, 3 nidos: 2 con 3 huevos y otro con 2.
Un nido se hallaba en una amplia quebrada, en el lecho de un cauce seco, a 3 m de altura en un *Prosopis ferox*, semiesfera chata elaborado de claveles del aire y palitos sin espinas, en el interior gramíneas muy delicadas, con un diámetro externo de 13 cm, diámetro interno 6,5 cm, altura 7 cm y 4 cm de profundidad.
Otro estaba en la ladera de un cerro, en un *Prosopis ferox* a 4,1 m de altura, similar al anterior.
Otro en una quebrada con abundantes cardones, a 1,9 m de altura en un *Prosopis ferox*, de construcción y tamaño similar a los anteriores.
Salvador (2012f). Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba,nidos parasitado por *Molothrus bonariensis*.
De la Peña (2013c). La Granja, dpto. Colón, Córdoba, 13-01-1971, nido con 2 pichones; Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 12-10-1998 y 27-10-1998, nidos en construcción; Las Estancias, dpto. Andalgalá, Catamarca, 16-01-2003, 3 huevos.
Medidas: Diámetro total: 10 cm. Diámetro interno: 6 cm. Profundidad: 4 cm. Alto: 9 cm.
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Provincial Pampa del Indio, Chaco, Bodrati en noviembre de 1998, localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, 3 nidos con 3, 3 y 2 huevos cada uno.
Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 9 nidos. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*

Huevos

Pone 3 huevos, ovoidales, verdes pálidos o blanquecinos verdosos, con pintas, manchitas y rayitas, pardas oscuras y grises, más concentradas en el polo mayor.



Medidas

Dinelli (1924): 25,0 x 17,0
Smyth (1928): 24,5 a 25,5 x 17,5 a 18,0
Pereyra (1938b): 26,0 x 18,0
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b): 24,6 a 27,9 x 17,2 a 17,9 X= 26,0 x 17,5 (N= 8)

De la Peña (2013c): 23 a 24,5 x 17,5 a 18,5 X= 23,6 x 18 (N= 4)

Peso
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b): 3,4 a 4,0 X= 3,7 (N= 8)
De la Peña (2013c): cáscara 0,230 (N= 1)


Esperanza.Santa Fe.27-10-1998


Jesús María. Córdoba. 31-01-2015
Comiendo frutos de Tala.


Esperanza. Santa Fe. 27-10-1998


Jesús María. Córdoba. 26-08-2008

Generalidades
Contreras (1990b). Los huevos son puestos en días corridos. El período de incubación es de 14 días.
El pichón permanece en el nido 19-20 días.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido 12-13 días.

Otros
Salvadorti en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Salvador (2012f). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: cabeza celeste. Dorsal negra. Rabadilla y pecho anaranjados.
Hembra: dorsal gris olivácea. Ventral ocrácea.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Pipraeidea bonariensis bonariensis (Gmelin, 1789) desde el sur de Misiones y Corrientes hasta Buenos Aires y *Pipraeidea bonariensis schulzei* Brodkorb, 1938 desde el norte, al oeste de los ríos Paraguay y Paraná hasta Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. Observado en Santa Cruz.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies.Desde Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Pipraeidea bonariensis bonariensis (Gmelin, 1789)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1919b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré (2006); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Gibson (1920); Holland (1893a); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987a); Leveau y Leveau (2001, 2004); Lucero (1982); Maugeri (2002b.); Mérida y Bodrati (2006); Narosky et al. (1990); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Roesler (2001a); Soave et al. (1999b); White (1882); Zapata (1998)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b, 1990b); Darrieu y Camperi (1994); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Roitman et al. (1997); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975)

Misiones
Citas: Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2008); Martínez Gamba (2014)

Observaciones: De la Peña (Santo Pipó, dpto. San Ignacio, 10-10-1981)

Pipraeidea bonariensis schulzei Brodkorb, 1938

Catamarca
Citas: Alabarce et al. (1990); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); De la Peña (2013c); Olrog (1958b); Ortiz y Capllonch (2008); Vides Almonacid (1999); White (1882)

Observaciones: De la Peña (El Alto, dpto. El Alto, 29-01-1977; El Alamito, dpto. Andalgala, 18-12-1999)

Chaco
Citas:Bodrati y Pietrek (2000); Moschione y Bishels (2005); Ortiz y Capllonch (2008)

Chubut
Citas: Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Castellanos (1934); Dardanelli et al. (2006b); Dardanelli y Nores (2001); De la Peña (2013c); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador(1983); Salvador y Bodrati (2013a); Sferco y Nores (2003); Straneck (1990d); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Cuchi Corral, dpto. Punilla, 20-01-2000; Jesús María, dpto. Colón, 01-12-2009; Ascochinga, dpto. Colón, 19-01-2010)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Castellanos (1934); Chebez et al. (1998); Lucero(1982); Moschione y Segovia (2005); Olrog (1958, 1971b); Ortiz y Capllonch (2008); Salvador (1988, 2015); Zotta (1932)

Observaciones: De la Peña (Humahuaca, dpto. Humahuaca, 11-02-1983)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Koslowsky (1895); Olrog (1958)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Di Giacomo(2005h); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014); Wetmore (1926b); Zelaya et al (2013)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Navas y Bó (1986); Pereyra (1937); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b); Williamson (1975)

La Rioja
Citas: Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu y Segura (2015); Gómez (2006); López de Casenave (2001); Lucero (2013f); Marone (1992a); Roig (1965); Sanzín (1918); Wetmore (1926b)

Neuquén
Citas:Acerbo (2000); Chebez et al. (1993); Fiori y Zalba (1999); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas:Gazari (1967); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Pérez et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Río Colorado, dpto. Pichi Mahuida, 26-11-2000)

Salta
Citas: Alabarce y Lucero (1977); Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013); Olrog (1958); Ortiz y Capllonch (2008); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (Cachi, dpto. Cachi, 06-02-1977)

San Juan
Citas:Acosta y Murúa (2001); Camperi y Darrieu (2004); Gelain (2008a, 2014a); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene (1987); Herrera et al. (2013) ; Lucero (2013f, 2013i); Ortiz y Capllonch (2008)

San Luis
Citas: Casares (1944); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993); Ortiz y Capllonch (2008); Partridge (1953c)

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997; San Luis, dpto. La Capital, 16-10-2004; Bearley, dpto. La Capital, 16-10-2004)

Santa Cruz
Citas: Roesler et al. (2014)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2002, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d)

Santiago del Estero
Citas: López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991); Ortiz y Capllonch (2008)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Antelo y Brandán (2006); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch et al. (2011b); Dinelli (1924); Echevarría et al. (2011b); Handford (1983); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Olrog (1958); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Capllonch (2008); Ortiz y Ruiz (2011, 2013)Ortiz y Aráoz (2014)

Observaciones: De la Peña (San Miguel de Tucumán, dpto. Capital, 30-01-1977)

CELESTINO COMÚN *Thraupis sayaca* (Linnaeus, 1766)

Otros nombres: Azulejo. Azulejo sayacá. Celestecito. Celestino. Celestito. Chú. Esmeralda. Frutero azulejo. Naranjero. Naranjero azul. Pájaro chogüí. Pájaro mamonero. Siete cuchillas azulado. Testé. Verdón. Virreina.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 5 X= 41,0 g (Rango 42,0 a 44,0); Contreras (1979f): N= 2 (M) 32,2 y 32,5 g, N= 4 (H) 30,5, 33,9, 29,5 y 33,0 g; Salvador (1988): N= 1 (H) 30,0 g; Camperi (1992a): N= 2 (M) 37,0 y 38,1 g; Darrieu y Camperi (1994): N= 3 (M) 29,9, 36,2 y 38,2 g, N= 1 (H) 34,6 g; Montaldo (2005): N= 3 X= 32,2 g; Di Giacomo (2005h): N= 7 X= 34,5 g (Rango 30,0 a 41,5); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 4 X= 33,4 g (Rango 31,6 a 36,0), N= 11 X= 32,2 g (Rango 29,7 a 37,7)
Coloración. Pico gris azulado o gris celeste con ápice de la maxila negro. Patas gris azuladas. Iris pardo oscuro.

Dorsal gris con tono celeste verdoso. Ventral gris clara con suave tono celeste. Abdomen blanquecino. Alas pardas oscuras con las barbas externas celeste verdosas. Cubiertas alares celestes verdosas. Cola negruzca con tono celeste verdoso.

COMPORTAMIENTO
Solitario o en pareja. Inquieto. Se desplaza ágilmente.

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales: Frutos** Lantana (*Lantana camara*), Banana (*Musa paradisiaca*), Higo (*Ficus carica*). Flor Eucalipto (*Eucaliptus camaldulensis*). Semilla Brucuyá (*Passiflora caerulea*)
Baliño (1984). **Vegetales:** Fruto *Melia azedarach*.
Montaldo (1993a). **Vegetales:** *Ligustrum* sp.
Roitman et al. (1997). **Vegetales:** Pétalo *Myrrhium atropurpureum*.
Montaldo (2000). **Vegetales:** Fruto *Allophylus edulis, Blepharocalyx salicifolius, Ligustrum lucidum*, *Myrsine laetevirens.*
Montaldo (2005). **Vegetales:** *Blepharocalyx salicifolius, Ligustrum lucidum*.
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:** Fruto *Allophylus edulis, Celtis iguanea, Cereus forbesii, Citrus* sp., *Chrysophyllum gonocarpum,* Chaucha *Chloroleucon tenuiflorum*. Brotes. Hojas *Melia azedarach*. Fruto *Myrsine laetevirens, Ficus luschnathiana, Guettarda uruguensis*, *Phoradendron balansae, Sapium haematospermum, Psidium guajava, Schinus fasciculata, Vassobia breviflora*. Flor *Senna bicapsularis.*
Bodrati (2006b). **Vegetales:** Fruto *Plinia trunciflora.*
Bodrati y Haene (2006). **Vegetales:** Fruto *Psychotria carthagenensis.*
Villegas y Blendinger (2009). **Vegetales:** Fruto *Eugenia uniflora*.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** *Ligustrum* sp. *Melia azedarach*.
De la Peña (2011a). **Vegetales:** Fruto *Acca sellowiana, Carica papaya, Cecropia pachystachya, Celtis ehrenbergiana, Citrus grandis, Citrus reticulatus, Citrus sinensis, Ligustrum lucidum, Morus alba, Myrsine laetevirens*. Flor *Eucaliptus* sp.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.



Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es una sucesión de agudos silbos: Siusilsilsith ...

HÁBITAT
Bosques, orillas de selvas, sabanas, parques, plantaciones de plantas exóticas, de frutales, arboledas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa,Chaco, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

El nido tiene forma de taza. Es construido con fibras vegetales. A veces tiene en la base palitos. Internamente raicillas y algunas cerdas. Asentado o sostenido en ramas.Expuesto. Elaborado.

Friedmann (1929). Tucumán, Shipton y Girard nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Friedmann et al. (1977). Tucumán, King nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.



Alabarce y Antelo (1998). San Felipe, dpto. Lules, Tucumán, 2 nidos en octubre.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre octubre y enero. Se hallaron 70 nidos.
De la Peña (2013c). Campo Andino, dpto. La Capital, Santa Fe, 07-11-1971, nido con un huevo y uno de *Molothrus bonariensis*; La Gallareta, dpto. Vera, Santa Fe, 15-11-1971, un huevo; Cayastá, dpto. Garay, Santa Fe, 23-10-1979 y 04-12-1988, uno con 3 huevos y el otro con 2 pichones; Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 03-11-1998, no observado y Aconquija, dpto. Andalgalá, Catamarca, 09-01-1999, no observado.
Medidas: Diámetro total: de 8 a 11 cm. Diámetro interno: 6 cm. Profundidad: 3,5 cm. Alto: de 7 a 8 cm.
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Provincial Pampa del Indio, Chaco, Bodrati localizó dos nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", 2 nidos con un huevo cada uno.

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, verdes claros o cremas con pintas y manchitas pardas, violáceas, negras y grises distribuidas por toda la superficie, a veces más concentradas en el polo mayor. Pueden presentar breves rayitas negras.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 22,0 a 25,0 x 16,0 a 18,0
Smyth (1928): 25,0 x 17,0 a 17,5

Di Giacomo (2005h): 21,2 a 28,6 x 15,1 a 17,4 X= 23,0 x 16,2 (N= 56)
De la Peña (2013c): 24,2 a 24,5 x 17 a 17,5 X=24,3 x 17,2 (N= 4)
Pesos
Di Giacomo (2005h): 2,0 a 3,9 X= 2,9 (N= 56)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,181 a 0,200 X= 0,193 (N= 4)

Generalidades
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 14 días. La pareja alimenta a los pichones. Permanecen en el nido entre 13 y 17 días.

Otros
Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Friedmann (1929). Friedmann et al. (1977). De la Peña (2013c). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*
Cano (2005). Un ejemplar con Albinismo.



Depredación
Di Giacomo (2005h). Adulto capturado por Caburé chico (*Glaucidium brasilianum*). Depredación de nidos por Urracas comunes (*Cyanocorax chrysops*)y por Tucanes grandes **(***Ramphastos toco***)**

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Celeste. Abdomen blanquecino.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Thraupis sayaca sayaca (Linnaeus, 1766)en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y norte de Buenos Aires y *Thraupis sayaca obscura* Naumburg, 1924 desde

Formosa, Salta y Jujuy hasta Mendoza, Córdoba, La Pampa, Río Negro, Santa Fe.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Thraupis sayaca sayaca (Linnaeus, 1766)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1919b); Darrieu y Camperi (2001a); Durnford (1878); Grant (1911c); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987a); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Montaldo (1993, 2000, 2005); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roesler (2001a); White (1882)





Esperanza.Santa Fe.24-09-2011



Esperanza.Santa Fe.24-09-2011



Campo Andino.Santa Fe.07-11-1971
Parasitado por *Molothrus bonariensis*

Chaco
Citas:Bodrati y Pietrek (2000); Bodrati y Salvador (2015a); Chatellenaz (2005a); Salvador y Bodrati (2014a)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1994); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008); Wilson (1977)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 18-09-79 ; Gobernador Virasoro, dpto. Santo Tomé, 13-12-2002)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992); De la Peña (2002, 2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Pereyra (1927e); Raffo et al. (2008); Roitman et al. (1997); Serié y Smyth (1923)

Misiones
Citas: Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2008); Martínez Gamba (2014); Straneck (1990e)

Observaciones: De la Peña (Santo Pipó, dpto. San Ignacio, 10-10-1981)

Thraupis sayaca obscura Naumburg, 1924

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); De la Peña (2005)

Observaciones: De la Peña (El Alamito, dpto. Andalgalá, 16-12-1999)

Chaco
Citas: Moschione y Bishels (2004); Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a)

Observaciones: De la Peña (Cerrito, dpto. Bermejo, 06-05-1988)

Córdoba
Citas: Heredia (2006); Miatello et al. (1991, 1994); Nores et al. (1983); Nores (1996); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Jesús María, dpto. Colón, 14-06-2004)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Ordano et al. (1999); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b); Zelaya et al (2013)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Fiora (1934); Lucero(1982); Moschione y Segovia (2005); Olrog (1968, 1971); Salvador (1988)

Observaciones: De la Peña (El Carmen, dpto. El Carmen, 11-02-1983)

La Pampa
Citas: Bruno et al. (2009); Veiga et al. (2209)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014); Lobo Allende et al. (2014); Olrog (1979); Short (1975)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Seewald y Pérez (2009)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1988, 1990); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b); Salvador y Di Giacomo (2014); White (1882)

Observaciones: De la Peña (San Ramón de la Nueva Orán, dpto. Orán, 02-02-1977)

San Juan
Citas: Fava et al. (2013); Herrera et al. (2013); Lucero (2013g, 2013i)

San Luis

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero
Citas: López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996, 1998); Antelo y Brandán (2006); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009);
Capllonch (2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Cocimano et al. (2005); Echevarría et al. (2011b); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Malizia et al. (1998); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Ruiz (2011, 2013); Ortiz y Aráoz (2014); Rougés y Blake (2001); Soria et al. (2010)

Observaciones: De la Peña (Horco Molle, dpto. Capital, 11-05-1987)

CELESTINO OLIVÁCEO *Thraupis palmarum* (Wied-Neuwied, 1821)

Otros nombres: Chogüí de las palmeras. Chogüí de los cocos.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18 cm.
Peso: Willis y Oniki (2002): N= 4 (M) 37 a 46 g; Hilty (2011): 27-48 g
Coloración. Pico negro. Patas pardas. Iris pardo.
Coloración general pardusca oliva, más pálida en la cara y con reflejos violáceos en la espalda y ventralmente. Alas y cola pardas oscuras. Cubiertas alares y base de las remeras, grises olivas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

HÁBITAT
Plantaciones, selvas, orillas de selvas, palmares.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Onikis y Willis(1983a)

Otros
Chebez (2009). Iguazú, Misiones,adulto alimentando a juvenil de *Molothrus bonariensis*.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pardusco oliváceo con efecto bitonal en las alas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Thraupis palmarum palmarum (Wied-Neuwied, 1821)en Misiones, oeste de Formosa, Salta.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Amplia distribución en Sud América, desde Nicaragua hastaBrasil y Argentina. Comprende: Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Thraupis palmarum palmarum (Wied-Neuwied, 1821)

Formosa
Citas: Mazar Barner y Paermann (2001)

Misiones
Citas: Chebez (2009); Finch (1991); Monteleone et al. (2010)

Salta
Moschione et al. (2013)

SAÍRA CASTAÑA *Tangara preciosa* (Cabanis, 1850)

Otros nombres: Naranjero cabeza castaña. Tangará castaño.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16,5 cm.
Peso: Contreras (1983c): N=3 (H) 22,6, 22,3 y 22,9 g; Darrieu y Camperi (1994): N= 2 (M) 22,3 y 22,5 g
Coloración. Pico negro. Patas grises. Iris pardo.

Macho. Corona, lados de la cabeza, nuca y manto castaños rojizos. Lorum negro. Dorsal y cubiertas alares ocráceas plateadas. Ventral celeste verdoso plateado. Subcaudales castañas. Alas y cola negruzcas orilladas de azul.
Hembra. Corona y nucas castañas. Dorsal verde. Alas y cola negruzcas con las plumas orilladas de verde. Ventralmente verde pálida.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Bosques, selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Belton (1985)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: cabeza y espalda, castañas. Ventral celeste verdosos. Hembra: verdosa con la corona y la nuca castañas.
Diferenciar a la hembra de la hembra del Saíra pecho negro.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Tangara preciosa (Cabanis, 1850) en Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Observada en Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Endémico de la Selva Atlántica o Paranaense en el sureste de Brasil,este de Paraguay, Uruguay y noreste de Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Holland (1923); Pagano y Mérida (2009)

Corrientes
Citas: Contreras (1983c, 1987b); Darrieu y Camperi (1994); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos
Citas: Jonas y D. Ortiz (2010); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008)

Misiones
Citas: Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Chebez (1996a); Dabbene (1914); Navas y Bó (1988); Pereyra(1927e)

SAÍRA DE PECHO NEGRO *Tangara cayana* (Linnaeus, 1766)

Otros nombres: Saíra pecho negro. Tangará de pecho negro. Tangará monjita.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Contreras (1979f): N= 1 (M) 19,8 g, N= 1 (H) 21,6 g; Storer (1989): N= 2 (M) 19 y 29 g, N= 1 (H) 22 g; Darrieu y Camperi (1994): N= 16 (M) X= 21,5 g (Rango 19,5 a 20,9), N= 10 (H) X= 22,8 g (Rango 20,0 a 25,3)
Macho. Pico negruzco. Patas gris oscuro. Iris pardo.
Frente, cara, lados de la cabeza, garganta y centro del pecho, negros. Dorsal, lados del pecho y flancos ocráceos. Alas y cola negras con las plumas orilladas de celeste.
Hembra. Más pálida y verdosa. Garganta blanquecina. Alas y cola azules verdosas. Sin negro.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Hilty (2011)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: ocráceo con la cara, garganta y franja central en el pecho y abdomen, negras. Hembra: verdosa, sin negro.
La hembra se diferencia de la hembra del Saíra castaño por no tener castaño en la nuca y en la corona.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Tangara cayana chloroptera (Vieillot, 1819)en Misiones y noreste de Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Siete subespecies. Amplia área de distribución desde Colombia y Venezuela hasta noreste de Argentina. Comprende: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Tangara cayanachloroptera (Vieillot, 1819)

Corrientes
Citas: Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1994); Giraudo et al. (2003, 2006); Krauczuk (2006); Partridge (1964)

Misiones
Citas: Chebez (1994, 1996a); Chebez y Rolón (1989); Krauczuk (2008); Militello y Chebez (2009); Partridge (1964);
Savigny (2010)

SAÍRA ARCOIRIS *Tangara seledon* (Statius Müller, 1776)

Otros nombres: Siete colores. Tangará arcoiris. Tangará azul. Tangará cuelliverde.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.

Peso: Foster (1987): N= 4 (M) X: 18,5 g, N= 2 (H) X: 20,5 g; Storer (1989): N= 1 (H) 19 g; **Macho.**Pico negro. Patas gris oscuro a negras. Iris pardo.
Frente parda oscura. Cabeza celeste verdosa. Espalda amarilla verdosa. Dorso y garganta negros. Rabadilla anaranjada. Pecho celeste. Vientre y flancos verdes. Alas negruzcas, con las barbas externas de las secundarias ribeteadas de verde. Cubiertas alares violetas. Cola negruzca con las barbas externas ribeteadas de verde.
Hembra. Más pálida.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Foster (1990). Frutode *Allophylus edulis.*

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Hilty (2011)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Garganta negra. Espalda amarilla verdosa. Rabadilla anaranjada.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Tangara seledon (Statius Müller, 1776) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Selva Paranaense o Atlántica en sureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Martínez Gamba (2014); Pereyra(1927e); Straneck (1990g)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 07-02-1975)

TERSINA *Tersina viridis* (Illiger, 1811)

Otros nombres: Azulejo golondrina. Golondrina naranjera. Tangará golondrina.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14,5 cm.
Peso: Darrieu (1994): N= 1 (?) 28 g; Salvador (2014a) N= 1 (M) 29,6 g
Coloración. Pico negro. Patas gris córneo. Iris rojizo.
Macho. Celeste. Frente, lorum y garganta negros. Abdomen blanco. Flancos celestes con barras negras. Alas negruzcas con las barbas externas celestes. Cola negruzca con las barbas externas ribeteadas de celeste.

Hembra. Dorsal verde metalizada. Garganta ocrácea con barras pardas. Pecho verde con tenues barras pardas. Abdomen amarillento. Alas negruzcas con las barbas externas ribeteadas de verde. Cola parda con las barbas externas ribeteadas de verde.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Guerra y Marini (2002).Frutode *Struthanthus concinnus.*
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces

Straneck (*in litt*.). El canto es una compleja frase de notas muy agudas Tsiplitilísyíttlipisisyítlipi

HÁBITAT

Bosques, selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:
Hilty (2011)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Macho: celeste con la frente, garganta, punta de las alas y cola, negras. Hembra: verde. Garganta y flancos con barras.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA


Tersina viridis viridis (Illiger, 1811) en Corrientes y Misiones y *Tersina viridis occidentalis* (P. L. Sclater, 1855)en Salta y Tucumán. Observada además en Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Formosa, Salta, San Juan.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. La mayor parte de Sudamérica, Panamá, Guayana Francesa, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Tersina viridis viridis (Illiger,1811)



Misiones

Citas: Bodrati et al. (2012b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2008); Martínez Gamba (2014); Straneck (1990g)

Tersina viridis occidentalis (P. L. Sclater, 1855)

Buenos Aires

Citas: Bremen y Bremen (1987); Dabbene (1910a); Holland (1892); Jaramillo (2000); Narosky y Di Giacomo (1993)

Córdoba

Citas: Zelaya et al (2013)

Formosa
Citas: Zelaya et al (2013)

La Pampa
Citas: Darrieu (1994)

Salta
Citas: Di Giacomo et al. (1995); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Lucero (2013g)

Tucumán
Citas: Ortiz(2009); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014)

SAÍ AZUL *Dacnis cayana* (Linnaeus, 1766)

Otro nombre: Mielerito turquesa.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13,5 cm.
Peso: Belton (1985): N= 1 (M) 15,5 g, N= 1 (H) 15 g; Storer (1989): N= 3 (M) X: 16 g, N= 2 (H) X: 15,5 g
Coloración. Pico pardo, base de la mandíbula gris. Patas rosadas. Iris rojizo.
Macho. Lorum, garganta y espalda negras. Resto de la parte dorsal y ventral celeste. Alas negras con las plumas ribeteadas de celeste. Cola negra.
Hembra. Verde, cara y corona celestes. Garganta gris. Alas negruzcas. Cola negruzca con las plumas ribeteadas de verde.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
von Ihering (1900)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: celeste con la garganta, espalda, alas y cola, negras. Hembra: verde con celeste en la cabeza. Alas y cola oscuras.
Pico fino, largo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Dacnis cayana paraguayensis Chubb, 1910 en Misiones y noreste de Corrientes.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Ocho subespecies. Amplia área de distribución desde Honduras hasta Argentina. Comprende: Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Dacnis cayana paraguayensis Chubb, 1910

Corrientes
Citas: Contreras (1987a, 1987b); Darrieu y Camperi (1988)

Misiones
Citas: Bertoni (1913); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Martínez Gamba (2014); Ménégaux (1919); Militello y Chebez (2009); Navas y Bó (1988); Pereyra (1951)

Observaciones: De la Peña (Puerto Iguazú, dpto. Iguazú, 17-09-1971)

SAÍRA DORADA *Hemithraupis guira* (Linnaeus, 1766)

Otros nombres: Fruterito dorado. Tangará de pecho rojizo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13 cm.
Peso: Contreras (1983c): N=4 X= 13,1 g (Rango 12,7 a 13,8 g); Darrieu y Camperi (1994): N= 12 (M) X: 13,1 g (Rango 11,8 a 15), N= 7 (H) X: 13,5 g (Rango 12 a 15,3)
Coloración. Pico amarillento, culmen negruzco. Patas grises. Iris pardo.
Macho. Cara, lados de la cabeza y garganta negros bordeados de amarillo. Dorsal verde amarillenta. Rabadilla y pecho canelas. Flancos grises. Vientre y subcaudales amarillos. Alas y cola pardas con las plumas orilladas de amarillo.
Hembra. Dorsal olivácea. Ventral amarillenta.



COMPORTAMIENTO

Alimentación
Bodrati (2006b).Frutode *Plinia trunciflora.*

HÁBITAT
Estrato medio y alto en bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Semiesfera de fibras vegetales y líquenes.

Bertoni, A. de W. (1918c). Misiones, 26 de octubre nido con un huevo. Otro en noviembre.

HUEVOS
Pone 2 huevos blancos con pintas pardo canelas en el polo mayor.

Medidas
Bertoni (1918c): 18,0 x 13,0

Otros
Herrera (1993a). Albinismo en un ejemplar.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: lados de la cabeza y garganta negros bordeados de amarillo. Pecho canela. Hembra: olivácea y amarillenta.
Ambos sexos con el pico amarillo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Hemithraupis guira boliviana Zimmer, 1947 en Jujuy, Salta, Tucumán norte de Catamarca, observada además en Córdoba y *Hemithraupis guira fosteri* (Sharpe, 1905)en Misiones y norte de Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Ocho subespecies. Amplia área de distribución en Sudamérica desde Colombia, Venezuela hasta Argentina. Comprende: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Hemithraupis guira boliviana Zimmer, 1947

Catamarca
Observaciones: Salvador, S. (La Merced, dpto. Paclín, 16-08-2004)

Córdoba
Observaciones: Salvador, S. (Villa María, dpto. Gral. San Martín, posiblemente escapada de cautiverio)



Jujuy
Citas:Brandán y Antelo (2001); Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

Salta
Citas:Camperi (1988); Coconier et al. (2007); Malizia et al. (2005); Moschione et al. (2013)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Ortiz y Aráoz (2014)

Hemithraupis guira fosteri (Sharpe, 1905)

Corrientes
Citas: Contreras (1983c, 1987b); Darrieu y Camperi (1994); Giraudo et al. (2006); Short (1971)

Misiones
Citas: Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Herrera(1993); Krauczuk (2008); Martínez Gamba (2014); Straneck (1990h)

SAÍ COMÚN *Conirostrum speciosum* (Temminck, 1824)

DESCRIPCIÓN
Largo: 11 cm.
Peso: Salvador (1988):N= 1 (?) 7,0 g, N= 1 (M)8,0 g; Darrieu y Camperi (1993): N= 6 (M) X: 8,8 g (Rango 8,0 a 9,0), N= 4 (H) X: 8,7 g (Rango 8,0 a 9,0)
Coloración. Pico negruzco. Patas gris oscuro. Iris pardo rojizo.
Macho. Dorsal, alas y cola grises celestes. Ventral gris pálida. Centro del abdomen blanco. Subcaudales castañas.
Hembra. Corona y lados de la cabeza azules verdosos. Dorsal olivácea. Alas y cola amarillas verdosas. Ventral blanca, ocráceo en el pecho y en las subcaudales.

COMPORTAMIENTO



Alimentación
Bertoni (1926).Insectos.
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:** Néctar *Pisonia zapallo,Prosopis sp.,Tabebuia heptaphylla*.
Bodrati (2006b). **Vegetales:** Fruto*Plinia trunciflora*.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es la repetición de una aguda nota bisilábica: Sisíe .. sisíe .. sisíe ..

HÁBITAT
Estrato medio y alto en bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en Formosa.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Copa de materiales vegetales.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, A mediados de diciembre de 2003, fue hallado un nido a 6,5 m del suelo. Estaba dentro de una mata grande de clavel del aire (*Tillandsia duratii*), muy

oculto.Tiene forma de semiesfera, compacta y de paredes gruesas, elaborado con líquenes “barbas del monte” (*Usnea sulcata*) con el interior recubierto de fibras muy finas de color amarillo. Tenía 2 huevos.



Huevos
Pone 3 huevos blanquecinos con pintas pardas, castañas y gris viláceas, más concentradas en el polo mayor, formando una corona.

Medidas
Di Giacomo (2005h): 15,0 x 13,3 y 15,6 x 13,2

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: gris celeste. Ventralmente blanquecino. Subcaudales castañas.
Hembra: olivácea. Ventralmente ocrácea. Ambos sexos con el pico recto, puntiagudo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Conirostrum speciosum speciosum (Temminck, 1824) en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán y noreste de Santa Fe.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Amplia área en Sudamérica. Comprende: Venezuela, Guayanas, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Conirostrum speciosum speciosum (Temminck, 1824)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a)

Observaciones: De la Peña (Cerrito, dpto. Bermejo, 05-06-1988)

Corrientes
Citas: Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1993); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006)

Formosa
Citas: Contreras (1987c, 1993b); Di Giacomo(2005h); Esteban (1953); López Lanús (1997); Nores (1992)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988)

Misiones
Citas: Bertoni (1913); Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2008); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1988); Straneck (1990g)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: De la Peña (1996b, 2011f)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Navarro y Marigliano (2009)

SAÍ GRANDE *Oreomanes fraseri* P. L. Sclater, 1860

DESCRIPCIÓN
Largo: 16, 5 cm.
Peso: Hilty (2011): 22-27 g
Coloración. Pico puntiagudo, pardo. Patas gris parduscas. Iris pardo rojizo.
Línea ocular rojiza. Frente y corona blanquecina. Mejillas blancas. Ventralmente rojizo. Dorso gris.

HÁBITAT
Bosques, matorrales.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Hilty (2011)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Línea ocular rojiza. Cara blanca. Mejillas blancas. Ventralmente rojizo. Dorso gris.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Oreomanes fraseri P. L. Sclater, 1860 en Jujuy y Salta.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Extenso rango de distribución discontínuo en los Andes entre 2.700 y 4.800 metros de altura en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009) ; Di Giacomo et al. (2007); Monteleone y Roesler (2005)

Salta
Citas:Mazar Barnett et al. (1998c); Moschione et al. (2013)

PAYADOR NEGRO *Diglosia carbonaria* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838)

Otro nombre: Payador de vientre gris.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14 cm.
Peso: Hilty (2011): 9-14,8 g
Coloración. Pico negro, base de la mandíbula gris. Patas grises. Iris pardo.

Negro. Rabadilla gris. Cubiertas alares, pecho inferior y vientre grises. Subcaudales castañas.



HÁBITAT
Bordes de bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza negra. Subcaudales castañas. Ventral gris.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Diglossa carbonaria (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838) en Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Endémico de Bolivia y noroeste de Argentina. Se encuentra entre 2.500 y 4.000 metros de altura.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Di Giacomo et al. (2007); Moschione y San Cristóbal (1993); Moschione y Segovia (2005); Monteleone y Roesler (2005)

PAYADOR CANELA *Diglossa sittoides* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838)

Otros nombres: Mielero payador. Payador.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12,5 cm.
Peso: Salvador (1988):N= 1 (H) 7,5 g
Coloración. Pico: maxila parda, mandíbula gris azulina. Patas pardo grisáceas. Iris pardo rojizo.
Macho. Corona, lados de la cabeza, parte dorsal, alas y cola grises azuladas. Lorum negro. Ventralmente canela.
Hembra. Dorso pardo oliváceo. Ventralmente ocrácea.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Lucero e Izasa (2015). **Vegetales:** Flores de *Mutisia kurtzii* var. *anomala*

HÁBITAT
Bosques, selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Hilty (2011)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: dorsal, alas y cola azuladas. Ventral canela. Hembra: parda olivácea. Ventralmente canela. Ambos con el pico relativamente largo, terminado en ganchito.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Diglossa sittoides sittoides (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838) entre los 1800 y los 2500 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.
SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Seis subespecies. A lo largo de Los Andes desde Venezuela hasta Argentina entre 1.500 y 3.000 metros de altura. Comprende: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Diglossa sittoides sittoides (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Vides Almonacid (1999)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Campagna et al. (2011); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Contino (1975); Höy (1973a); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988)

La Rioja
Citas: Lucero e Izasa (2015)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Dinelli (1918); Lucero (1983); Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014)

DIADEMA *Catamblyrhynchus diadema* Berlepsch y Stolzmann, 1896

Otros nombres: Cabecipeludo. Tangará coronado.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13,5 cm.
Peso: Di Giacomo et al. (1997): N= 1 (M) 11,4 g; Hilty (2011): 13,4-16 g
Coloración. Pico negro. Patas grises. Iris pardo.
Frente y parte anterior de la corona amarillas. Lorum, parte posterior de la corona y nuca negros. Dorsal, alas y cola pardas grisáceas. Lados de la cabeza y ventralmente, castaños.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Di Giacomo et al. (1997). **Insectos:**Coleópteros.**Vegetales**.

HÁBITAT
Selvas.



NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Parte anterior de la cabeza amarilla. Nuca negra. Dorsal grisácea. Ventral castaña.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Catamblyrhynchus diadema citrinifrons Berlepsch y Stolzmann, 1896en Jujuy y Salta.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Extensa área de distribución en los Andes, frecuentemente asociado a las cañas de bambú Chusquea, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,Bolivia, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamblyrhynchus diadema citrinifrons Berlepsch y Stolzmann, 1896

Jujuy
Citas:Camperi et al. (2013); Chebez (1994); Di Giacomoet al. (1997); Moschione y Segovia (2005)

Salta
Citas: Di Giacomoet al. (1997, 1998); Moschione et al. (2013); Rouges y Seaman (2001)

COMESEBO DE CABEZA NEGRA *Phrygilus atriceps* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Amarillo. Chanchito de cabeza negra. Comesebo cabeza negra. Fringilo de cabeza negra. Yal cabecinegro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17,5 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 1 X= 24 g; Salvador (1988): N= 1 (H) 26,0 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 17 X: 25,7 g (Rango 22,5 a 29); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (M) 26,2 g
Coloración. Pico gris a negruzco. Patas negruzcas. Iris rojizo.
Macho. Cabeza y cuello negros. Dorso canela. Rabadilla amarilla. Pecho y flancos canelas claros. Abdomen amarillento. Subcaudales blanquecinas. Alas y cola negruzcas con las plumas orilladas de gris.
Hembra. Cabeza y cuello grises estriados de negruzco. Dorsal parda olivácea. Lomo oliváceo. Ventral amarillenta. Abdomen y subcaudales blanquecinos. Alas y cola como el macho.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Zotta (1932). Arena.Semilla.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Vegetales: fruto de Trichoceus pasacana.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es la repetición de una corta estrofa: Jurip . jurip .. jurip .. jurip ..

HÁBITAT
Estepas arbustivas altoandinas.



NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidios en Jujuy.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N									N



El nido tiene forma de semiesfera o taza, de fibras vegetales y claveles del aire, a veces fibras solamente. Internamente lanas, pelos y "pelusas" de cardones. Lo ubica en arbustos o en repisas rocosas. Oculto o semiexpuesto. Elaborado.

Lönnberg (1903), Moreno, dpto. Tumbaya, Jujuy, 20-12-1901, una pareja con nido en una cortadera, fue construido de gramíneas y trozos de hierbas secas, forrado con crin de caballo y la lana de vicuña, con 3 huevos.
Salvador y Bodrati (2011). Humahuaca, dpto. Humahuaca, Jujuy, 27-02-2007, nido con 3 huevos propios y 2 de *Molothrus bonariensis.*
De la Peña (2013c). Humahuaca, dpto. Humahuaca, Jujuy, 23-02-1979, 3 nidos en arbustos a 2,50 m del suelo con 2 y 3 huevos respectivamente y otro a 2,30 de altura con 4 huevos; Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 23-02-1979, nido en un hueco a 3 m del suelo con 2 pichones; 10-02-1983, Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 4 nidos: en hueco a 3,10 m con 2 pichones y en hueco a 2,20 m del suelo con 2 huevos; en arbusto a 2,60 m del suelo con 2 pichones y en arbusto a 3 m de altura, no observado.
Tacita o semiesfera de fibras vegetales y claveles del aire. A veces fibras solamente. Internamente lanas, pelos y "pelusas" de cardones.
Medidas: Diámetro total de 9 a 16 cm. Diámetro interno: de 5,5 a 6 cm. Profundidad: de 2,5 a 4 cm. Alto: de 7 a 11 cm.
Salvador (2015). Coraya, dpto. Humahuaca, Jujuy, 27-02-1983, cuatro nidos, dos con 3 huevos cada uno y dos con 3 pichones cada uno, 21-02-1995, tres nidos con 3 huevos cada uno. Aparzo, dpto. Humahuaca, Jujuy, 02-03-1983, tres nidos, uno con 2 pichones y un huevo, los otros dos con 2 y 3 pichones respectivamente, 22-02-1995, dos nidos con 3 huevos cada uno. Las Cuevas, dpto. Humahuaca, Jujuy, 03-03-1983, dos nidos con 3 huevos cada uno. Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 19-02-1995 dos nidos con 3 huevos cada uno. Iturbe, dpto. Humahuaca, Jujuy, 20-02-1995, tres nidos, dos con 3 huevos cada uno y uno con dos pichones. Tres Cruces, dpto. Humahuaca, Jujuy, 20-02-1995, dos nidos con 2 pichones cada uno. Humahuaca, dpto. Humahuaca, Jujuy, 27-02-2007, dos nidos, uno con 2 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis* y el otro con un pichón.



Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, verdes azulados con pintas grises y pardas distribuidas por toda la superficie.


Medidas
Lönnberg (1903): 24,0 a 25,0 x 17,0

De la Peña (2013c): 21,2 a 24,9 x 15,4 a 17,4 X= 23 x 16,2 (N= 11)
Salvador (2015): 22,1 a 24,6 x 16,1 a 18,1 X= 23,6 x 17,1 (N= 24)

Peso
De la Peña (2013c): 2,582 a 2,817 X= 2,699 (N= 2)
De la Peña (2013c): cáscaras de 0,145 a 0,214 X= 0,162 (N= 11)
Salvador (2015): 3,0 a 4,1 X= 3,6 (N= 24)



Humahuaca. Jujuy. 23-02-1979


Humahuaca. Jujuy. 23-02-1979. Ubicación nido



Humahuaca. Jujuy. 23-02-1979

PICHONES
Descripción
Salvador (2015). Comisuras blancas, interior de la boca rojo intenso.

Otros
Salvador y Bodrati (2011). Es parasitado por *Molothrus bonariensis*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Canela. Cabeza y cuello negros. Rabadilla amarilla.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phrygilus atriceps (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)entre los 3000 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán, y Catamarca, hasta el suroeste de San Juan.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se halla restringido a la cordillera de los Andes entre los 3.000 y 4.000 metros de altura en la Puna del suroeste de Peru (Arequipa), oeste de Bolivia, norte de Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Jujuy
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Cormenzana Méndez (2011); Dabbene (1933); De la Peña (2013c); Di Giacomo et al. (2007); Fiora (1934); Hellmayr (1932); Lönnberg (1903); Salvador (1988, 2015); Salvadory Bodrati (2011); Salvador y Di Giacomo (2014); Straneck (1990f); Zotta (1932)

Observaciones: De la Peña (Abra Pampa, dpto. Cochinoca,04-02-1977)

La Rioja
Citas: Di Giácomo et al. (2007)

Salta
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Haene (1997)

Observaciones: De la Peña (La Ciénaga, dpto. Cochinoca, 15-01-1982)

Tucumán
Citas:Capllonch (2007a); Hartert y Venturi (1909)

COMESEBO ANDINO *Phrygilus gayi* (Gervais, 1834)

Otros nombres: Boquense. Chanchito amarillo grande. Chingolo de la sierra. Chingolo encapuchado. Comesebo chico. Comesebo encapuchado. Cometocino. Cordillerano. Fringilo amarillo. Fringilo cordillerano. Yal amarillo. Yal capucho gris.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17,5 cm.
Peso: Contreras y Davies (1980): N= 12 (M) X= 26, 9 g (Rango 21,6 a 29,8), N= 2 (H) X= 24,8; Navas y Bó (1990); 2 machos, 28,0 y 31,4 X= 29,7 g; Salvador (1990a): N= 2 (M) 35,5 y 37,2 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 7 X= 23,0 g (Rango 21 a 26)
Macho. Pico: maxila negruzca, mandíbula gris rosada. Patas rosado oscuro. Iris pardo rojizo.

Cabeza y cuello grises. Lorum negro. Dorsal amarilla con tono oliva. Ventral amarilla con tono oliváceo. Abdomen y subcaudales blancos. Alas pardas oscuras con las plumas ribeteadas de gris. Cubiertas alares grises. Cola parda oscura.
Hembra. Cabeza y cuello grises claros estriados de negro. Dorsal olivácea. Garganta blanquecina. Ventral amarillenta. Abdomen blanquecino. Alas y cola como el macho.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en pareja. Se alimenta de semillas, frutas y grasa.
Canta mientras está posado en arbustos bajos o en rocas.

Voces
Straneck (*in liit.*). El canto es una corta estrofa silbada, Tlip.gibrip ...tlip . giblip ...

Alimentación
González Gómez et al. (2004). **Vegetales:**Néctar*Puya berteroniana.*
Haene et al. (2007). **Vegetales:**Fruto*Berberis buxifolia.*

HÁBITAT
Estepas graminosas y arbustivas andinas y patagónicas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N



El nido tiene forma de taza. Es construido con fibras vegetales y raicillas. Internamente lanas y pelos. Asentado en paredes, tirantes de construcciones.Oculto o semiexpuesto. Elaborado.

Uranga (*in litt.*). Camarones, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 02-12-2013, nido con 6 huevos: 03-12-2013, 3 nidos con 6 y n5 huevos y uno con 3 pichones.
Christie et al. (2004). Nidos en noviembre en el noroeste patagónico.
Albrieu et al. (2004). Estuario del río Gallegos, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, nidifica entre octubre y enero.
De la Peña (2013c). Río Grande, dpto. Río grande, Tierra del Fuego, 01-02-1972, nido en un hueco en una pared, a 1,90 m del suelo, 4 pichones; Río Turbio, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, 10-11-1979, nido en un tirante de una construcción a 3,10 m del suelo, 2 huevos.
Medidas: Diámetro total: de 12 a 15 cm. Diámetro interno: de 5,5 a 8 cm. Profundidad: de 4 a 8 cm. Alto: de 8,5 a 10 cm.
Salvador (2015). Coraya, dpto. Humahuaca, Jujuy, 21-02-1995, nido en una repisa de roca oculto por una mata de Cortadera, con 4 huevos.



Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, celestes verdosos con finas pintas pardas.

Medidas
De la Peña (2013c): 18,8 a 21,0 x 16,2 a 17,8 X= 19,9 x 17,0 (N= 2)
Salvador (2015): 22,3 a 23,3 x 16,9 a 17,1 X= 22,6 x 17,0 (N= 4)

Peso
De la Peña (2013c): cáscaras 0,150 a 0,161 X= 0,155 (N= 2)
Salvador (2015): 3,5 a 3,6 X= 3,5 (N= 4)

Otros
Savigny (2004). Albinismo parcial en un ejemplar.


Río Turbio. Santa Cruz.10-11-1979

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: amarillo con la cabeza gris azulada, alas oscuras y grises. Cola negra. Hembra: más pálida, garganta blanquecina.
Se diferencia del Comesebo patagónico por ser de mayor tamaño, más pálido y tener el dorso canela.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phrygilus gayi caniceps Burmeister, 1860 hasta los 3000 m de altura, desde Jujuy, Salta y Tucumán por el Oeste, hasta Mendoza, San Luis y Córdoba y desde Neuquén y Río Negro hasta Tierra del Fuego.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Terrenos áridos andino patagónicos hasta los 3.000 metros en Argentina y Chile.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Phrygilus gayi caniceps Burmeister, 1860

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Nores (1995); Vides Almonacid (1999); White (1882)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Harris (2008); Sainz-Trápaga (2014); Salvador y Narosky (1987)

Observaciones: De la Peña (Esquel, dpto. Futaleufú, 01-02-1976; Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino,05-11-1979)

Córdoba
Citas: Frenzel (1891); Miatello et al. (1991-1994, 1999)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Campagna et al. (2011); Camperi et al. (2013); Salvador (2015)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Chebez et al. (1998); Siegenthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Giannini et al. (2001); Hayward (1967); Navas y Bó (1991c); Nores (1995)

Mendoza
Citas: Barros (1930); Blendinger y Ojeda (2001); Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Contreras y Davies (1980); Contrearas y Roig (1977c); Dabbene (1933); Darrieu y Segura (2015); Ferrer et al. (2011); Gómez (2006); López de Casenave (2001); Lucero (2013f); Martínez et al. (1997a) Navas y Bó (1991c); Olivera et al. (2009); Pereyra (1927e, 1942); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d)

Observaciones: De la Peña (Uspallata, dpto. Las Heras, 11-01-1982; Castillos de Pincheira, dpto. Malargüe, 14-10-2004)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Christie et al. (2004); Contreras (1978b); Dabbene (1933); Daciuk (1968); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Navas y Bó (1991c); Olrog (1979); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Acevedo (1995); Bettinelli y Chebez (1986); Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras y Davies (1980); Gelain (2001, 2010, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Giovambattista (1988); Llanos et al. (2011); Navas y Bó (1990, 1991c); Paz Barreto (1997b); Petracci et al. (2004a)

Observaciones: De la Peña (San Carlos de Bariloche, dpto. Bariloche, 31-01-1976; Arroyo La Fragua, dpto. Pilcaniyeu, 21-11-1998)

Salta
Citas:Moschione et al. (2013); Nores (1995)

Observaciones: De la Peña (Cachi, dpto. Cachi, 06-02-1977)

San Juan

Citas:Acosta y Murúa (2001); Alderete y Capllonch (2012); Camperi y Darrieu (2004); Contreras y Davies (1980); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene (1997); Lucero (2013f, 2013i); Navas y Bó (1991c); Nores (1995); Ortiz y Murúa (1994)

Observaciones: De la Peña (La Ciénaga, dpto. Jáchal, 15-01-1982)

San Luis
Citas: Gil et al. (1995); Nellar Romanella (1993); Nores (1995); Nores y Yzurieta (1981); Salvador (1990a)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Chebez et al. (1998); Coconier (2005); Dabbene (1933); Darrieu et al. (2009); De la Peña (1983b, 2013c); De Lucca y Saggese (1992); Di Giacomo et al. (2005); Hartert y Venturi (1909); Hellmayr (1938); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Radboone (1935); Straneck (1990a); Zapata (1967, 1969)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); De la Peña (2005); Hartert y Venturi (1909); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948)

Tucumán
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Lucero (1983); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921)

COMESEBO PATAGÓNICO *Phrygilus patagonicus* Lowe, 1923

Otros nombres: Chanchito. Chanchito amarillo chico. Chingolo cordillerano. Fringilo chanchito. Fringilo patagónico. Yal encapuchado. Yal de capuchón azulado. Yal patagónico.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Humphrey et al. (1970): N= 1 (M) 39,6 g, N= 1 (H) 34,0 g, N= 2 (?) X= 39,2 g; Contreras (1975): N= 35 (?) X= 22,6 g (Rango 19,1 a 27,4); Christie et al. (2004): N= 2 (M) 23,0 y 25,0 g, N= 1 (H) 21,0 g, N= 1 (?) 22,0 g
Coloración. Pico gris. Patas pardas. Iris pardo rojizo.
Macho. Cabeza y cuello grises. Lorum negro. Dorsal canela. Rabadilla y ventral amarillos. Subcaudales blancas. Alas pardas oscuras con las plumas ribeteadas de gris. Cola parda oscura.
Hembra. Más olivácea en la parte dorsal y ventral.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Reynolds en Humphrey et al. (1970). **Vegetales:** Semillas.
Grigera (1976). **Vegetales:** Semillas, Tallos. **Insectos**: Hemiptera (Lygaeidae).
Grigera (1982). **Vegetales:** Semillas.**Insectos.**
Rozzi et al. (1996). **Vegetales:** Semilla *Drymis winteri, Myrteola nummul*.
Schlatter y Vergara (2005). **Vegetales:** Savia *Nothophagus betuloides*.
Haene et al. (2007). **Vegetales:** Fruto *Berberis buxifolia*.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es la repetición de una estrofa silbada, Sibitiglictugih ... sibiptiglictuglihh

HÁBITAT
Bosques.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Río Negro, Santa Cruz.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N



El nido tiene forma de taza. Emplea fibras vegetales. Internamente fibras finas, lanas. Asentado en repisas, salientes rocosas, arbustoso cavidades arbóreas
Oculto o semiexpuesto. Elaborado.

Ojeda y Trejo(2002). Nidos en cavidades arbóreas.
Christie et al. (2004). Pichones en enero en el noroeste patagónico.
De la Peña (2013c). Río Turbio, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, 10-11-1979, un nido sobre recipiente de agua de un baño abandonado, a 3,20 m del suelo, con un huevo y otro en un arbusto, a 2,10 m de altura con 3 pichones; San Carlos de Bariloche, dpto. Bariloche, Río Negro, 23-12-1994, nido en saliente rocosa, a 2,50 m de altura con 3 huevos (localizado por A. Casas)
Medidas: Diámetro total: de 11 a 16 cm. Diámetro interna: 5 cm. Profundidad: de 2 a 3 cm. Alto: 5 cm.


San Carlos de Bariloche.Río Negro.23-12-1994


Río Turbio.Santa Cruz.10-11-1979

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, verdosos o celeste verdosos, con pintas pardas y grises, más concentradas en el polo mayor.

Medidas
De la Peña (2013c): 21,5 a 22,4 x 15 a 16,8 X= 22 x 15,6 (N= 4)
De la Peña (2013c):cáscaras 0,160 X= 0,160 (N= 4)

Otros
Urcola (2011). Un ejemplar con plumaje Ino.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza y cuello grises. Dorso canela. Rabadilla y ventral amarillas. Hembra:más pálida y más olivácea. Diferenciarlo del Comesebo andino.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phrygilus patagonicus Lowe, 1923 por el oeste, desde Neuquén y Río Negro hasta Tierra del Fuego. Además en Santa Cruz, en la estepa. Accidental en las Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Bosque Araucano en Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chubut
Citas: Camperi (1998); Vidoz (1995)

Observaciones: De la Peña (Esquel, dpto. Futaleufú, 04-02-1976)



Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Christie et al. (1988); Christie et al. (2004); Contreras (1975, 1978b); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Olrog (1979); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Observaciones: De la Peña (Villa La Angostura, dpto. Los lagos, 30-01-1976 y 21-11-1998)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras et al. (1980b); Daciuck (1977c); De la Peña (2013c); Gelain (1984a, 2001, 2007b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera (1976); Grigera y Pavic (2007); Hecker y Vidoz (1998); Ippi y Trejo (2003); Ojeda y Trejo (2002); Paz Barreto (1997b)

Observaciones: De la Peña (San Carlos de Bariloche, dpto. Bariloche, 31-01-1976 y 21-11-1998)



Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1988); Darrieu et al. (2009); De la Peña (2013c); Imberti (2005e); Peri (2013); Stone (1928)

Observaciones: De la Peña (Bajo Caracoles, dpto. Río Chico, 25-01-1974)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1937); Chebez y Bertonatti (1994); Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948, 1950); Reynolds (1934); Straneck (1990a)

Islas Malvinas
Citas : Woods (2006)

YAL NEGRO *Phrygilus fruticeti* (Kittlitz, 1832)

Otros nombres: Chanchito bataraz. Chiquilines. Dial. Fringilo negro. Fringilo negro grande. Fruterito. Jilguero tempanero. Rara negra. Yal.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 2 X= 31,5 g (Rango 29,0 a 34,0); Zapata y Martínez (1972b): N= 1 (M) 42 g; Contreras (1975): N= 13 (?) X= 37,2 g (Rango 32,1 a 40,3); Salvador (1988): N= 1 (M) 35,0 g; Navas y Bó (1990); 3 machos 45,0, 45,9, 46,5 X= 45,8, 2 hembra 40,1, 45,8 X= 42,9; Camperi (1992c): N= 3 (M) 35,0, 35,0 y 40,0 g; N= 3 (H) 10,0, 11,0 y 11,0 g; Navas y Bó (2000): N= 11 X= 37,7 g (Rango 34,2 a 41,8), N= 4 (H) X= 39,4 g (Rango 37,9 a 41,5); Christie et al. (2004): N= 1 (M) 42,0 g; Camperi y Darrieu (2005): N= 14 (M) X= 44,6 g (Rango 38,4 a 45,1), N= 10 (H) X= 40,6 g (Rango 37,1 a 45,2 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 8 X= 36,7 g (Rango 33 a 41)
Coloración. Pico: maxila pardo amarillento. Mandíbula amarilla. Patas pardo amarillentas. Iris castaño.
Macho. Dorsal gris. Cabeza y manto estriados de negro. Garganta, anterior del cuello y pecho negros. Flancos grises. Abdomen y subcaudales blancos. Alas y cola negras. Punta de las cubiertas alares blancas.
Hembra. Dorsal gris pardusca estriada de pardo oscuro. Rabadilla gris. Mejillas y regiones auriculares pardas rojizas. Ventral blanquecina estriada de pardo oscuro. Alas y cola pardas oscuras. Punta de las cubiertas alares blanquecinas.



COMPORTAMIENTO
Anda solitario, en pareja o en grupos. El macho canta posado en arbustos. Durante el cortejo se eleva y desciende con un planeo, cantando y abriendo las alas y la cola.
Se alimenta de semillas y de brotes.

Alimentación
Haene et al. (2007). **Vegetales:** Fruto *Berberis buxifolia.*

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto: Tryyyyyh tiglgi ... Tryyyyy tiglgih .... es complementado generalmente con un corto vuelo en planeo.

HÁBITAT
Estepas andinas y patagónicas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Mendoza, Río Negro, Chubut.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	**N**								N	N	N

El nido tiene forma de taza. Emplea fibras vegetales.
Internamente lanas, a veces alguna pluma. Lo ubica en arbustos.
Oculto o semiexpuesto. Elaborado.



Dinelli (1918b).Jujuy, Budin localizó nidos en enero de 1912.
Reed (1919). Mendoza, anida en arbustos espinosos.
Christie et al. (2004). Nidos con huevos en noviembre.
De la Peña (2013c). Varios nidos en arbustos, desde 0,35 a 1,50 m del suelo. Península Valdés, dpto. Biedma, Chubut, 26-11-1973, un pichón; Cachi, dpto. Cachi, Salta, 06-02-1977, 2 pichones; Humahuaca, dpto. Humahuaca, Jujuy, 23-02-1979, 3 nidos, uno con 2 huevos y los otros con 2 pichones cada uno; San Antonio Oeste, dpto. San Antonio, Río Negro, 03-11-1979, 2 nidos con 2 pichones cada uno y Llancanelo, dpto. Malargüe, Mendoza, 15-10-2004, en construcción.
Medidas: Diámetro total: de 11 a 15 cm. Diámetro interno: de 6 a 6,5 cm. Profundidad: de 5 a 8 cm. Alto: de 10 a 12 cm.
Salvador (2015). Iturbe, dpto. Humahuaca, Jujuy, 26-02-1983, dos nidos, uno con 2 pichones, el otro con un huevo y un pichón. Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 24-02-1995, nido con 2 huevos.

Huevos
Pone 2 huevos, ovoidales, verdes pálidos con pintas y manchitas pardas y grises distribuidas por toda la superficie.

Medidas
Budin en Dinelli (1918b): 24,0 x 18,0 a 19,0 X= 24,0 x 18,5 (N= 2)
De la Peña (2013c): 25,4 a 27 x 17,1 a 18 X= 26,1 x 17,5 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras de 0,190 a 0,193 X= 0,192 (N= 3)
Salvador (2015): 24,3 x 18,9 y 24,7 x 17,9

Pesos
Salvador (2015): 4,2 y 4,3 g





Humahuaca.Jujuy.23-02-1979



Humahuaca.Jujuy.23-02-1979



Punta Norte. Chubut. 26-11-1973

PICHONES



Descripción

Salvador (2015). Nacen con los ojos cerrados, piel color carne rosada con abundante plumón gris oscuro en el dorso. Pico pardo claro, patas rosadas, comisuras amarillas y el interior de la boca rojo intenso.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Macho: negruzco con el pico amarillo-naranja. Dos bandas blancas en las cubiertas alares. Hembra: pardusca dorsalmente. Blanquecina ventralmente estriada de oscuro. Pico rosáceo.

La hembra se parece a la del Yal andino.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Phrygilus fruticeti fruticeti (Kittlitz, 1832) hasta los 3.000 metros de altura, desde Jujuy y Salta hasta Mendoza y desde Neuquén, Córdoba, La Pampa y sur de Buenos Aires hasta Santa Cruz. En otoño migra hasta el norte de Santa Fe. Citado para las Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN



Tres subespecies. Rango extendido por el oeste, en los Andes, hasta 3.000 metros de altura en Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Apareciendo a alturas menores en la parte más meridional de su distribución, tan bajo como a nivel del mar.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Phrygilus fruticeti fruticeti (Kittlitz, 1832)

Buenos Aires

Citas: Camperi (1992c); Camperi y Darrieu (2001b); Darrieu y Camperi (2001c); Morici (2014); Narosky (1983); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Zapata (1998); Zapata y Martínez (1972)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Nores (1995); Zapata y Martínez (1972b)

Chubut
Citas: Bó (1958); Camperi (1998); Darrieu y Camperi 2000 (2001); De la Peña (1983b, 2013c); Harris (2008); Vidoz (1995); Sainz-Trápaga (2014); Straneck (1990a); Vuilleumier (1993b); Zapata y Martínez (1972b)

Observaciones: De la Peña (Esquel, 01-02-1976; Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino05-11-1979; Puerto Madryn, 27-11-2000)

Córdoba
Citas: Straneck (1999a)

Jujuy
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Budin (1931); Burgos et al. (2009); Campagna et al. (2011); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Dabbene (1933); De la Peña (1983b); Di Giacomo et al. (2007); Fiora (1934); Lönnberg (1903); Mazar Barnet (1998); Salvador (1988, 2015); Zapata y Martinez (1972b)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Güller (2008); Maceda et al. (2001); Navas y Bó (1986); Noriega et al. (1993); Siegenthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Di Giácomo et al. (2007); Nores (1995)

Mendoza
Citas: Barros (1930); Blendinger y Alvarez (2002); Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Dabbene (1942); Darrieu y Segura (2015); Ferrer et al. (2011); López de Casenave (2001); Lucero (2013f); Martínez et al. (1997a); Navas y Bó (2000); Olivera et al. (2009); Pereyra (1942); Reed (1916, 1919); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d); Zapata y Martínez (1972b)

Observaciones: De la Peña (Villavicencio, dpto. Las Heras, 12-01-1982; Llancanelo, dpto. Malargüe, 15-10-2004)

Neuquén
Citas:Acerbo (2000); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (1988, 2004); Contreras (1975, 1977b, 1978); Daciuk (1968); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b); Zapata y Martínez (1972b)

Río Negro
Citas:Acevedo et al. (1995); Bettinelli y Chebez (1986); Camperi (1998); Camperi y Darrieu (2005); Casas (1992a); Castello et al. (1992) en Paz Barreto (1997b); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras (1975); De la Peña (1983b); Gelain (2001, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Hartert y Venturi (1909); Llanos et al. (2005, 2011); Navas y Bó (1990); Paz Barreto (1997b); Pereyra (1945, 1951); Pérezy Petracci (1998); Peters (1923b); Zapata y Martínez (1972b)

Observaciones: De la Peña (Las Bayas, dpto. Ñorquinco, 04-02-1976)

Salta
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Coconier et al. (2007); De la Peña (1983b); Moschione et al. (2013); Nores (1995); Zapata y Martínez (1972b)

Observaciones: De la Peña (Valle Encantado, dpto. Chicoana, 06-12-1977)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (2000)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2009); De Lucca y Saggese (1992); Earnshaw y Earnshaw (2000); Humphrey et al. (1985); Humphrey y Bridge (1970); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Oustalet (1891); Stone (1928); Travaini et al. (2004); Zapata (1967); Zapata y Martínez (1972b)

Santa Fe
Citas:Fandiño y Pautasso (2011)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Humphrey y Bridge (1970); Zapata y Martínez (1972b)

Tucumán
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Moyano Wagner (2010); Capllonch et al. (2011b); Dinelli (1918b); Lucero (1983); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c): Zapata y Martínez (1972b)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

YAL PLOMIZO *Phrygilus unicolor* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Cantor. Chanchito plomizo. Cenicita. Diuca cordillerana. Fringilo plomizo. Pájaro plomo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 1 (H) 21,0 g; Navas y Bó (1990): N= 1 (M) 29,3 g; Salvador (1990a): N= 2 (M) 22,7 y 23,3 g; Navas y Bó (2000): N= 22 (M) X= 21,0 g (Rango 19,2 a 23,5), N= 8 (H) X= 20,9 g (Rango 18,5 a 23,1); Christie et al. (2004): N= 1 (M) 28,0 g, N= 1 (H) 26,0 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 21 X= 20,3 g (Rango 16 a 26); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 12 X= 25,9 g (Rango 21,0 a 29,5) (*minor*)
Macho. Pico: maxila pardo oscuro, mandíbula córnea. Patas e iris pardos.
Dorsal gris. Ventral gris clara. Subcaudales blanquecinas. Alas pardas oscuras. Cubiertas alares orilladas de gris. Cola negra.
Hembra. Dorsal gris pardusca estriada de negruzco. Rabadilla gris. Ventral ocrácea estriada de pardo oscuro. Alas y cola negruzcas con las plumas orilladas de gris. Cubiertas alares con dos bandas grisáceas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Haene et al. (2007). **Vegetales:**Fruto*Berberis buxifolia.*
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Fruto *Berberis* sp. Semilla *Festuca* sp*., Stipa* sp.

HÁBITAT
Estepas andinas, pastizales en serranías.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Tucumán, Córdoba.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N								N	N



Semiesfera de pajas y cerdas en huecos. Lo ubica en cuevas en rocas, huecos en barrancas de tierra o en matas de pajas.

Dinelli (1924). Tucumán, nidos en enero a marzo.
Nores e Yzurieta (1983c). Pampa de Achala, dpto. Punilla, Córdoba, 16-12-1975, nido con 3 huevos.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Salvador y Narosky (1984). Pampa de Achala, dpto. Punilla, Córdoba, un nido el 13-01-1983, un nido apoyado en uno viejo de *Turdus chiguanco*, 2 huevos; otro el 17-12-1983, en un hueco con 2 huevos.
Salvador y Salvador (1988). Pampa de Achala, Córdoba, 13-01-1983, nido con 2 huevos; 17-12-1983, nido con 2 huevos; 21-12-1986, 3 nidos con 1, 2 y 2 huevos; 19-12-1987, 2 nidos con 3 huevos; 24-01-1988, 2 nidos con 3 huevos.
Christie et al. (2004). Pichones en febrero.
Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, dpto. Punilla, Córdoba, se localizaron 32 nidos, entre noviembre y enero.
Salvador (2015). Cuesta de Lipán, dpto. Tumbaya, Jujuy, 26-02-2007, nido con 3 huevos.

Huevos
Pone 2 ó 3 huevos azulados con pintas pardas, más concentradas hacia el polo mayor.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 22,0 x 15,0
Dinelli (1924): 22,5 x 15,0 y 20,5 x 14,5
Salvador y Narosky (1984): 20,5 a 22,0 x 15,8 a 16,0 X= 21,3 x 15,8 (N= 4)
Salvador y Salvador (1988): 20,8 a 23,1 x 15,9 a 16,6 X= 22,1 x 16,1 (N= 14)
Salvador y Salvador (2012):19,4 a 23,1 x 14,9 a 16,6 X= 21,5 x 15,8 (N= 26)

Peso
Salvador y Salvador (1988): 3,2
Salvador y Salvador (2012):2,7 a 3,4 X= 3,13 (N= 19)

PICHONES
Descripción
Salvador y Salvador (2012). Los pichones nacen con los ojos cerrados. Piel color carne naranja, con escaso plumón dorsal gris pardusco. Pico pardo claro, comisuras blancas o amarillentas, interior de la boca rojo.

Observaciones
Salvador y Salvador (1988). Solo la hembra incuba.
Salvador y Salvador (2012). Los padres alimentan a los pichones

Otros
Salvador y Salvador (2012). Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: coloración general gris. No tiene estriado dorsal.Hembra: dorsal y ventralmente estriada.
Se diferencia de la hembra Yal platero por ser más estriada en la parte ventral, no tener blanco en la cola y el pico oscuro. De la hembra del Yal chico por ser más estriada en la parte ventral y carecer de cejas.
El macho se parece del Afrechero plomizo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phrygilus unicolor unicolor (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837) en San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro; *Phrygilus unicolor tucumanus* Chapman, 1925, entre los 2.000 y los 3.000 metros de altura en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán; *Phrygilus unicolor cyaneus* Nores e Yzurieta, 1983en las sierras grande de Córdoba y San Luis y *Phrygilus unicolor ultimus* Ripley, 1950 en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Siete subespecies. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.


CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Phrygilus unicolor unicolor (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Mendoza
Citas: Darrieu y Segura (2015); Gómez (2006); Navas y Bó (2000); Olivera et al. (2009); Piloni y Camperi (2011)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i); Navas y Bó (2000); Nores (1995); Piloni y Camperi (2011)

Neuquén
Citas: Contreras (1976, 1977b); Christie et al. (2004); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Piloni y Camperi (2011); Veiga et al. (2005)



Río Negro
Citas:Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Gelain (2001); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubullis (1985); Hecker y Vidoz (1998); Navas y Bó (1990); Piloni y Camperi (2011)

Phrygilus unicolor tucumanus Chapman, 1925

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Nores (1995); Piloni y Camperi (2011); Vides Almonacid (1986, 1999)

Observaciones: De la Peña (El Portezuelo, dpto. Valle Viejo, 11-03-1981)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Di Giacomo et al. (2007); Monteleone y Roesler (2005); Piloni y Camperi (2011); Salvador (1988, 2015)

La Rioja
Citas:Esteban (1953); Nores (1995); Salvador y Di Giacomo (2014)

Salta
Citas:Moschione et al. (2013); Nores (1995); Piloni y Camperi (2011)

Observaciones: De la Peña (Valle Encantado, dpto. Chicoana, 06-12-1977)

Tucumán
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Moyano Wagner (2010); Capllonch et al. (2011b); Dinelli (1924); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c); Piloni y Camperi (2011); Salvador (1990a)

Phrygilus unicolor cyaneus Nores e Yzurieta, 1983

Córdoba
Citas: Heredia (2006); Miatello et al. (1991-1994, 1993, 1999); Nores et al. (1983); Nores (1995, 1996); Nores e Yzurieta (1983); Ordano (1996); Salvador y Narosky (1984); Salvadory Bodrati (2011); Salvadory Salvador (1988, 2012); Volkmann y Cargnelutti (2001); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Pampa de Achala, dpto. San Alberto, 14-11-1980)

San Luis
Citas: Gil et al. (1995); Nellar Romanella (1993); Nores (1995)

Phrygilus unicolor ultimus Ripley, 1950 en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Chubut
Citas: Camperi (1998); Vidoz (1995)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2009); Di Giacomo et al. (2005); Earnshaw y Earnshaw (2000); Imberti (2005e); Piloni y Camperi (2011); Wetmore (1926b)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Piloni y Camperi (2011)

COMESEBO PUNEÑO *Phrygilus dorsalis* Cabanis, 1883

Otros nombres: Chanchito de dorso castaño. Chanchito de espalda roja. Fringilo andino. Fringilo de espalda castaña. Yal andino.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18 cm.
Peso: Rising (2011): 34,5-40,5
Coloración. Pico y patas grises. Iris rojizo.

Macho. Cabeza, cuello dorsal, rabadilla y supracaudales grises. Manto canela. Garganta blanca. Pecho gris. Abdomen, flancos y subcaudales blancos. Alas y cola pardas oscuras.
Hembra. Es más pálida.



HÁBITAT
Estepas altoandinas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Manto canela. Pecho gris. Garganta y abdomen blancos.
Se diferencia de la Diuca común por ser de mayor tamaño y tener el manto canela.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phrygilus dorsalis Cabanis, 1883 entre los 4000 y los 4500 m de altura en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Entre los 4.000 y 5.000 metros en la Puna de Bolivia, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Carma (2009); Dabbene (1933); Navas y Bó (1991c); Nores (1995)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Hellmayr (1932, 1938); Moschione et al. (2011); Navas y Bó (1991c)

La Rioja
Citas: Di Giácomo et al. (2007); Nores (1995); Nores y Salvador (1985)

Salta
Citas:Moschione et al. (2013); Nores (1995)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Navas y Bó (1991c)

Tucumán
Citas: Blendinger (1998); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c)

YAL CHICO *Phrygilus plebejus* Tschudi, 1844

Otros nombres: Chicta. Fringilo grisáceo. Fringilo plebeyo. Oquenchito. Oquencho. Plebeyo. Yal grisáceo.

DESCRIPCIÓN



Largo: 13,5 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 2 X= 15,3 g (Rango 15,0 a 15,6); Salvador (1988):N= 3 (H) 16,0, 17,5 y 15,0 g, N= 3 (M)15,0, 16,0 y 16,0 g, N= 8 (M) X= 17,4 g (Rango 16,0 a 18,5); Navas y Bó (1991): N= 27 (M) X: 15,4 g (Rango14 a 17,4), N= 7 (H) X: 15,1 g (Rango 13,3 a 16,2); Alderete y Capllonch (2012): N= 15 X= 15,6 g (Rango 12 a 15)

Coloración. Pico negro. Patas negruzcas. Iris pardo.
Macho. Dorsal gris estriada de negruzco. Rabadilla y supracaudales, grises. Cejas superciliares blanquecinas. Ventral gris claro. Abdomen y supracaudales blancos. Alas y cola pardo ocuras. Cubiertas y remeras alares ribeteadas de blanquecino.
Hembra. Dorsal más estriada. Pecho y flancos estriados de gris. Cejas blanquecinas.



COMPORTAMIENTO
Se alimenta de semillas, insectos. Bastante terrícola. Anda en pareja o en grupos.

Alimentación
Zotta (1932).Arena.Semilla.
Salvador en De la Peña y Sañvador (2010). **Vegetales:**Fruto*Berberis* sp.Semilla*Festuca* sp.*,Stipa* sp.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es un trino agudo que finaliza con dos o tres notas: Srríiiriiiiih chiebchiebchieb ....

HÁBITAT
Estepas altoandinas y pastizales en serranías.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Tucumán, Córdoba.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										N

El nido tiene forma de tacita. Emplea pajas. Internamente lanas, pelos, plumitas. Lo ubica en arbustos, matas de pastos o en repisas rocosas, huecos en barrancas de tierra, cuevas en paredes rocosas.
Oculto o semiexpuesto. Elaborado.

Salvador y Salvador (1988). Pampa de Achala, Córdoba, 13-01-1983, nido con 3 huevos; 17-12-1983, nido con 1 huevos; 20-12-1986, 2 nidos con 4 huevos; 24-01-1988, nido con 3 huevos.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Salvador y Bodrati (2011).Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, 20-12-1989, nido con 3 huevos y uno de *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, Córdoba, se localizaron 27 nidos, entre noviembre y enero.
De la Peña (2013c). Humahuaca, dpto. Humahuaca, Jujuy, 23-01-1979, nido en arbusto a 0,30 m del suelo, 2 huevos; Abra Pampa, dpto. Cochinoca, Jujuy, 23-02-1979, en arbusto, a 0,30 m del suelo, sin postura; Ascochinga, dpto. Colón, Córdoba, 06-12-1981, en Pasto puna, a 0,20 m del suelo, 4 huevos; Azul Pampa,

dpto. Humahuaca, Jujuy, 10-02-1983, nido en saliente de una roca, a 1,60 m de altura, 2 pichones; Los Gigantes, dpto. Punilla, Córdoba, 26-01-1984, nido en hueco en una piedra, a 1,60 m del suelo, 3 huevos.
Medidas: Diámetro total: de 8 a 10 cm. Diámetro interno: de 5 a 6 cm. Profundidad de 2 a 3 cm. Alto: de 6 a 9 cm.
Salvador (2015). Las Cuevas, dpto. Humahuaca, Jujuy, 28-02-1983, tres nidos, uno con 2 huevos, otro un huevo y el restante 2 huevos. Iturbe, dpto. Humahuaca, Jujuy, 28-02-1983, nido con un huevos. El Infiernillo, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 21-02-1987, 3 huevos.



Huevos

Pone de 2 a 4 huevos, ovoidales, verde-azulados o turquesa, con pintas grises, ocres o pardas, en mayor cantidad en el polo mayor.

Medidas

Salvador y Salvador (1988): 17,3 a 19,7 x 13,9 a 14,9 X= 18,8 x 14,3 (N= 11)
Salvador y Salvador (2012):17,3 a 19,8 x 13,6 a 14,9 X= 18,6 x 14,2 (N= 21)
De la Peña (2013c): 19,5 a 19,8 x 14 a 14,7 X= 19,6 x 14,3 (N= 2) *Phrygilus p. plebejus*
De la Peña (2013c): 16,6 a 19,5 x 13,1 a 15,1 X= 18,1 x 14,1 (N= 7) *Phrygilus p. narosky*
Salvador (2015): 17,9 a 20,8 x 13,1 a 14,7 X= 19,6 x 13,8 (N= 9) *Phrygilus p. plebejus*

Peso

Salvador y Salvador (1988): 2,1
Salvador y Salvador (2012):1,8 a 2,1 X= 2, 0 (N= 16)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,123 X= 0,123 (N= 2) *Phrygilus p. plebejus*
De la Peña (2013c): 1,12 a 2,07 X= 2,0 (N= 3) *Phrygilus p. narosky*
De la Peña (2013c): cáscaras de 0,089 a 0,108 X= 0,098 (N= 7) *Phrygilus p. narosky*
Salvador (2015): 1,9 a 2,2 X= 2,1 (N= 9) *Phrygilus p. plebejus*

Observaciones

Salvador y Salvador (2012). La incubación estuvo a cargo de la hembra y la alimentación de los pichones por la pareja.



Ascochinga.Córdoba.06-12-1981.Ubicación nido



Los Gigantes. Córdoba.26-01-1984



Humahuaca. Jujuy. 23-01-1979. Ubicación nido



Ascochinga.Córdoba.06-12-1981





Humahuaca. Jujuy. 23-01-1979

PICHONES

Descripción

Salvador y Salvador (2012). Los pichones nacen con los ojos cerrados. Piel color carne naranja, con escaso plumón dorsal gris oscuro. Pico pardo muy claro, comisuras blancas o amarillentas, interior de la boca rojo.

Otros

Salvador y Salvador (2012). Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Dorsal gris estriada de oscuro. Ventral grisácea. Cejas blanquecinas. La hembra con el pecho estriado. Se diferencia de la hembra de Yal platero por tener pico oscuro y carecer de blanco en la cola. Diferenciarla además de la hembra del Yal plomizo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Phrygilus plebejus plebejus Tschudi, 1844 entre los 3000 y los 4000 m de altura, desde Jujuy y Salta hasta Mendoza y San Juan. Citado para el noroeste de Santa Fe, y *Phrygilus plebejus naroskyi* Nores e Yzurieta, (1979) 1983 en las sierras de Córdoba y San Luis.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. Puna de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Subespecie en Sierras de Córdoba, Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Phrygilus plebejus plebejus Tschudi, 1844

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Navas y Bó (1991c); Nores (1995); Vides Almonacid (1986, 1999)

Jujuy
Citas:Budin (1931); Burgos et al. (2009); Campagna et al. (2011); Camperi et al. (2013); Dabbene (1933); De la Peña (2005); Hellmayr (1932, 1938); Lönnberg (1903); Navas y Bó (1991c); Salvador (1988, 2015); Zotta (1932)

La Rioja
Citas: Nores (1995)

Mendoza
Citas: Navas y Bó (1991c); Olivera et al. (2009); Pereyra (1927e, 1942); Roig (965)

Salta
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Moschione et al. (2013); Nores (1995)

Observaciones: De la Peña (Valle Encantado, dpto. Chicoana, 06-12-1977)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i); Nores (1995)

Santa Fe
Citas: Giai (1950)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Moyano Wagner (2010); Capllonch et al. (2011b); Handford (1983); Lucero (1983); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c); Salvador (2015)

Phrygilus plebejus naroskyi Nores e Yzurieta, (1979) 1983

Córdoba
Citas: De la Peña (2005); Heredia (2006); Miatello et al. (1991-1994, 1999); Navas y Bó (1991c); Nores et al. (1983);
Nores (1995, 1996); Nores e Yzurieta (1983); Ordano (1996); Salvadory Salvador (1988, 2012); Salvadory Bodrati (2011); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Pampa de Achala, dpto. San Alberto, 25-11-1990)


San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993); Nores (1995); Nores e Yzurieta (1985); Salvador (1988)

YAL CARBONERO *Phrygilus carbonarius* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)



Otros nombres: Carbonerito. Carbonero. Frigilo negro. Fringilo negro chico. Jilguero carbonero. Minero. Yal.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13,5 cm.
Peso: Contreras y Davies (1980): N= 21 (M) X= 16,4 g (Rango 14,7 a 18,8), N= 19 (H) X= 15,6 (Rango 14,1 a 17,0); Salvador (1988):N= 1 (H) 18,0 g; Salvador (1990a): N= 2 (M) 17,8 y 18,0 g; Camperi (1992c): N= 1 (M) 17,0 g; Salvador (2014a): N= 3 (M) X= 17,2 g (Rango 16,9 a 17,6), N= 3 (H) X= 16,2 g (Rango 15,8 a 16,8); Alderete y Capllonch (2012): N= 14 X= 16,1 g (Rango 12 a 19)
Coloración. Pico amarillo. Patas rosadas. Iris pardo.
Macho. Dorsal gris estriada de negro. Frente, lorum, lados de la cabeza y ventral negros. Flancos grises con estrías pardas. Alas negruzcas con los márgenes más claros. Cola negra.
Hembra. Dorsal grisácea estriada de pardo oscuro. Ventralmente blanquecina estriada de pardo.



COMPORTAMIENTO
Anda solo o en pareja.
Durante el cortejo se eleva y desciende con un planeo, cantando y abriendo las alas y la cola.

Alimentación
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semilla*Amaranthus* sp.,Gramíneasno determinadas. FrutosSolanácea. **Insectos:**Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas). Orthoptera (Acridiidae).
Marone et al. (2008).**Vegetales:** Semilla *Aristida mendocina, Chenopodium papulosum, Digitaria californica, Diphachne dubia, Glandularia mendocina, Heliotropium mendocinum, Pappophorum* sp.*, Setaria leucophila, Sporobolus cryptandrus, Trichloris crinita*.

HÁBITAT
Estepas arbustivas y patagónicas, bordes de bosques y áreas salitrosas.

NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en Chubut.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

El nido tiene forma de taza. Es construido con pajas y trozos de nylon. Internamente raicillas y plumas. Sostenido en ramas de arbustos. Oculto o semiexpuesto. Elaborado.



De la Peña (2013c). Península Valdés, dpto. Biedma, Chubut, 01-01-1987, nido en arbusto a 0,80 m del suelo, 3 huevos.

Medidas: Diámetro total: 10 x 14 cm. Diámetro interno: 5 cm. Profundidad: 3,5 cm. Alto: 5 cm.

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, celeste pálido con pintas pardas distribuidas por toda la superficie.

Medidas
De la Peña (2013c): 21,5 a 22 x 16 a 16,3 X= 21,7 x 16,1 (N= 3)

Peso
De la Peña (2013c): cáscaras 0,160 X= 0,160 (N= 3)


Ascochinga.Córdoba.09-06-2007. Hembra


Península Valdés.Chubut. 01-01-1987

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: negruzco con el pico y las patas amarillos. Hembra: dorsal y pecho estriados. Patas amarillas. Pico amarillo con punta negra.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phrygilus carbonarius (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837) en Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, sur de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. En otoño migra hasta Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Especie endémica de Argentina nidificando en toda el área central llegando hasta Santa Cruz por el este. En invierno migra hacia el norte a los ambientes de Chaco y Monte.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Camperi (1992c); Daguerre (1933); Darrieu y Camperi (2001a); Holland (1897, 1923); Morici (2014); Narosky y Di Giacomo (1993); Zapata (1998)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Salvador (1990a)

Chubut
Citas: De la Peña (1996a); Sainz-Trápaga (2014); Vuilleumier (1993)

Observaciones: De la Peña (Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, 05-11-1979)

Córdoba
Citas: Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Ascochinga, dpto. Colón, 09-06-2007)

La Pampa
Citas: Chebez et al. (1998); Coconier (2005); Dabbene (1933); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005); Pereyra (1937); Siegenthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Capurro y Bucher (1982, 1986); Giacomelli (1907, 1923)

Mendoza
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Blendinger y Alvarez (2002); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Contreras y Davies (1980); Darrieu y Segura (2015); López de Casenave (2001); López de Casenave y Marone (1996); López de Casenave et al. (2008); Lucero (2013f); Marone (1990, 1991, 1992a, 1992b); Marone et al. (1997, 1998, 2000, 2008); Martínez et al. (1997a); Milesi et al. (2002); Sanzín (1918); Sosa (1995d)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Contreras y Davies (1980); Gelain y Tolosa (2011b); Hartert y Venturi (1909); Lambertucci et al. (2009); Llanos et al. (2011); Piacentini et al (2003)

Observaciones: De la Peña (San Antonio Oeste, dpto. San Antonio, 03-11-1979)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)


San Juan
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Gelain y Pereyra Lobos (2011); Lucero (2013f, 2013i)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993).

Observaciones: De la Peña (Quines, dpto. Ayacucho, 18-07-1973)

Santa Cruz
Citas: Zancaner en Darrieu et al. (2009)

Santa Fe
Citas: Straneck (1999); Areta et al. (2014b)



Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991); Salvador (1988)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Ortiz et al. (2013c)

YAL PLATERO *Phrygilus alaudinus* (Kittlitz, 1833)

Otros nombres: Fringilo de cola blanca. Platero.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 1 X= 28,8 g; Salvador (1988):N= 1 (H) 29,5 g, N= 1 (M) 33,0 g, N= 4 (M) X= 31,3 g (Rango 26,5 a 34,0); Navas y Bó (1991): N= 13 (M) X= 28 g (Rango 26,2 a 30), N= 4 (H) X: 26,4 g (Rango 25,7 a 28); Alderete y Capllonch (2012): N= 8 X= 27,7 g (Rango 26 a 30)
Coloración. Pico y patas amarillo naranja. Iris pardo.
Macho. Dorsal gris plomizo estriada de negro. Rabadilla y supracaudales gris uniforme. Garganta, cuello y pecho grises plomizos. Abdomen y subcaudales blancos. Alas negras. Cola negra con mancha blanca en el centro de las barbas internas, excepto en el par central.
Hembra. Dorsal gris pardusca estriada de negro. Ventral ocrácea estriada de pardo. Subcaudales blancas. Cola parda con manchas blancas como en el macho.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o en grupos. Se posa en el suelo, arbustos, postes, pircas. El macho canta. Se alimenta de semillas. Realiza vuelos cortos, ondulados.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto, acompañado de un corto vuelo planeado, es la repetición de un agudo silbo: Psiiiih ... psiiii .. psiiii ...

HÁBITAT
Estepas altoandina y pastizales altoserranos.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.

Más información:
Goodall et al. (1946)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: gris plomizo con manchas blancas (visibles en vuelo). Pico y patas amarillos. Hembra: parda ocrácea estriada de oscuro. Cola con manchas blancas. Pico y patas como el macho.
Diferenciar la hembra de las hembras del Yal plomizo y del Yal chico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA



Phrygilus alaudinus venturii Hartert, 1909 entre los 3000 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba y San Luis.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Seis subespecies. Por la cordillera entre los 3.000 y 4.000 metros de altura en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Phrygilus alaudinus venturii Hartert, 1909

Catamarca
Citas: Carma (2009); Navas y Bó (1991c); Nores (1995); Salvador (1988); Vides Almonacid (1999)

Observaciones: De la Peña (El Alamito, dpto. Andalgalá, 16-12-1999)
Córdoba
Citas: Castellanos (1934); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Navas y Bó (1991c); Nores (1995, 1996); Straneck (1990d); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (El Sauce, dpto. Totoral, 13-03-2003)

Jujuy
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Burgos et al. (2009) ; Campagna et al. (2011); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Dabbene (1933); Fiora (1934); Mazar Barnet (1998)

Observaciones: De la Peña (Humahuaca, dpto. Humauaca, 02-02-1977)

La Rioja
Citas: Giannini et al. (2001); Nores (1995); Nores y Salvador (1985)

Salta
Citas:Moschione et al. (2013); Nores (1995)

San Juan
Citas: Nores (1995); Nores y S. A. Salvador (1996)


San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993); Nores (1995); Nores y Yzurieta (1981); Salvador (1988)

Tucumán
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Echevarría et al. (2008c); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c)

YAL GRANDE *Idiopsar brachyurus* Cassin, 1866

Otros nombres: Chanchito grande. Diuca picuda. Fringilo grande. Idiopsar.
DESCRIPCIÓN
Largo: 18 cm.
Peso: Alderete y Capllonch (2012): N= 1 (?) 45 g
Coloración. Pico gris córneo, mandíbula más pálida. Patas rosadas. Iris pardo rojizo.

Dorsal gris plomizo. Garganta y puntos suboculares blanquecinos. Ventral gris clara. Subcaudales blanquecinas. Alas negruzcas con las plumas con ribetes claros.



HÁBITAT
Estepas, quebradas andinas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración general gris. Iris y patas amarillos. Pico largo. Cola corta.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Idiopsar brachyurus Cassin, 1866 entre los 2000 y los 3000 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán y norte de Catamarca.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. En Perú, Bolivia y Argentina en los Andes entre 3.000 y 4.500 metros de altura.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Carma (2009); Nores (1995)

Jujuy
Citas: Blendinger (1998); Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Di Giacomo et al. (2007); Mazar Barnett et al. (1998a); Monteleone y Roesler (2005); Moschione et al. (2011); Swales (1926)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013); Nores (1995)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Dabbene (1926a); Lucero (1983); Mazar Barnet (2001); Nores (1995); Olrog (1949); Ortiz et al. (2005, 2013c); Peris y Alabarce (1991)

DIUCA DE ALAS BLANCAS *Diuca speculifera* (d´Orbigny & Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Diuca aliblanco. Diuca ala blanca.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18 cm.
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Dorsal gris oscura. Mancha blanca debajo de los ojos. Garganta y abdomen blancos. Pecho gris. Alas negruzcas con mancha blanca en las primarias. Cola negruzca con las barbas laterales de las plumas externas blancas.

HÁBITAT
Terrenos áridos rocosos altoandinos.

NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en Jujuy.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N										

Semiesfera de pastos, internamente lanas.

Höy (1976a). Tres Cruces, dpto. Humahuaca, Jujuy, 12 de febrero, nido en un Churqui (*Prosopis ferox*) a 1,20 m del suelo. Emplea pastos y lanas. Mide 6-7 cm de diámetro interno, 15 cm en el externo, 4 cm de profundidad. Construcción floja y poco resistente.Tenía un huevo, de fondo verde, salpicado y manchado de marrón y violeta,



Más información:
Goodall et al. (1946)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Gris con manchas suboculares y alares, garganta y abdomen blancos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Diuca speculifera (d´Orbigny & Lafresnaye, 1837) a 4000 m de altura en Jujuy y Salta.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. En la Puna de Andes de Perú, Bolivia, Argentina, y Chile entre 4.000 a 5.500 metros.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Di Giacomo et al. (2007); Höy (1976a)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

DIUCA COMÚN. *Diuca diuca* (Molina, 1782)

Otros nombres: Aurora. Aurorita. Cardenal plomizo. Cardenal plomito. Cardenal plomo. Dinca. Diuca. Diuca pico grueso. Plomito.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17 cm.
Peso: Contreras (1975): N= 21 (?) X= 36,5 g (Rango 31,6 a 40,6); Contreras y Davies (1980): N= 13 (M) X= 25, 9 g (Rango 24,1 a 27,8), N= 9 (H) X= 25,5 (Rango 24,2 a 27,7); Navas y Bó (1986b): N= 1 (M) 26,8 g, N= 1 (?) 28,8 g; Salvador (1990a): N= 1 (?) 27,2 g (*minor*); N= 3 (?) 35,5 , 37,2 y 35,7 g (*crassirostris*); Camperi (1992c): N= 4 (M) 25,0 , 27,0 , 27,0 27,5 g; N= 1 (H) 27,0 g; Blendinger (1999): 25,6 g; Christie et al. (2004): N= 5 (?) 36,6 g (Rango 35,0 a 39,0); Alderete y Capllonch (2012): (*crassirostris*) N= 4 X= 34,2 g (Rango 31 a

46); N= 30 X= 25,2 (Rango 29,5 a 29,5), N= 8 X= 25,7 (Rango 24 a 29), (*diuca*) N= 10 X= 27,1 (Rango 20 a 36); Salvador (2014a): N= 12 (?) X= 27,1 g (Rango 24,3 a 28,7)
Macho. Dorsal gris plomizo. Garganta blanca. Pecho y flancos grises. El resto de la parte ventral blanco. Subcaudales castañas. Alas negruzcas con las plumas ribeteadas de gris. Cola negruzca con el tercio terminal de las plumas externas blanco.
Hembra. Dorso con tono ocráceo.

COMPORTAMIENTO
Anda solitaria, en pareja o en grupos. Canta. Se posa en arbustos o en el suelo.

Alimentación
Martínez et al. (1975). **Vegetales:** *Erodium* sp*., Medicago lupulina, Silene* sp*., Stellaria media*. **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae). Homoptera. Hymenoptera (Formicidae).
Grigera (1976).**Vegetales:** Frutos, Hojas, Tallos no determinados Semillas *Plantago* sp., Poligonacea. **Insectos:** Coleópteros.
González Gómez et al. (2004).**Vegetales:** Néctar *Puya berteroniana.*
Haene et al. (2007).**Vegetales:** Fruto*Berberis buxifolia.*
Marone et al. (2008).**Vegetales:**Semilla*Aristida mendocina,Digitaria californica, Diplachne dubia,Lappula redowskii, Pappophorum* sp*., Parthenium hysterophorus, Setaria leucopiga, Sphaeralcea miniata, Trichloris crinita.*
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Fruto *Berberis buxifolia, Schinus longifolia*.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semilla *Chenopodium* sp., Gramíneas *Panicum miliaceum, Sorghum* sp.**Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Curculionidae, Elateridae, Scarabaeidae). Hemiptera. Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas).



HÁBITAT
Praderas, estepas arbustivas patagónicas y altoandinas, serranías arboladas, arbustales.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Catamarca, Mendoza, La Pampa, San Luis, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Chubut, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

El nido tiene forma de taza. Emplea pajitas o fibras vegetales desmenuzadas, en matorrales o dentro de nidos abandonados.Oculto. Elaborado.

Reed (1913). Mendoza es parasitado por *Molothrus bonariensis*
Goodall (1923). Córdoba-San Luis es parasitado por *Molothrus bonariensis*
Pereyra (1937b). La Pampa, nidos en nidos de *Coryphistera alaudina* y *Asthenes baeri.*
Wetmore (1926a). La Pampa es parasitado por *Molothrus bonariensis*
Zapata y Cabrera (1969). Chasicó, pdo. Villarino, Buenos Aires, 14-12-1967, 3 huevos.
Friedmann et al. (1977). Buenos Aires Narosky es parasitado por *Molothrus bonariensis*
Camperi (1992c). Igarzábal, pdo. Patagones. Buenos Aires, nido con 3 huevos.

Salvador y Salvador (1984). Unión, dpto. Gobernador Dupuy, San Luis, 24-11-1982, un pichón *Molothrus bonariensis*; Viedma, dpto. A. Alsina, Río Negro, 22-11-1983, 4 huevos propios y 1 de *Molothrus bonariensis.*
Mezquida y Marone (2001). Reserva Ñacuñán, dpto. Santa Rosa, Mendoza.Nidifica.
Fraga (2002). Río Negro y Chubut es parasitado por *Molothrus bonariensis*
Mezquida (2003). Reserva de Ñacuñán, dpto. Santa Rosa, Mendoza, observaciones en el período reproductivo desde 1995 a 1999, se localizaron nidos entre noviembre y enero.es parasitado por *Molothrus bonariensis*



Christie et al. (2004). Nidos en noviembre. Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Salvador (2012f). Río Negro y Neuquén es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
De la Peña (2013c). Tinogasta, dpto. Tinigasta, Catamarca, 08-02-1977, en nido de espinas (abandonado), 3 huevos; San Antonio Oeste, dpto. San Antonio, Río Negro, 03-11-1979, en nido de espinas (abandonado), 4huevos; Paso Chacabuco, dpto. Pilcaniyeu, Río Negro, 10-01-1983, en arbusto, un huevo y Río Ñirihuau, dpto. Pilcaniyeu, Río Negro, 25-11-1988, nido en Calafate y Rosa mosqueta, con 4 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis.* (Los dos últimos nidos localizados por A. Casas)
Medidas: Diámetro total: de 8 a 10 cm. Diámetro interno: de 6 a 8 cm. Profundidad: de 4 a 5 cm. Alto: 10 cm.
Salvador (2014b). Neuquén nido en nido de *Pseudoseisura gutturalis.*
Salvador y Bodrati (2014a). Médanos, pdo. Emilio Lamarca, pdo. Buenos Aires, A. Di Giacomo, localizó nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, verdosos con pintas grises y pardas u ocres distribuidas por toda la superficie.





Medidas
Pereyra (1938b): 20,0 a 23,0 x 15,0 a 17,0
Zapata y Cabrera (1969):23,3 a 24,4 x 18,7 a 20,2 X= 24,0 x 19,4 (N= 3) un huevo sin manchas
Mezquida (2003): X= 21,8 x 16,0 (N= 21)
De la Peña (2013c): 23,2 a 24 x 17 a 17,4 X= 23,5 x 17,1 (N= 3) *D. d. crassirostris*
De la Peña (2013c): 21,1 a 22,8 x 14 a 15,5 X= 21,6 x 14,8 (N= 3) *D.d.minor*
De la Peña (2013c): 23,7 x 17,3 a 17,8 X= 23,7 x 17,5 (N= 2) *D. d. diuca*

Peso
Mezquida (2003): X= 3,1 (N= 20)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,210 a 0,222 X= 0,217 (N= 3)*D.d. crassirostris*
De la Peña (2013c): cáscaras 0,182 a 0,207 X= 0,196 (N= 3) *D.d.minor*

De la Peña (2013c): cáscaras 0,198 a 0,200 X= 0,199 (N= 2) *D. d. diuca*

Generalidades
Mezquida (2003). Período de incubación 12 días.

Otro
Mezquida (2003). Salvador en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Reed (1913). Goodall (1923). Wetmore (1926a). Friedmann et al. (1977).Salvador y Salvador (1984).Fraga (2002). Mezquida (2003). De la Peña (2013c). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

Más información:
Casas y De la Peña (1994).Mezquida (2003).De la Peña (2013c)



Río Ñirihuau. Río Negro. 25-11-1988
Nido parasitado por *Molothrus bonariensis*



Tinogasta.Catamarca.08-02-1977

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Gris con la garganta, el abdomen y las plumas externas de la cola blancas. Subcaudales castañas. Diferenciarla del Comesebo puneño.


DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Diuca diuca diuca (Molina, 1782) desde Mendoza, por el oeste de la Patagonia hasta Santa Cruz; *Diuca diuca minor* Bonaparte, 1850 desde el sur de Córdoba y de Buenos Aires hasta Santa Cruz. En otoño migra hasta Tucumán, Santiago del Estero y Corrientes y *Diuca diuca crassirostris*Hellmayr, 1932 hasta los 2500 m de altura desde Salta, Jujuy y Tucumán hasta Córdoba y San Juan.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Se encuentra desde el sur de Bolivia a la Patagonia Argentina y sur de Chile con registros en invierno austral en Uruguay y Brasil.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Diuca diuca diuca (Molina, 1782)

Chubut
Citas:Boswall (1973); Camperi (1998); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Fraga (2002); Navas y Bó (1987b); Sainz-Trápaga (2014); Vidoz (1995)



Observaciones: De la Peña (Esquel, dpto. Futaleufú, 03-02-1976; Puerto Madryn, dpto. Biedma, 04-11-1979)

La Rioja
Citas: Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Blendinger (1999); Blendinger y Alvarez (2002); Blendinger y Ojeda (2001) (*); López de Casenave et al. (2008) (*); Cueto et al. (2006) (*); López de Casenave (2001) (*); López de Casenave y Marone (1996); Marone (1990, 1991, 1992a, 1992b) (*); Marone et al. (1997, 1998, 2000, 2008) (*); Mezquida (2002, 2003); Mezquida y Marone (2001); Milesi et al. (2002, 2008) (*); Pereyra (1927e); Sanzín (1918)

Observaciones: De la Peña (Llancanelo, dpto. Malargüe, 15-10-2004)

Neuquén
Citas:Acerbo en Fiori y Zalba (1999) (*); Chebez en Veiga et al. (2005)(*); Chehebar et al. (1992) (*); Christie et al. (1988) (*); Christie et al. (2004); Contreras (1975, 1977b) (*); Daciuk (1968) (*); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007) (*); Navas y Bó (1987b) (*); Olrog (1979) (*); Pereyra (1945); Peters (1923b) (*); Straneck (1990a); Veiga et al. (2005) (*)

Observaciones: De la Peña (La Rinconada, dpto. Huiliches, 27-01-1976; Confluencia, dpto. Los Lagos, 20-11-1998)

Río Negro
Citas:Camperi (1998); Casas y De la Peña (1994); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras et al. (1980b); Daciuk (1977); Fraga (2002); Gelain (1984a, 2001, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera (1976); Grigera y Pavic (2007); Grigera y Rubullis (1985); Hecker y Vidoz (1998); Llanos et al. (2005, 2011); Navas y Bó (1987, 1987b); Peters (1923b)

Observaciones: De la Peña (San Carlos de Bariloche, dpto. Bariloche, 31-01-1976)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1998); Imberti (2003, 2005)

Diuca diuca minor Bonaparte, 1850

Buenos Aires
Citas: Camperi (1992c); Darrieu y Camperi (2001a); Morici (2014); Narosky (1983); Narosky y Di Giacomo (1993); Pereyra (1938b); Salvador y Bodrati (2014a); Short (1967); Zapata (1998); Zapata y Cabrera (1969)

Catamarca
Citas: Salvador (1990a); Vides Almonacid (1999)

Chubut
Citas: Contreras y Davies (1980)

Observaciones: De la Peña (Punta Loma, dpto. Biedma, 27-11-2000)

Córdoba
Citas:Castellanos (1934); Heredia (2006); Miatello et al. (1991-1994, 1999, 2003); Navas y Bó (1987b); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1983a); Salvador(1983); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1996)

Entre Ríos
Citas: Camperi (1992)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Chebez et al. (1998); Contreras y Davies (1980); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Navas y Bó (1986b, 1987b); Noriega et al. (1993); Pessino (2006); Pessino et al. (2002); Pereyra (1927e, 1937); Rainer Cinti (1983); Salvador y Bodrati (2013a); Siegenthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1982, 1986); Giacomelli (1923); Navas y Bó (1987b)

Mendoza
Citas: Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Contreras y Davies (1980); Lucero (2013f); Lucero (1987b); Navas y Bó (1987b); Roig (1965) (*); Sosa (1995d)

Río Negro
Citas: Casas (1992a); Casas y De la Peña (1994); Contreras y Davies (1980); De la Peña (1983a); Gelain y Tolosa (2011); Navas y Bó (1987b, 1990); Salvadory Salvador (1984)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Lucero (2013f, 2013i); Navas y Bó (1987b)

San Luis
Citas: Casares (1944); Masramón (1983); Navas y Bó (1987b); Nellar Romanella (1993); Salvadory Salvador (1984)

Observaciones: De la Peña (Quines, dpto. Ayacucho, 18-07-1973)

Santa Cruz
Citas: Hellmayr (1938); Imberti (2003); Oustalet (1891)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011); De la Peña et al. (2003); Giai (1950); Pautasso (2002a, 2002b)

Santiago del Estero
Citas: Navas y Bó (1987b); Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Clarck (1986)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Navas y Bó (1987b); Ortiz et al. (2013c)

Diuca diuca crassirostris Hellmayr, 1932

Catamarca
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Casas y De la Peña (1994); Carma (2009); De la Peña (1983a); Navas y Bó (1987b); Salvador (1990a); Vides Almonacid (1999); Zotta (1939a)

Cordoba
Nores et al. (1983)

Jujuy
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Burgos et al. (2009) ; Camperi et al. (2013)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1982, 1986); Esteban (1953); Hayward (1967); Navas y Bó (1987b)

Salta
Citas: Esteban (1953); Moschione et al. (2013); Navas y Bó (1987b)

Observaciones: De la Peña (Cachi, dpto. Cachi, 06-12-1977)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Alderete y Capllonch (2012); Gelain y Pereyra Lobos (2011b) (*); Navas y Bó (1987b)

Observaciones: De la Peña (Talacasto, dpto. Ullún, 15-01-1982)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Handford (1983); Lucero (1983); Navas y Bó (1987b); Zotta (1939a)

YAL AUSTRAL *Melanodera melanodera* (Quoy y Gaimard, 1829)

Otros nombres: Canario de Tierra del Fuego. Canario de las Malvinas. Yal amarillo. Yal de ceja blanca. Yal de garganta negra. Yal grisamarillo. Yal patagónico.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14,5 cm.
Peso: Humphrey et al. (1970): N= 5 (M) X= 28,3 g, N= 3 (H) X= 32,4 g
Coloración. Pico: maxila negra, mandíbula gris azulina. Patas negras. Iris pardo.
Macho. Cejas y regiones malares blancas. Lorum y garganta negros. Corona y espalda grises con tono ocráceo. El resto de la parte dorsal amarillo verdoso. Ventralmente amarillo verdoso. Flancos grises. Subcaudales blancas. Alas pardas con las primarias ribeteadas de amarillo, las secundarias de ocráceo y blanquecino. Cubiertas alares amarillas verdosas. Cola negruzca con las plumas ribeteadas de amarillo, las más externas amarillas con el tercio terminal negruzco.
Hembra. Dorsal gris pardusca estriada de pardo oscuro. Rabadilla parda rojiza. Lorum y garganta blanquecinos. Ventralmente amarillo pálido estriado de gris. Pecho con tono pardo. Abdomen y subcaudales blancos. Primarias con reborde amarillo verdoso. Cubiertas menores amarillas verdosas. Medianas y mayores con las puntas blanquecinas. Cola parda oscura con las plumas externas amarillas.



COMPORTAMIENTO

Alimentación
Crawshay (1907). Granos,semillas.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es la repetición de una sílaba:
Juip.ti.juip.tli.juip.tli..

HÁBITAT
Pastizales húmedos.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: cabeza gris con cejas y líneas malares blancas. Garganta y cuello anterior negros. Hembra: estriada con amarillo en las alas y en las plumas externas de la cola.
Se diferencia del Yal andino por tener el macho diferente color en las cejas y en las líneas malares.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Melanodera melanodera melanodera (Quoy y Gaimard, 1829) en las islas Malvinas y *Melanodera melanodera princetoniana* (Scott, 1900) en Santa Cruz y Tierra del Fuego.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Distribución restringida alsur de Chile y de Argentina e Islas Malvinas.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Melanodera melanodera melanodera (Quoy y Gaimard, 1829)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (1988, 2006)

Melanodera melanodera princetoniana (Scott, 1900)

D.G. Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1998); Coconier (2005); Dabbene (1933); Darrieu et al. (2009); Di Giacomo et al. (2005); Harris (2008); Imberti (2003, 2005); Pozzi (1923); Scott (1900b); Stone (1928); Wetmore (1926b)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948); Vuilleumier(1997a)

YAL ANDINO *Melanodera xanthogramma* (Gould &G.R.Gray, 1839)

Otros nombres: Cordillerano. Jilguero de Magallanes. Jilguero de Tierra del Fuego. Yal cordillerano del Sur. Yal de ceja amarilla. Yal verde.

DESCRIPCIÓN



Largo: 16 cm.
Peso: Humphrey et al. (1970): N= 4 (M) 28,8 g, N= 5 (H) X= 28,8 g
Coloración. Pico gris azulino. Patas negras. Iris pardo.
Macho. Dorsal gris con tono celeste, manchada de amarillo verdoso. Cejas superciliares y líneas malares, amarillas. Lorum y garganta negros. Ventral amarilla grisácea, más clara en el abdomen. Subcaudales blanquecinas. Alas pardas con las primarias ribeteadas de amarillo y las secundarias de amarillo y gris. Cola con las plumas centrales negruzcas con tono a amarillo, las externas amarillas con la parte terminal blanca y negruzca.
Hembra. Dorsal canela claro, muy estriada de pardo. Cara y ventral amarillentas estriadas de pardo oscuro. Subcaudales amarillentas. Alas pardas ribeteadas de amarillo y canela claro. Cola negruzca con las plumas externas orilladas de amarillo.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Reynolds en Humphrey et al. (1970).Semillas.

HÁBITAT
Estepas, arboledas cerca de arroyos, costas marinas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: amarillento con las cejas y líneas malares, amarillas. Garganta y cuello anterior negros. La hembra estriada.
Diferenciarlo del Yal austral.
La hembra se parece a la del Yal negro.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Melanodera xanthogramma xanthogramma(Gould &G.R.Gray, 1839) en Tierra del Fuego (Accidental en las islas Malvinas) y *Melanodera xanthogramma barrosi* Chapman, 1923 por el oeste, desde Mendoza y Neuquén hasta Santa Cruz.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies.Sur de Argentina y Chile

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Melanodera xanthogramma xanthogramma (Gould &G.R.Gray, 1839)

Tierra del Fuego
Citas:Humphrey et al. (1970); Olrog (1948, 1950); Reynolds (1934)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (1988, 2006)

Melanodera xanthogramma barrosi Chapman, 1923

Chubut
Citas: Camperi (1998); Vidoz (1995)

Mendoza
Citas: Chebez et al. (1993); Darrieu y Segura (2015); Martínez et al. (2009)

Neuquén
Citas: Blendinger (1998); Chebez et al. (1993); Contreras (1976, 1977b); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005); Zotta (1940)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras et al. (1980b); Gelain (2010); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubullis (1985); Hecker y Vidoz (1998); Paz Barreto (1997b)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1988, 1998); Coconier (2005); Darrieu et al. (2009); Gelain et al. (2003); Imberti (2005e); Wetmore (1926b); Zotta (1940)

AFRECHERO PLOMIZO *Haplospiza unicolor* Cabanis, 1851

Otros nombres: Arrocero unicolor. Cigarra. Fringilo plomo. Pichochó.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12,5 cm.
Peso: Alderete y Capllonch (2012): N= 6 X= 14,3 g (Rango 12 a 15)
Coloración. Pico negruzco con base de la mandíbula amarillenta. Patas negruzcas. Iris pardo oscuro.
Macho. Coloración general gris plomiza. Alas pardas oscuras con las plumas ribeteadas de gris. Cola gris.
Hembra. Dorsal parda olivácea. Ventral blanquecino. Pecho estriado de oliváceo.

HÁBITAT
Tacuarales en selvas y capueras.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: coloración general gris uniforme. Hembra: pardo olivácea.
Ventralmente blanquecina con el pecho estriado.
El macho se parece al del Yal plomizo.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Haplospiza unicolor Cabanis, 1851 en Misiones y Corrientes. Observado además en el noreste de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Endémico de la Selva Atlántica en el este de Paraguay, sureste de Brasil y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Di Giacomoy Di Giacomo (1991); Hellmayr (1938); Pereyra (1951)

Corrientes
Citas: Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1996)

Misiones
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Bodrati et al. (2010); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Chebez (1996a); Partridge (1954)

SOLDADITO COMÚN *Lophospingus pusillus* (Burmeister, 1860)

Otros nombres : Afrechero. Afrechero copete negro. Afrechero copetón negro. Afrechero de corbata. Cardenal chico. Cardenal negro. Granaderito. Soldadito.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13 cm.
Peso: Contreras y Davies (1980): N= 3 (M) X= 14,6 g (Rango 13,7 a 15,3), N= 3 (H) X= 13,7 (Rango 13,2 a 14,3); Alderete y Capllonch (2012): N= 7 (?) X: 13,21 g (Rango 12 a 15); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 (M) 12,5 y 13,5 g, N= 5 X= 14,1 g (Rango 13,5 a 14,5)
Coloración. Pico rosado amarillento. Patas pardas. Iris pardo.
Macho. Copete, franjas oculares y garganta negras. Cejas superciliares y líneas malares blancas. Dorsal gris. Ventral gris clara. Alas pardas ribeteadas de gris. Cubiertas alares pardas y grises. Cola negruzca con las plumas externas con la mitad terminal blanca.
Hembra. Más parda. Garganta blanca. Sin negro.



COMPORTAMIENTO
Anda solitario, en pareja o en grupos.

Alimentación
Olrog (1956).Insectos.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Bosques, sabanas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, San Luis.


MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Semiesfera de fibras vegetales liadas con telas de arañas. Internamente raicillas, crines y algunas plumitas.

Dinelli (1918b).Tucumán, Girard localizó un nido. Mide 7 x 5 cm.
Masramón (1980). Nidifica en San Luis.

Huevos

Pone 3 huevos blanco-azulados con manchitas pardas, más concentradas en el polo mayor.



Medidas
Dinelli (1918b): 18,0 a 19,0 x 13,5 a 14,0 X= 18,5 x 13,7 (N= 2)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Copete y garganta negros. Franjas oculares negras bordeadas de blanco.
Plumas externas de la cola blancas.
La hembra es pardusca con la garganta blanca.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Lophospingus pusillus (Burmeister, 1860) en Jujuy, Salta, oeste de Formosa y de Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, Córdoba y San Luis.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se extiende por el Chaco Seco de Bolivia, Paraguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Montaldo y Claver (1986); Narosky y Di Giacomo (1993)

Catamarca
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Carma (2009)

Chaco
Citas: Moschione y Bishels (2005)

Córdoba
Citas: Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Pereyra (1951); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Formosa
Citas:Contreras (1987c)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998)

Observaciones: De la Peña (Chorrillos, dpto. Humahuaca, 10-02-1983)

La Rioja
Citas:Capurro y Bucher (1982, 1986); Di Giácomo et al. (2007); Giacomelli (1923); Salvador y Di Giacomo (2014)

Mendoza
Citas: Blendinger y Ojeda (2001); López de Casenave (2001)

Salta
Citas:Alabarce y Lucero (1977); Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (La Viña, dpto. La Viña, 08-12-1977)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene (1987); Haene et al. (1995); Lucero y Chebez (2001)

San Luis
Citas: Casares (1944); Contreras y Davies (1980); Masramón (1979, 1983); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)

Santa Fe
Citas: Luna y Manassero (2013)

Santiago del Estero
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Bodrati y Salvador (2015a); Codesido y Bilenca (2000); Esteban (1953); Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Malbrán, dpto. Aguirre, 09-12-1977)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014)

SOLDADITO GRIS *Lophospingus griseocristatus* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)



Otros nombres: Afrechero boliviano. Afrechero copetón. Afrechero copetón gris. Afrechero gris.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14,5 cm.
Peso: Rising (2011): 13,1-20,2 g
Coloración. Pico: maxila parda, mandíbula amarillenta. Patas pardas. Iris pardo.
Macho. Copete gris oscuro. Dorsal gris. Ventral gris clara. Centro del abdomen y subcaudales blancos. Alas negruzcas. Cola negruzca con el tercio terminal de las plumas externas blanco.
Hembra. Más pálida.

HÁBITAT
Terrenos áridos arbustivos en la prepuna.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración general gris. Copete. Cola negruzca con blanco en las plumas externas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Lophospingus griseocristatus (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837) entre los 2000 y los 3000 m de altura en el norte de Salta y Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Valles secos y áreas desérticas entre 2.000 y 3.000 metros de altura en Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Olrog (1979)

Salta
Citas:Moschione et al. (2013); Olrog (1979); Zotta (1940)

CACHILO CANELA *Donacospiza albifrons* (Vieillot, 1817)

Otros nombres: Monterita. Pajerito. Pajerito bayo. Pajerito canela. Pajerito de cabeza gris.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16 cm.
Peso: Di Giacomo (2005h): N= 2 X= 15,0, Salvador y Di Giacomo (2014): N= 15 X= 16,1 g (Rango 14,3 a 19,0), N= 1 16,5 g
Coloración. Pico negruzco. Patas rosado oscuro. Iris pardo oscuro.
Cabeza y espalda grises con tono ocráceo. El resto de la parte dorsal canela con estrías pardas. Cejas blanquecinas. Regiones auriculares grises. Ventralmente canela. Alas pardas con las plumas ribeteadas de ocráceo. Cola parda con las barbas externas ocráceas.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en pareja. Es inquieto. Vuela bajo y corto.



Alimentación
Zotta (1936).Arena.Semillas.Vegetales.
De la Peña (2010).Insectos.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es la repetición de dos o tres sílabas: Chichichi Chi . chi . chir . chichichieh.

HÁBITAT
Pajonales, juncales.



NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Formosa, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N

El nido tiene forma de taza, sostenido entre yuyos, cerca del suelo. Es construido con pajitas finas, desmenuzadas en la parte interna. Oculto. Elaborado.

Uranga (*in litt*.). Colonia Carlos Pellegrini, dpto. San Mattín, Corrientes, 10-11-2014, nido con 3 huevos.
Wetmore (1926b). Ajó, pdo. de la Costa, Buenos Aires, nidifica.
Pereyra (1938b). Gral. Lavalle, pdo. Gral. Lavalle, Buenos Aires, Runnacles en diciembre de 1937 ubicó un nido con huevos y otros con pichones.
Di Giacomo y Aguilar (1987). Hudson, pdo. Berazategui, Buenos Aires, 02-02-1986, pareja de adultos con un pichón de *Molothrus bonariensis*.
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nido con un huevo en octubre.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre noviembre y marzo. Se estudiaron 11 nidos.
De la Peña (2013c). Monte Vera, dpto. La Capital, Santa Fe, 20-12-1990, nido en un Yuyo, a 0,30 m del suelo. Tenía 3 huevos y 3 de *Molothrus bonariensis.*
Medidas: Diámetro total: 9 cm. Diámetro interno: 6 cm. Profundidad: 6 cm. Alto: 8 cm.


Monte Vera.Santa Fe.20-12-1990
Parasitado por *Molothrus bonariensis*


Monte Vera.Santa Fe.20-12-1990


Monte Vera.Santa Fe.20-12-1990

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, blancos con manchitas castañas y algunas negras, más concentradas en el polo mayor.


Medidas
Hartert y Venturi (1909): 18 a 20 x 14,0 a 14,5
Di Giacomo (2005h): 18,2 a 20,7 x 13,8 a 15,1 X= 19,5 x 14,5 (N= 12)
De la Peña (2013c): 18,8 a 19,1 x 14 a 14,1 X= 19 x 14 (N= 3)

Peso
Di Giacomo (2005h): 1,6 a 2,1 X= 1,9 (N= 12)
De la Peña (2013c): 1,3 a 1,6 X= 1,5 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,100 a 0,110 X= 0,103 (N= 3)

Generalidades
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 13 días. La pareja alimenta a los pichones.Permanecen en el nido 12 días.

Otros
Di Giacomo y Aguilar (1987). Darrieu et al. (1988). De la Peña (2013c): Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cejas blanquecinas. Ventralmente canela. Dorso estriado. Cola larga.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Donacospiza albifrons (Vieillot, 1817) en el este de Formosa y de Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, hasta el sur de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica.Este de Paraguay, sureste de Brasil, Uruguay y Argentina. Una población aislada en Bolivia.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Codesido et al. (2013); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Hartert y Venturi (1909); Holland (1895); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987a); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Petracci et al. (2004a); Pugnali y Chamorro (2008); Wetmore (1926b)

Córdoba
Citas: Miatello et al. (2003); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b); White (1883b); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1996); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Salvador y Di Giacomo (2014)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); López-Lanús et al. (2013c); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Straneck (1990e)

Formosa
Citas: Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); López Lanús (1997); Salvador y Di Giacomo (2014)

Misiones
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Krauczuk (2005, 2008)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); López-Lanús et al. (2013d); Pautasso (2002b)

Salta
Citas:Moschione et al. (2013)

MONTERITA QUEBRADEÑA *Poospiza boliviana* Sharpe, 1888

DESCRIPCIÓN
Largo: 16 cm.
Coloración. Pico gris pardusco con punta y culmen negros. Patas negruzccas. Iris pardo.

Dorso pardo-rojizo pálido. Cejas blancas. Lados de la cabeza y del cuello gris-pardusco Ventralmente blanco, banda en el pecho y lados del cuerpo pardo-rojizas.
Alas y cola negruzcas. Remeras internas orilladas de rojizo. Plumas centrales de la cola con punta blanca.



HÁBITAT
Áreas montañosas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Poospiza boliviana Sharpe, 1888 observada en Salta y Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Ambiente montano en Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009) ; Camperi et al. (2013); Monteleone y Roesler (2205)

Salta
Citas:Mazar Barnett y Pearman (2001); Moschione et al. (2013)

MONTERITA DE PECHO GRIS *Poospiza hypochondria* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Chivichió. Monterita pecho gris. Monterita gris. Monterita pechigris.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16,5 cm.
Peso: Rising (2011): 18-24,5 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 4 (?) X: 22 g (Rango 20 a 25)
Coloración. Pico: maxila negra, mandíbula gris. Patas negruzcas. Iris pardo.
Dorsal gris pardusca. Cejas superciliares blancas, por arriba una línea negra. Región malar blanca. “Bigotes” negros. Garganta blanquecina. Pecho gris. Resto de la parte ventral ocráceo. Flancos castaños. Alas negruzcas con las remeras orilladas de ocráceo. Cola negruzca con el par externo de plumas con puntas blancas.

HÁBITAT
Matorrales, pastizales, estepas andinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en Jujuy.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										

Semiesfera de pajitas. Internamente fibras finas y cerdas. Expuesto. Elaborado.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.

De la Peña (2013c). Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 08-02-2001, nido en un hueco en pared de barro, a 2 m del suelo, un pichón. (Localizado por M. Uranga)
Medidas: Diámetro total: 10 cm. Diámetro interno: 4,5 cm. Profundidad: 4 cm. Alto: 7 cm.




IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cejas y regiones malares blancas. “Bigores” negros. Pecho gris. Flancos

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Poospiza hypochondria affinis Berlepsch, 1906 hasta los 2500 m de altura, desde Jujuy y Salta hasta Mendoza, Córdoba y San Luis.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Andes de Bolivia y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Poospiza hypochondria affinis Berlepsch, 1906

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Nores (1995); Vides Almonacid (1999)

Córdoba
Citas: Baldo y Ordano (1993); Heredia (2006); Miatello et al. (1993, 1999); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1986); Volkmann y Cargnelutti (2001); Yzurieta (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Di Giacomo et al. (2007); De la Peña (2013c); Mazar Barnet (1998); Monteleone y Roesler (2005)

La Rioja
Citas: Giannini et al. (2001); Nores (1995)

Mendoza
Citas: Contreras (1979g); Darrieu y Segura (2015); Olivera et al. (2009); Roig (1965); Sanzín (1918)

Neuquén
Citas:Veiga et al. (2005)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Hartert y Venturi (1909); Moschione et al. (2013); Nores (1995)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993); Nores y Yzurieta (1981)

Tucumán
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c)

MONTERITA DE CEJAS ROJIZAS *Poospiza erythrophrys* P. L. Sclater, 1881

Otros nombres: Monterita ocrácea. Monterita ceja castaña. Monterita de ceja rojiza. Siete vestidos.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13,5 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 2 X= 14,1 g (Rango 13,2 a 15,0); Salvador (1988):N= 2 (H) 14,0 y 14,00 g, N= 1 (M) 15,0 g, N= 7 (?) X= 15,6 g (Rango 14,2 a 17,2); Alderete y Capllonch (2012): N= 112 (?) X: 13,96 g (Rango 10 a 16)

Coloración. Pico gris azulino. Patas pardas. Iris pardo.
Macho. Cabeza gris. Lorum, región subocular y cejas superciliares castaños. Dorsal gris con tono castaño. Ventral castaña. Alas negruzcas, primarias ribeteadas de blanco, las secundarias de canela. Cubiertas negruzcas con bordes blancos. Cola negra con el tercio terminal de las plumas externas blanco.
Hembra. Ventralmente más clara.

COMPORTAMIENTO
Anda sola, en pareja o grupos. Es inquieta. Canta fuerte.
Se desplaza por la parte media y baja de la vegetación.



HÁBITAT
Bosques, selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Catamarca.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N



El nido tiene forma de taza. Es construido con fibras vegetales. Internamente muy finas. Externamente lo recubre con líquenes.Oculto. Elaborado.

Dinelli (1918b).Tafí Viejo, dpto. Tafí Viejo, Tucumán, Girard halló un nido. Nidifica en noviembre y enero.
De la Peña (2013c). Río Potrero y ruta 48, dpto. Andalgalá, Caramarca, 18-12-1999, nido en un árbol a 2,20 m, con 3 huevos.
Medidas: Diámetro total: 11,5 cm. Diámetro interno: 6 cm. Profundidad: 4 cm. Alto: 9 cm.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, 2 nidos con 4 y 3 huevos cada uno.

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, celeste verdosos con pintas negras y algunas grises

y castañas, concentradas en el polo mayor.

Medidas
Dinelli (1918b): 18,0 a 20,0 x 14,0 a 15,0 X= 19,0 x 14,5 (N= 2)
Smyth (1928): 20,5 x 14,5
De la Peña (2013c): 19,4 a 20 x 15 a 15,2 X= 19,3 x 15 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscara 0,140 X= 0,140 (N= 3)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza gris con cejas superciliares y manchas suboculares castañas. Ventral castaña. Blanco en las plumas externas de la cola.
Se diferencia de la Monterita canela por tener otro color en las cejas y en las bandas de las cubiertas alares.



Río Potrero y ruta 48.Catamarca.18-12-1999

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Poospiza erythrophrys erythrophrys P. L. Sclater, 1881 entre los 1000 y los 2500 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Andes del centro-oeste de Bolivia y noroeste de Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Poospiza erythrophrys erythrophrys Sclater, 1881

Catamarca
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); De la Peña (2011a); Nores et al. (2000)

Observaciones: De la Peña (Belén, dpto. Belén, 08-02-1977 y 11-03-1981)

Jujuy
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Fiora (1934); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988); Straneck (1990f)

Observaciones: De la Peña (Laguna de Yala, dpto. Capital, 07-02-1983)

La Rioja
Citas: Hayward (1967); Nores y Yzurieta (1981); Salvador (1988)

Salta
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Moschione et al. (2013)
Observaciones: De la Peña (Camino de Cornisa, dpto. La Caldera, 30-11-1978)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Alderete y Capllonch (2012); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Dinelli (1918); Echevarría et al. (2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Malizia et al. (1998); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Rougés y Blake (2001)

MONTERITA CANELA *Poospiza ornata* (Landkeck, 1865)

Otros nombres: Coloradita. Ladrillito. Monterita. Monterita cola blanca. Siete vestidos chico.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13,5 cm.
Peso: Alderete y Capllonch (2012): N= 77 (?) X: 12,41 g (Rango 10 a 15); Salvador (2014a): N= 6 (?) X= 11,6 g (Rango 10,5 a 12,9)
Coloración. Pico: maxila negra, mandíbula gris azulina. Patas negruzcas. Iris pardo.
Macho. Cejas canelas. Cabeza, rabadilla y supracaudales grises. El resto de la parte dorsal gris con tono castaño oscuro. Garganta, pecho y flancos castaños. Abdomen y subcaudales canelas. Alas negruzcas con las primarias orilladas de blanquecino y las secundarias de canela. Cubiertas negruzcas con puntas ocres. Cola negruzca con blanco en las plumas externas.
Hembra. Ventralmente más clara.

COMPORTAMIENTO
Anda sola o en pareja, a en veces grupo.
Se alimenta de insectos y de semillas en el suelo y en el estrato herbáceo, hasta los 2 m.



Alimentación
Zotta (1936g). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae). Hemípteros. Orthópteros (Gryllidae).
Marone et al. (2008). *Vegetales:* Semilla *Aristida mendozina, Chenopodium papulosum,Coryza* sp.*,Descurainia* sp.*,Digitaria californica,Lappula redowskii, Pappophorum* sp.*, Setaria leucopila, Sporobolus cryptandrus, Trichloris crinita.*
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010).
Vegetales: Semilla*Amaranthus* sp., *Chenopodium* sp.*,*Gramíneas. **Insectos**: Lepidoptera (orugas).
Areta et al. (2014b). **Vegetales:** Semillas de Cola de zorro (*Cortaderia selloana*)

HÁBITAT
Estepas arbustivas, orillas de montes, matorrales, bosques.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Mendoza, La Pampa.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	

Semiesfera de fibras vegetales.

Uranga (*in litt.*). Lihuel Calel, dpto. Lihuel Calel, La Pampa, 03-11-2010, nido con un huevo.
Mezquida y Marone (2001). Reserva Ñacuñán, Mendoza.Nidifica.
Pereyra (1938b). La Pampa, nido en noviembre.

Huevos
Pone 3 huevos blanquecinos con pintas pardas distribuidas por toda la superficie.

Medidas
Pereyra (1938b): 17,0 x 14,0

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cejas canelas. Ventralmente castaña. Dos bandas ocres en las cubiertas alares. Cola con blanco en las plumas externas.
Diferenciarla de la Monterita ceja rojiza.




Lihuel Calel. La Pampa. 03-11-2010
Foto: Máximo Uranga

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Poospiza ornata (Landkeck, 1865) en La Rioja, San Luis, Córdoba, San Juan, Santiago del Estero, Mendoza, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires. En otoño migra al norte hasta Salta y por el este hasta Santa Fe y Entre Ríos.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Endémico de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Buenos Aires
Citas: Darrieu y Camperi (2001a); Delhey y Carrete (1999); Gianoli (2011); Narosky y Di Giacomo (1993); Morici (2014); Navas y Bó (1991c); Pereyra (1923b, 1937a, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Short (1967)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Esteban (1953); Lobo Allende et al. (2009, 2010); Navas y Bó (1991c)

Chaco
Citas: Moschione y Bishels (2005)

Córdoba
Citas: Heredia (2006); Miatello et al. (1991, 1994); Navas y Bó (1991c); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador (1983); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Entre Ríos
Citas: Roesler et al. (2006); Ronchi Virgolini et al. (2008)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998)

La Pampa
Citas: Bonkewitz (1990); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Navas y Bó (1991c); Pereyra (1937); Siegenthaler (2004); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1982, 1986); Chebez (2005); Di Giácomo et al. (2007); Giacomelli (1907, 1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895); Lobo Allende et al. (2009, 2010)

Mendoza
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Blendinger y Ojeda (2008); Cueto et al. (2006, 2008); Darrieu y Segura (2015); Gigoux y Looser (1930); López de Casenave (2001); López de Casenave y Marone (1996); López de Casenave et al. (2008); Lucero (2013f); Marone (1990, 1991, 1992a, 1992b); Marone et al. (1997, 2008); Roig (1965); Mezquida (2004); Mezquida y Marone (2001, 2002, 2003a, 2003b); Milesi et al. (2002, 2008); Sagario y Cueto (2014)

Neuquén
Citas:Babarskas et al. (1996); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas:Gelain y Tolosa (2011) Llanos et al. (2011)

Salta
Citas: Capurro y Bucher (1988); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Alderete y Capllonch (2012); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene et al. (1995); Lucero (2013f, 2013i); Navas y Bó (1991c)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Navas y Bó (1991c); Nellar Romanella (1993).

Santa Fe
Citas: De la Peña (1996b, 2011f); Areta et al. (2014b)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991); Nores y Yzurieta (1981)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al (2011b, 2014); Lucero (1983); Navas y Bó (1991c); Ortiz et al. (2013c)

SIETEVESTIDOS *Poospiza nigrorufa* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Antifaz. Bichi bichi. Chichivió. Chilenito. Chiloe. Chivichio. Chuí. Miente mi tío. Monterita. Monterita castaña. Monterita común. Quién te vistió. Siete vestidos. Tiene mi tío.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14 cm.
Peso: Contreras (1979f): N= 3 (M) X: 19,2 g (Rango 17 a 20,7), N= 1 (H) 20 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 3 (?) X: 17,16 g (Rango 15,5 a 19); Salvador (2014a): N= 3 (?) X= 16,9 g (Rango 16,6 a 17,1); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (H) 19,0 g
Coloración. Pico gris pardusco con culmen y punta negros. Patas negruzcas. Iris pardo.
Corona y parte dorsal grises. Cara negra. Cejas blancas. Líneas blancas desde la base del pico a los lados de la garganta. Ventral y flancos castaños. Abdomen blanco. Alas pardas oscuras. Cubiertas grises. Cola parda oscura con las plumas externas con el ápice blanco.
Juvenil. Dorso gris pardusco. Ventralmente gris jaspeado de pardo oscuro. Leve tono castaño. Alas y cola pardas oscuras.

COMPORTAMIENTO
Anda solo o en pareja. Canta fuerte.
Se alimenta de insectos y de semillas en el suelo y en el estrato herbáceo, hasta los 2 m

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Semillas de Maicillo (*Sorghum halepense*)
Zotta (1932). **Insectos:** Himenópteros. **Vegetales:** Semillas.
Zotta (1936g). **Insectos:** Coleópteros (Chrysomelidae). Hemípteros. Orthópteros (*Schistocerca paranensis*). **Vegetales**: Semillas. **Otros:** Arena.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Curculionidae, no identificado). Orthoptera (Tettigonidae). **Vegetales:** Gramíneas (semillas). Semillas.
De la Peña (2010). Insectos.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es la repetición de cuatro sílabas: Juit . tiu . juit . tieh .. Juit . tiu . juit . tieh ...



HÁBITAT
Montes, sabanas, matorrales, pajonales.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Chaco, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N



El nido tiene forma de tacita o semiesfera. Es sostenido o asentado en ramas, matorrales. A veces tapado por hojas de enredaderas. Es construido con tallos de yuyos, pajas, hojas. Internamente raicillas.Oculto. Elaborado.

Hartert y Venturi (1909). Nidos en Chaco.
Gibson (1918). Buenos Aires Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Pereyra (1937b). Buenos Aires Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Pereyra (1938b). Noreste de la provincia de Buenos Aires, nidifica desde octubre a diciembre.
Friedmann et al. (1977). Runnacles y Narosky Buenos Aires Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Di Giacomo (1986a). Hudson, pdo. Berazategui, Buenos Aires, nido con 3 huevos.
Pautasso (2002b).Reserva Urbana de la Ciudad Universitaria UNL “El Pozo”, dpto. La Capital, Santa Fe, 19-10-2000, nido con un huevo, un pichón y un huevo de *Molothrus bonariensis*, 09-11-2000, nido con 3 huevos y uno de *Molotrhus bonariensis.*
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 3 nidos en octubre y noviembre.
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 12, desde el 13-11-1980 al 17-12-2003, todos en provincia de santa Fe. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Medidas: Diámetro total: de 9 a 11 cm. Diámetro interno: de 5,5 a 6 cm. Profundidad: de 2 a 4 cm. Alto: de 4 a 7 cm.
Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 7 nidos. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, griseso verdosos o gris-verdosos, con pintas, manchitas y líneas pardas grises y negras.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 18,5 a 22,5 x 14,0 a 19,5
Pereyra (1938b): 20,0 x 15,0
Di Giacomo (1986a): 19,5 a 20,7 x 14,8 a 15,1 X= 20,1 x 14,9 (N= 3)
De la Peña (2013c): 19,2 a 21 x 14,4 a 15,7 X= 19,7 x 15 (N= 5)

Peso
De la Peña (2013c): 2,1 a 2,4 X= 2,2 (N= 5)
De la Peña (2013c): cáscara 0,118 a 0,120 X= 0,118 (N= 5)

PICHONES

Descripción.

Nacen con los ojos cerrados. Piel verdosa. Cavidad bucal, lengua y paladar, rojizos. Comisura blanca. Escaso plumón gris.

3 días

Ojos abiertos. Se notan en las zonas ptéridas dorsales las vainas.

5 días

Vainas de las plumas dorsales: 0,4 cm.

Vainas de las plumas ventrales amarillentas. Punta de las vainas alares blanquecinas, resto gris.

Cabeza gris como el adulto.

7 días

Ventral ocráceo amarillento jaspeado de gris. Patas verde amarillentas. Láminas pardo oscuro. Dorsal como el adulto.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,3	0,8	1,2						
2	0,4	1,1	1,6						
3	0,5	1,5	2,0	0,5		0,4			
4	0,5	1,7	2,2	1,0					
5	0,6	2,0	2,4	1,5	0,4	1,3		0,2	
6	0,6	2,1	2,6	1,6	0,5	1,3		0,4	
7	0,6	2,3	2,7	1,6	0,6	1,3		0,6	

Generalidades

De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 8 a 10 días. Período de incubación 14 días. Los huevos son puestos en días corridos. Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido 16 días. Ambos sexos incuban y alimentan a los pichones.



Esperanza.Santa Fe.02-12-1990
Parasitado por *Molothrus bonariensis*



Esperanza.Santa Fe.19-11-2006



Esperanza.Santa Fe.21-11-2008



Santa Rosa.Santa Fe.02-01-1991



Esperanza. Santa Fe. 01-02-2005. Ubicación nido



Esperanza.Santa Fe.02-12-1990



Santa Rosa.Santa Fe.02-01-1991



Esperanza. Santa Fe. 08-11-1998



Esperanza. Santa Fe. 17-12-2003



Esperanza. Santa Fe. 19-11-2006

Otros

Gibson (1918). Pereyra (1937b).Darrieu et al. (1988).Pautasso (2002b). De la Peña (2013c). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Cejas y "bigotes" blancos. Cara negra. Ventralmente castaño con el abdomen blanco.
El juvenil sin "bigotes". Ventralmente jaspeado.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Poospiza nigrorufa (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837) desde Misiones, este de Formosa y este de Córdoba hasta Río Negro.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies.Sureste deParaguay, sureste de Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Dabbene (1919b); Darrieu y Camperi (2001a); Doering (1881); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Hartert y Venturi (1909); Hudson (1872); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987a); Leveau y Leveau (2011b); Lucero et al. (2011); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Salvador y Di Giacomo (2014); Soave et al. (1999b)



Catamarca

Citas: Carma (2009); Esteban (1953)

Córdoba

Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Dardanelli et al. (2006b); Dardanelli y Nores (2001); Haro (1998); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b); Salvador (1983); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Obispo Trejo, dpto. Río Primero, 20-09-2002; Jesús María, dpto. Colón, 16-06-2006)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1980-81, 1987b); Darrieu y Camperi (1996)

Observaciones: De la Peña (Paso de los Libres, dpto. Paso de los Libres, 11-12-2002)

Entre Ríos
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012); Hartert y Venturi (1909); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Straneck (1990c); Zapata (1975)

Formosa
Citas:Contreras (1987c); López Lanús (1997)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Esteban (1953); Lucero(1982)

La Pampa
Citas: Bonkewitzz (1990); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011)

Misiones
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001); Chebez (1996a); Militello y Chebez (2009); Navas y Bó (1993)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2005, 2011); Fandiño y Pautasso (2011); Pautasso (2002b); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson (1926)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Lucero (1983)

SIETEVESTIDOS SERRANO *Poospiza whitii* Sclater, 1881

Otros nombres: Monterita. Quién te vistió.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 1 17,0 g; Salvador (2014a): N= 9 (?) X= 16,4 g (Rango 14,8 a 17,2)**;** Alderete y Capllonch (2012): N= 5 (?) X: 14,5 g (Rango 13,5 a 15);
Coloración. Pico gris pardusco con culmen y punta negros. Patas negruzcas. Iris pardo.
Corona y parte dorsal negruzcas. Cara negra. Cejas blancas con la parte terminal castaña. Líneas blancas desde la base del pico a los lados de la garganta. Ventral y flancos castaños. Abdomen blanco. Alas pardas oscuras. Cubiertas grises. Cola parda oscura con las plumas externas con el ápice blanco.
Juvenil. Dorso gris pardusco. Ventralmente gris jaspeado de pardo oscuro. Leve tono castaño. Alas y cola pardas oscuras.

COMPORTAMIENTO



Alimentación
Zotta (1932).**Vegetales.**Semillas.
Haro (1998). **Insectos:**Homoptera (Cercopidae).
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:**Coleoptera (Chrysomelidae, Curculionidae, no identificado).Hemiptera (Pentatomidae, no identificado). Hymenoptera (Formicidae).Lepidoptera (polillas).Orthoptera (Acridiidae). **Vegetales:**Gramíneas (semilla).*Sorghum halepense* (semilla).

HÁBITAT
Bosques, matorrales.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Córdoba.



MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			N						N	N	N

El nido tiene forma de tacita o semiesfera. Es sostenido o asentado en ramas, matorrales. A veces tapado por hojas de enredaderas. Es construido con tallos de yuyos, pajas, hojas. Internamente raicillas.Oculto. Elaborado.
Es similar al de *Poospiza nigrorufa*.

Miller (1917). Salta nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Dinelli (1924). Tucumán, nido en abril y pichones en noviembre.
De la Peña (2013c). Va. Gral. Belgrano, dpto. Calanuchita, Córdoba, 26-11-1990, nido en un Crateus a 0,28 del suelo con un huevo y un pichón propios y un pichón de *Molothrus bonariensis.* (Nido localizado junto con Anibal E. Casas y Roberto Straneck); Ascochinga, dpto. Colón, Córdoba, 20-01-2010, nido en un Arbusto a 0,40 m de altura, 3 pichones.
Medidas: Diámetro total: de 11 a 12 cm. Diámetro interno: 5 cm. Profundidad: 2,5 cm. Alto: 4,5 cm.

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, grises verdosos, con pintas y manchitas castañas, grises y negras.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 19,0 x 14,0
Dinelli (1924): 21,0 x 15 y 20,0 x 15,0
De la Peña (2013c): 20 x 15,6 (N= 1)

Peso
De la Peña (2013c): 2,1 (N= 1)
De la Peña (2013c): cáscara 0,119 (N= 1)

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c).Nacen con los ojos cerrados. Plumón gris oscuro. Pico amarillento. Paladar rosado.
Otros
Miller (1917). De la Peña (2013c). Anfitrión de*Molothrus bonariensis*.



Ascochinga.Córdoba.22-01-2010. Ubicación nido



Jesús María.Córdoba.02-05-2008



VillaGral.Belgrano.Córdoba.26-11-1990



Ascochinga.Córdoba.22-01-2010



Jesús María.Córdoba.02-05-2008

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cejas y "bigotes" blancos. Cara negra. Ventralmente castaño con el abdomen blanco.
El juvenil sin "bigotes" . Ventralmente jaspeado.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Poospiza whitii Sclater, 1881, hasta los 2500 m de altura, desde Jujuy y Salta, Tucumán, La Rioja y oeste de Córdoba hasta Mendoza.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Andes del oeste de Bolivia, noroeste y serranías Centrales de Argentina hasta los 2500 m.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Vides Almonacid (1999)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, 11-03-1981)

Córdoba
Citas: De la Peña (2005); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Sferco y Nores (2003); Straneck (1990d)

Observaciones: De la Peña (Carlos Paz, 26-05-2001; Ascochinga, 28-11-2009)


Jujuy
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Fiore (1934); Zotta (1932)

La Rioja
Citas: Capurro y Bucher (1982); Nores e Yzurieta (1982a)

Mendoza
Citas: Contreras (1980ñ); Darrieu y Segura (2015)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (La Viña, 08-12-1977)



San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Luceroy Chebez (2011)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Santiago del Estero
Citas: Quiroga (2014)

Tucumán
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Brandán y Navarro (2009); Dinelli (1924); Hartert y Venturi (1909); Ortiz et al. (2011b, 2013c); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014)

MONTERITA LITORALEÑA *Poospiza cabanisi* Bonaparte, 1850

Otros nombres: Miente mi tío. Monterita. Monterita de rabadilla castaña. Monterita de rabadilla roja. Monterita litoral. Monterita lomirroja. Monterita rojiza.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13,5 cm.
Peso: Darrieu y Camperi (1996): N= 3 (M) X: 17,1 g (Rango16,1 a 18,2); Rising (2011): 18-21 g
Coloración. Pico gris amarillento, culmen negro. Patas gris oscuras o parduscas. Iris rojizo.
Cejas y líneas malares blancas. Corona y nuca grises. Espalda gris con tono castaño. El resto de la parte dorsal castaño. Garganta y pecho grises claros. Abdomen blanquecino. Subcaudales y flancos, castaños. Alas negruzcas con ribetes ocráceos en las primarias y castaños en las secundarias. Cola negruzca con blanco en el cuarto terminal de las plumas externas.
La hembra carece de blanco en la cola.

COMPORTAMIENTO
Anda sola o en pareja. Busca el alimento en el suelo o a baja altura entre los matorrales. Canta, tiene una voz de contacto y otra de alarma.

Alimentación
Montaldo (1993).**Vegetales:** Fruto de *Ligustrum* sp.
Roitman et al. (1997).**Vegetales:** Pétalos de *Myrrhinium atropurpureum*.
Zotta (1936). **Insectos:** Coleópteros (Chrysomelidae). Hymenópteros (Formicidae). Lepidópteros (orugas).
Olson y Alvarenga (2006). **Insectos:** Isoptera (Termitas).
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.



Voces
Straneck (*in litt*.). El canto consta de cuatro o cinco silbos agudos repetidos esporádicamente: Sip . sie . siu . swith ..... Sip .sie . siu ... swith ...

HÁBITAT
Matorrales, estrato bajo de bosques húmedos y selvas en galería.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											

Semiesfera de fibras vegetales.
Pereyra (1933b). Buenos Aires nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pereyra (1938b). Delta del Paraná, Buenos Aires, 15 de enero, nido con un huevo y 2 de *Molothrus bonariensis*.

Huevos
Pone 3 huevos azul verdosos con pintas negras.



Medidas
Pereyra (1938b): 21,0 x 14,5

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cejas y regiones malares blancas. Rabadilla, subcaudales y flancos castaños. Pecho gris.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Poospiza cabanisi Bonaparte, 1850en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y noreste de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica.Sureste deBrasil, este de Paraguay, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Hartert y Venturi (1909); Mérida y Bodrati (2006); Montaldo (1993); Moschione (1989); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1933b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Corrientes
Citas: Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1996); White (1882)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá, 19-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2011a); Raffo et al. (2008); Roitman et al. (1997); Straneck (1990c)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Chebez (1996a); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Navas y Bó (1993); White (1982)

MONTERITA DE COLLAR *Poospiza torquata* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Monterita. Monterita acollarada. Monterita anillada. Quién te vistió de collar. Vizcachita.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12 cm.
Peso: Contreras y Davies (1980): N= 7 (M) X= 10,7 g (Rango 9,7 a 11,7), N= 5 (H) X= 11,0 (Rango 10,1 a 12,1); Salvador (1988): N= 1 (H) 10,0 g; Navas y Bó (1991): N= 9 (M) X: 10,5 g (Rango 10 a 11,8), N= 7 (H) X: 11,7 g (Rango 10,9 a 13,2); Blendinger (1999): 10,3 g; Salvador (2014a): N= 1 (M) 11,8 g, N= 8 (H) X= 9,9 g (Rango 9,2 a 10,8); Alderete y Capllonch (2012): N= 54 X= 10,2 g (Rango 9 a 12); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 3 X= 9,6 g (Rango 9,5 a 9,7)
Coloración. Pico negruzco. Patas pardas. Iris pardo.
Frente, finas líneas a los lados de la corona, franjas oculares y collar negros. Cejas superciliares y garganta blancas. Corona y parte dorsal grises. Ventralmente blanquecina. Flancos grisáceos. Subcaudales castañas.

Alas pardas. Primarias orilladas de blanquecino, secundarias de ocráceo. Cubiertas menores negras orilladas de gris. Cubiertas mayores pardas oscuras y blancas. Cola parda oscura con la mitad terminal de las plumas externas blanca.

COMPORTAMIENTO
Anda solitaria o en pareja. El macho canta. Recolecta alimentos en el estrato herbáceo y en ramas, desde 0,50 a 3 m

Alimentación
Olrog (1956a). **Vegetales:** Semillas no determinadas. **Insectos.**
Martínez et al. (1975). **Vegetales:** Gramineae (*Panicum* sp.). **Insectos:** Coleoptera. Homoptera (Membracidae). Lepidoptera. Orthoptera (Phaneropteridae).
Genise et al. (1993). **Vegetales:**Savia*Aspidosperma quebracho-blanco,Prosopis flexuosa.*
Blendinger (1999). **Vegetales:** Savia *Prosopis flexuosa.*
Marone et al. (2008). **Vegetales:** Semilla *Aristida mendocina, Bouteloua* sp*., Digitaria californica, Diphachne dubia, Eragrotis* sp*., Pappophorum* sp*., Setaria leucopila, Sporobolus cryptandrus, Trichloris crinita.*
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:**Semilla *Amaranthus* sp*., Chenopodium* sp*.,* Gramíneas. **Insectos:**Lepidoptera (orugas). Orthoptera (Tettigonidae).
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Sabanas, estepas, orillas de montes, matorrales, áreas rurales.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N

El nido tiene forma de tacita. Emplea fibras vegetales. Internamente fibras finas y algunas cerdas. Atado a ramitas de arbustos.Expuesto. Elaborado.



Dinelli (1924). Tucumán, nido en diciembre.
Masramón (1962). San Luis, nido con 3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*.
Zapata y Cabrera (1969). Chasicó, pdo. Villarino, Buenos Aires, 16-12-1968, nido con un huevo.
Friedmann et al. (1977). Salta, Höy localizó nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Masramón (1980). Nidifica en San Luis.
Mezquida y Marone (2001). Reserva Ñacuñán, Mendoza.Nidifica.
Sánchez et al. (2009). INTA La María, Santiago del Estero, se localizaron 66 nidos.
De la Peña (2013c). Encón, dpto. Rosario de Lerma, Salta, 26-02-1976, en arbusto a 1,50 m de altura, 2 huevos (Nido localizado por Gunnar Höy), Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 10-11-1995, nido en Ombú, a 180 m del suelo con un huevo y 05-12-1998, en Cardo a 0,60 m del suelo con 2 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*, 11-12-2003, Rosario de la Frontera, dpto. Rosario de la Frontera, Salta, nido en arbusto a 1,20 m de altura, 2 huevos.
Medidas: Diámetro total: de 6,5 a 7 cm. Diámetro interno: de 4,5 a 5 cm. Profundidad: 3 cm. Alto: de 4 a 4,5 cm.



Esperanza.Santa Fe.05-12-1998
Parasitado por *Molothrus bonariensis*



Jesús María. Córdoba. 20-01-2013



Esperanza.Santa Fe.05-12-1998



Esperanza.Santa Fe.05-12-1998



Jesús María. Córdoba. 20-01-2013 Foto: Martín D. de la Peña

Huevos
Pone 2 ó 3 huevos, ovoidales, blanquecinos con tono celeste con pintas y manchitas pardas, grises y negras, más concentradas en el polo mayor.



Medidas
Hartert y Venturi (1909): 17,5 a 18,3 x 13,0 a 13,8
Dinelli (1924): 17,5 x 13,5
Smyth (1928): 18,0 a 19,5 x 12,5 a 14,5
Pereyra (1937b): 16,0 x 13,0
Zapata y Cabrera (1969): 18,0 x 14,6
De la Peña (2013c): 17 a 17,8 x 13 a 13,7 X= 17,2 x 13,3 (N= 7)

Peso
De la Peña (2013c): cáscara 0,089 a 0,090 X= 0,089 (N= 3)

Otros
De la Peña (2013c). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cejas, garganta y parte ventral blancas. “Antifaz” y collar negros. Bandas en las cubiertas y en las plumas de la cola blancas. Subcaudales castañas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Poospiza torquata pectoralis Todd, 1922 desde Jujuy, Salta y Formosa hasta Mendoza, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, sur y noreste de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Bolivia, Paraguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Poospiza torquata pectoralis Todd, 1922

Buenos Aires
Citas: Cali y Aguilar (2002); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey y Carrete (1999); Holland (1893a); Morici (2014); Narosky et al. (1990); Narosky y Di Giacomo (1993); Pugnali y Chamorro (2008); Roesler (2003); Zapata (1998); Zapata y Cabrera (1969)



Catamarca
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (Belén, dpto. Belén, 08-02-1977; Andalgalá, dpto. Andalgalá, 17-12-1999)

Chaco
Citas: Moschione y Bishels (2005)

Córdoba
Citas:Dardanelli et al. (2006b); Dardanelli y Nores (2001); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Obispo Trejo, dpto. Río Primero, 19-09-2002; Marull, dpto. San Justo, 17-09-2404; Jesús María, dpto. Colón, 10-07-2005)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Marateo et al. (2009)

Formosa
Citas:Contreras (1987c); Esteban (1953)

Jujuy
Citas: Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Di Giacomo et al. (2007)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Chebez et al. (1998); Coconier (2005); Contreras y Davies (1980); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Pereyra (1927e); Siegenthaler (1984, 2004); Siegrnthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1982, 1986); Chebez (2005); Di Giácomo et al. (2007); Giacomelli (1907, 1923); Hayward (1967); Salvador y Di Giacomo (2014)

Mendoza
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Blendinger (1999); Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Contreras y Davies (1980); Darrieu y Segura (2015); Freiberg (1943); Guerra-Navarro y Cueto (2011); López de Casenave (2001); López de Casenave y Marone (1996); López de Casenave et al. (2008); Lucero (2013f); Marone (1991, 1992a, 1992b); Marone et al. (1997); Mezquida y Marone (2001, 2002, 2003a, 2003b); Milesi et al. (2002, 2008); Navas y Bó (1991c); Pereyra (1927d); Sagario y Cueto (2014); Sanzín (1918)

Río Negro
Citas: Llanos et al. (2011)

De la Peña (Chichinales, 28-11-1998)

Salta
Citas:Alabarce y Lucero (1977); Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); De la Peña (2005); Hartert y Venturi (1909); Moschione et al. (2013); Salvador (1988)

Observaciones: De la Peña (Cafayate, 07-02-1977)

San Juan
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene et al. (1995); Lucero (2013f, 2013i); Navas y Bó (1991a, 1991c)

San Luis
Citas: Casares (1944); Masramón (1979, 1983); Navas y Bó (1991c)

Santa Fe
Citas: De la Peña (1996b, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); Pautasso (2002a)

Santiago del Estero
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Hartert y Venturi (1909); Nores et al. (1991); White (1882)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Brandán y Navarro (2009); Dinelli (1924); Echevarría et al. (2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Ortiz et al. (2011b, 2013c); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014)

MONTERITA DE CABEZA NEGRA *Poospiza melanoleuca* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Chispita. Chiví-chiví. Corbatita. Monjita. Monterita común. Monterita cabeza negra. Pampita. Viudita. Vizcachita.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 2 X= 9,0 g; Contreras (1979f): N= 2 (M) 15,0 y 15,0 g, N= 14,0 y 15,0 g; Camperi (1992a): N= 2 (M) 14,7 y 14,9 g; Darrieu y Camperi (1996): N= 2 (M) 13,8 y 14,7 g ; Di Giacomo (2005h): N= 2 X= 10,7 g (Rango 9,0 a 12,5); Alderete y Capllonch (2012): N= 102 (?) X: 11,04 g (Rango 9,0 a 13); Salvador (2014a): N= 8 (?) X= 13,1 g (Rango 11,8 a 14,2); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 5 X= 11,3 g (Rango 10,6 a 12,2)
Coloración. Pico negro. Patas negruzcas. Iris rojizo.
Macho. Cabeza negra. Dorsal gris. Ventral blanca con los flancos grises. Alas pardas. Cola con las plumas centrales pardas ribeteadas de gris, externas pardas oscuras con el tercio terminal blanco.
Hembra. Cabeza y parte dorsal gris con tono ocráceo. Ventralmente blanquecina. Alas y cola pardas.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o en grupos de 6-8 ejemplares.Muy inquieta. Se desplaza rápido. Emite voces de contacto. Recolecta alimentos en el suelo, en el estrato herbáceo y en ramas hasta los 5 m de alto.
Se alimenta de frutos, semillas, flores, hojas, pimpollos (De la Peña, 2001 y De la Peña y Pensiero 2003)
Recolecta en el suelo, estrato herbáceo y ramas. En algunas plantas (géneros *Paspalum, Setaria*) sostiene el tallo o la inflorescencia con una pata, saca las espiguillas y con el pico toma la semilla y tira el resto.

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Pimpollo de Talilla (*Lycium cestroides*).
Zotta (1936g). **Vegetales:** Semillas.
De la Peña y Pensiero (2003). **Vegetales:** Pimpollo *Aspidosperma quebracho blanco, Muehlenbeckia sagittifolia*. Semillas *Baccharis coridifolia, Bidens subalternans, Senecio griseibachii, Setaria parviflora, Cenchrus myosuroides, Chloris ciliata, Chromolaena ivifolium, Gomphrena perennis, Heimia salicifolia, Melica macra, Paspalum quadrifarium, Paspalum urvillei, Pluchea sagittalis, Polygonum punctatum.* Flor *Baccharis salicifolia.* Pimpollo *Celtis ehrenbergiana.* Frutos *Sapium haematospernum, Celtis ehrenbergiana, Lycium boerhaviaefolium, Holmbergia tweedii, Morus alba.*Corteza de agalla *Prosopis alba.*
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:** Flor *Rhipsalis lumbricoides.* Semilla *Setaria vulpiseta.*
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semilla *Amaranthus* sp.*, Chenopodium* sp. , Gramíneas. **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Curculionidae, Scarabaeidae). Hemiptera (Reduviidae). Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas).
Núñez Montellano et al. (2009c). **Vegetales**: Savia de *Prosopis ruscifolia*.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semilla *Panicum maximun.*

De la Peña (2011a). **Vegetales:** Flor *Acacia caven*, *Baccharis salicifolia, Morrenia brachystephana*. Pimpollo *Aloysia gratissima, Aspidosperma quebracho blanco, Celtis ehrenbergiana, Geoffroea decorticans, Muehlenbeckia sagittifolia, Parkinsonia aculeata.* Semillas *Amaranthus quitensis, Baccharis coridifolia, Baccharis salicifolia, Bidens subalternans, Bothriochloa laguroides, Buddleja tubiflora, Cenchrus myosuroides, Chloris ciliata, Chromolaena hookerianum, Chromolaena ivifolium, Gomphrena perennis, Heimia salicifolia, Melica macra, Paspalum quadrifarium, Paspalum urvillei, Pluchea sagittalis, Polygonum punctatum, Salvia cardiophyla, Senecio grisebachii, Setaria lachnea, Setaria pampeana,Setaria parviflora, Sonchus oleraceus, Sorghum halepense, Sorghum sp., Tillandsia recurvata*. Frutos *Castela coccinea, Celtis ehrenbergiana, Lycium boerhaviaefolium, Holmbergia tweedii, Morus alba, Sapium haematospernum, Schinus longifolia.*
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.
Fracchia y Aranda-Rickert (2015). **Vegetales:** Néctar de *Ligaria cuneifolia*.

Voces
Straneck (*in litt*.). Su canto está compuesto por silbos muy agudos: Siib . siieh .. siihi .. siíe .. sihi . sihe . siíhi.

HÁBITAT
Montes, sabanas, matorrales, arbustales, pajonales en orillas de caminos, montes yorillas de selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, San Luis, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N



El nido tiene forma de tacita, es sostenido o atado a tallos de plantas. Emplea fibras vegetales. Internamente raicillas o algunas cerdas. Externamente puede tener líquenes.Expuesto. Elaborado.

Miller (1917). Salta nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Dinelli (1924). Tucumán, nidos en diciembre a febrero.
Friedmann (1929). Tucumán Girardnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pereyra (1938b). Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, Girard localizó un nido el 30 de octubre con 3 huevos.
Höy y Ottow (1964). Saltanido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Masramón (1980). San Luis, nido en diciembre con 3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*.
Salvador y Salvador (1984). Icho Cruz, dpto. Punilla, Córdoba, 18-12-1983, 1 de *Molothrus bonariensis.*
Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 4 nidos.
Babarskas y López Lanús (1993). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 04-11-1989, 3 huevos.
Alabarce y Antelo (1998). San Felipe, dpto. Lules, Tucumán, se localizaron 4 nidos.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre octubre y enero. Se estudiaron 25nidos, de los cuales,4 fueron parasitados por *Molothrus bonariensis*.
Salvador (2011c). Córdobanido parasitado por *Molothrus bonariensis*.



De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 34, desde el 05-01-1978 al 20-10-2006, tres nidos en Córdoba, uno en Corrientes y el resto en provincia de Santa Fe. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Medidas: Diámetro total: de 4,5 a 7 cm. Diámetro interno: de 4 a 5 cm. Profundidad: de 2,5 a 4 cm. Alto: de 3,5 a 7 cm. Grosor de la pared: de 0,7 a 1 cm.
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Nacional Chaco, Chaco, Bodrati en noviembre de 1998, localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", 4 nidos con 3 huevos cada uno.

Huevos

Pone 3 huevos, ovoidales, blancos, verdosos pálido o celeste claro con pintas, líneas y/o rayitas, en mayor cantidad en el polo mayor.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 17,2 a 20,0 x 13,1 a 15,5
Dinelli (1924): 18,0 x 14,0 y 20,0 x15,0
Smyth (1928):18,5 a 19,0 x 14,0 a 14,5
Pereyra (1938b): 18,0 x 13,5
Babarskas y López Lanús (1993): 18,0 x 13,5, 18,0 x 13,5, 18,8 x 13,2
Alabarce y Antelo (1998): 18,5 x 13,9
Di Giacomo (2005h): 16,4 a 20,0 x 12,7 a 14,4 X= 18,0 x 13,8 (N= 38)
De la Peña (2013c). 16,3 a 19,3 x 13,4 a 14,6 X= 18 x 13,8 (N= 12)

Pesos

Di Giacomo (2005h): 1,4 a 2,0 X= 1,7 (N= 35)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,101 a 0,115 X= 0,110 (N= 10)

PICHONES

Descripción.

Nacen con con ojos cerrados. Pico color natural, con punta ocrácea. Comisura blanca. Cavidad bucal y paladar, rojizos.
3 días
Ojos cerrados. Aparecen las vainas en dorsal.
5 días
Abre los ojos, marrones. Vainas de las plumas ventrales blancas de 0,3 cm.
8 días
Piel clara.Pico grisáceo.Comisura blanquecina.
Plumas cubriendo casi todo el cuerpo, grises. Escaso plumón. Lados del pecho y flancos, ocráceos. Pocas vainas en la cabeza, el resto de las plumas con láminas. Alas y cola, grises.
Plumas externas de la cola, blanquecinas.
Lados del pecho y flancos ocráceos. Vainas en la cabeza. Láminas en el resto. Emplumado.

Alimentación.

Los padres traen insectos y gusanitos. Luego de alimentarlos, quedaban de 10 a 20 segundos posados en el borde del nido. Demoran varios minutos en traer comida y se retiran hasta 35 m. del nido, recorriendo los arbustos.



Esperanza.Santa Fe.12-12-2010
Nido parasitado por *Molothrus bonariensis*



Esperanza.Santa Fe.14-12-2010. Ubicación nido



Esperanza.Santa Fe.14-12-2010



Esperanza.Santa Fe.21-01-1978



Jesús María.Córdoba.02-05-2008



Jesús María.Córdoba.28-08-2008



Esperanza.Santa Fe.15-12-2004



Esperanza.Santa Fe.21-01-1978
Nido parasitado por *Molothrus bonariensis*



Esperanza.Santa Fe. 10-11-1995



Jesús María.Córdoba. 02-05-2008

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,2	1,0	1,1						
2									
3	0,5	1,2	1,5	0,3					
4									
5	0,6	1,8	2,2	1,4		1,1		0,2	
6									
7									
8	0,7	2,1	2,7	1,8	0,5	1,7	0,4	0,7	

Generalidades

Contreras (1990b). Los huevos son puestos en días corridos. El período de incubación es de 14 días.
El pichón permanece en el nido 14 días.

Di Giacomo (2005h). La construcción de un nido demoró 10 días. Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 13 ó 14 días. La pareja alimenta a los pichones y permanecen en el nido 14 ó 15 días.
De la Peña (2013c): Demora en la construcción del nido de 8 a 9 días. Período de incubación 14 días. Los huevos son puestos en días corridos. Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido 15 días.



Otros
Antoniazzi et al. (2011); Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Miller (1917). Friedmann (1929). Höy y Ottow (1964). Masramón (1980).Salvador y Salvador (1984).Di Giacomo (2005h).De la Peña (2013c). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorso gris. Ventralmente blanca. Cabeza negra en el macho.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Poospiza melanoleuca (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837) desde el norte del país hasta San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y norte de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Región chaqueña de Bolivia, Paraguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Lucero et al. (2011); Moschione (1989); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Sharpe (1888); Vides Almonacid (1999)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, 13-03-1981)

Chaco
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Bodrati y Salvador (2015a); Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2005); Salvador y Bodrati (2014a)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Dardanelli et al. (2006b); Dardanelli y Nores (2001); De la Peña (2005); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983); Sferco y Nores (2003); Straneck (1990e); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Cuchi Corral, 20-01-2000; Jesús María, 29-07-2008; Ascochinga, 28-11-2009)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b.1990b.); Darrieu y Camperi (1996); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá, 19-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001, 2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Grant (1911c); Laubmann (1930); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Di Giacomo et al. (2007); Fiora (1934); Lucero (1982); Moschione y Segovia (2005); Olrog (1971, 1976)

La Rioja
Citas: Capurro y Bucher (1982, 1986); Di Giácomo et al. (2007); Fracchia y Aranda-Rickert (2015); Giacomelli (1907, 1923); Koslowsky (1895)

Misiones
Citas : Chebez (1996a)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Babarskas et al. (1995); Camperi (1988, 1990); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Núñez Montellano et al. (2009c); Rodríguez (2012b); Salvador y Di Giacomo (2014); White (1882)

Observaciones: De la Peña (San Ramón de la Nueva Orán, dpto. Orán, 02-02-1977)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene (1987); Nores e Yzurieta (1982b)

San Luis
Citas: Casares (1944); Masramón (1979, 1983); Nellar Romanella (1993).

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 20-11-1997)

Santa Fe
Citas:De la Peña (2011a, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Codesido y Bilenca (2000); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996, 1998); Alderete y Capllonch (2012); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Dinelli (1924); Echevarría et al. (2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Malizia et al. (1998); Ortiz et al. (2011b, 2013c); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014)

MONTERITA SERRANA *Compsospiza baeri* (Oustalet, 1904)

Otros nombres: Afrechero de garganta castaña. Chiví andino. Montañero. Montañero. Montero andino. Mudito.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18 cm.
Salvador (1990a): N= 2 (?) 31,5 y 32,6 g, N= 1 (M) 34,5 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 1 (?) 30 g
Coloración. Pico: maxila negruzca, mandíbula gris azulada. Patas grises. Iris pardo rojizo.
Frente, corona, cejas, borde inferior de los ojos y garganta castaños. El resto de la parte dorsal con tono oliva. Ventralmente gris con tono oliva, más claro que en dorsal. Subcaudales castañas. Alas y cola negruzcas.



COMPORTAMIENTO
Alimentación
Soria (2015). Lepidópteros, larvas, semillas.

HÁBITAT
Pastizales en quebradas húmedas y orillas de bosques.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										

Semiesfera de materiales vegetales.

Peris(1997). Infiernillo, Tucumán, 22-01-1993, nido con 3 huevos; 04-02-1993, nido con un pichón.
Soria (2015). Infiernillo, Tafí del valle, Tucumán, Febrero 2014, nido con 3 pichones.

Huevos
Pone 3 huevos blanquecinos con puntos y manchitas pardas y oliva-parduscas.



Medidas
Peris(1997): 20,7 a 21,1 x 15,6 a 15,8 X= 20,9 x 15,7 (N= 3)

PICHONES
Descripción
Soria (2015). Aproximadamente una semana de edad. Piel clara rosada amarillenta, pico amarillo con la punta negra, comisuras blanquecinas, cavidad bucal y paladar rojizos y patas amarillo-anaranjadas. Cañones alares gris oscuro y el cuerpo recubierto por escaso plumón gris oscuro.

Más información:
Peris (1997). Soria (2015)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Gris con tono oliva. Frente, corona, garganta y subcaudales castañas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Compsospiza baeri (Oustalet, 1904) entre los 2000 y los 2500 m de altura en Tucumán y Catamarca, Jujuy, Salta y La Rioja.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica.Endémica.Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Navas y Bó (1991c); Vides Almonacid (1999); Vides Almonacid y Cocimano (1998)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez y Heinonen Fortabat (1987b); Colina y Portales (2012);
Collar et al. (1992); Di Giacomo et al. (2007); González et al. (2011); Monteleone y Roesler (2005); Moschione (2005); Navas y Bó (1991c)

La Rioja
Citas: Bodrati (2005); Giannini et al. (2001); Serret en Chebez (1994)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013); Navas y Bó (1991c); Pearman (2001)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b, 2015); Dinelli (1918); Gill (1996); Handford (1983); Lucero (1983); Navas y Bó (1991c); Ortiz et al. (2005, 2013c); Peris (1997); Salvador (1990a)

JILGUERO DE COLA BLANCA *Sicalis citrina* Pelzeln, 1870

Otros nombres: Jilguero brasilero. Jilguero cola blanca. Jilguero limón.



DESCRIPCIÓN
Largo: 12 cm.
Peso: Rising (2011): 10,7-12,9 g

Coloración. Pico gris azulino. Patas rosadas. Iris pardo.
Macho. Dorsal olivácea. Manto estriado. Frente y rabadilla amarillas. Ventral amarilla con tono oliváceo a los lados del pecho y flancos. Alas negruzcas. Cola negra con mancha blanca en las plumas externas.
Hembra. Dorsal parda estriada de oscuro. Rabadilla olivácea. Garganta y pecho amarillos estriados de oscuro. Abdomen amarillo. Cola como el macho.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

HÁBITAT
Estepas, bordes y claros de selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en Tucumán.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Handford (1983). Tafí del Valle, dpto. Tafí del Valle. Tucumán, 10-12-1973, un nido en una mata de pasto a 4 cm de altura, con 2 huevos.

Más información:
Rising (2011)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Frente, rabadilla y ventral amarillas. Cola con manchas blancas. Hembra jaspeada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sicalis citrina occidentalis Carriker, 1932en Salta, Jujuy, Tucumán y La Rioja.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Distribución de poblaciones separadas en diferentes puntos deeste y norte de Sudamérica al este de los Andes. En: Venezuela, Colombia, Guayana, Surinam, Perú, Brasil,Bolivia y Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sicalis citrina occidentalis Carriker, 1932

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Colina y Portales (2012); Moschione y Segovia (2005)

Salta
Citas:Moschione et al. (2013); Pearman (2001)
Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Handford (1983); Lucero (1983); Ortiz et al. (2013c)

JILGUERO PUNEÑO *Sicalis lutea* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Jilguero boliviano. Jilguero puna. Misto de la puna.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14,5 cm.
Peso: Alderete y Capllonch (2012): N= 2 X= 25,0 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (M) 23,7 g
Coloración. Pico negruzco, base de la mandíbula gris. Patas rosadas a negruzcas. Iris pardo.

Macho. Dorsal amarillenta con tono pardo. Rabadilla y ventral amarillas. Alas y cola pardas oscuras con plumas ribeteadas de amarillo.
Hembra. Dorsal parda con tono amarillo. Rabadilla amarilla. Garganta y pecho grises con tono amarillo. Resto de la parte ventral amarillo. Alas pardas oscuras con finos ribetes amarillos. Cola parda.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o en bandadas. El macho muy cantor.

HÁBITAT
Estepas altoandinas, prepuna.



NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N	N									



Nidifica en cuevas en barrancas. Forra la base de la cámara con pajas, formando una taza.Oculto. Elaborado.
Puede nidificar en colonias.

Höy (1980b). Tres Cruces, dpto. Humahuaca, Jujuy, 19-03-1976, nido con 2 huevos.
Narosky (1983b). Humahuaca, dpto. Humahuaca, Jujuy, 22-02-1973, nidificando.
De la Peña (2013c). Tres Cruces, 15-03-1976, nido con 4 huevos (Nido localizado por Gunnar Höy); Chorrillos, 23-02-1979, 1 huevo y nidos en construcción; Azul Pampa, 10-02-1983, varios nidos en construcción. Las tres localidades están en dpto. Humahuaca, Jujuy.
Medidas: Diámetro total: 14 cm. Diámetro interno: 5 cm. Profundidad: 2 cm. Alto: 6 cm.
Salvador (2015). Las Cuevas, dpto. Humahuaca, Jujuy, 28-02-1983, cuatro nidos, uno con 3 huevos y tres con 4 huevos cada uno. Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 19-02-1995, siete nidos, cuatro con 4 huevos y dos con 5 huevos. Tres Cruces, dpto. Humahuaca, Jujuy, 23-02-1995, nido con 3 huevos y otro con 5 huevos.

Huevos
Pone 3 a 5 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas
Höy (1980b): 21,8 x 15,8 y 23,8 x 16,0
De la Peña (2013c): 22,5 a 23,7 x 15,3 a 15,9 X= 22,7 x 15,7 (N= 5)
Salvador (2015): 19,8 a 22,6 x 14,7 a 16,7 X= 21,9 x 15,8 (N= 34)

Peso
Höy (1980b): cáscara 0,12
De la Peña (2013c): cáscaras 0,134 a 0,140 X= 0,137 (N= 5)
Salvador (2015): 2,4 a 3,2 X= 2,8 (N= 34)

Otros
Höy (1980b). Si hay cardones puede utilizar para construir su nido, nidos viejos de carpinteros.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: amarillo con alas y cola pardas oscuras. Hembra: amarilla con tono gris en el pecho y pardo en el dorso.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sicalis lutea (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837) entre los 3000 y los 3500 m de altura en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Perú, Bolivia, Chile y Argentina.



Chorillos. Jujuy.23-02-1979



Chorillos. Jujuy.23-02-1979

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Carma (2009)


Jujuy
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); De la Peña (1983b); Höy (1980b); Mogensen (1930); Narosky (1983); Olrog y Navas (1961); Salvador y Narosky (1984); Salvador y Di Giacomo (2014); Salvador (2015)

Observaciones: De la Peña (Azul Pampa, dpto. Humahuaca, 10-02-1983; Tres Cruces, dpto. Humahuaca, 10-02-1983)

La Rioja
Citas:Bodrati y Ferrari (2014)

Salta
Citas: Höy (1980b); Moschione et al. (2013); Narosky (1983)

Tucumán
Citas: Capllonch (2007a); Narosky (1983b)



JILGUERO DE CARA GRIS *Sicalis uropygialis* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Chirigüe. Chirigüe del Norte. Jilguero dorado. Jilguero cara gris. Jilguero del Norte. Misto dorado.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13,5 cm.
Peso: Rising (2011): 21-24,4 g

Coloración. Pico gris azulado. Patas rosadas. Iris pardo.
Macho. Cara gris. Cabeza y parte ventral amarillas. Dorsal gris pardusca. Supracaudales amarillas oliváceas. Alas pardas con fino ribete gris. Cola parda.
Hembra. Cabeza parda con tono amarillo, estriada de oscuro. Dorsal parda estriada de oscuro. Supracaudales amarillas. Ventralmente amarillenta. Alas pardas con ribetes blanquecinos. Cola parda.



COMPORTAMIENTO
Anda solitario, en pareja o en bandadas.
HÁBITAT
Estepas altoandinas, prepuna.

NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en Jujuy.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N										

El nido es una estructura semiesférica de pastos. Internamente lanas y cerdas. Lo ubica en huecos, en pircas, cercos.Oculto. Elaborado.



De la Peña (2013c). Abra Pampa, dpto. Cochinoca, Jujuy, 22-02-1979, nido en hueco en un cerco, a 0,30 m del suelo, 4 huevos.
Medidas: Diámetro total: 12 cm. Diámetro interno: 6 cm. Profundidad: 3 cm. Alto: 6 cm.
Medidas del hueco: diámetro de la boca: 10 cm. Profundidad: 40 cm. Cámara de 12 cm. de ancha y 9 cm. de alta.
Salvador (2015). Tres Cruces, dpto. Humahuaca, Jujuy, 23-02-1995, nido con 4 pichones.




Abra Pampa.Jujuy.22-02-1979

Huevos
Pone 4 huevos, ovoidales, blancos con pintas y manchitas castañas y grises distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas
De la Peña (2013c): 20 a 21,3 x 14,9 a 15,3 X= 20,4 x 15 (N= 4)

Peso
De la Peña (2013c): cáscaras 0,112 a 0,125 X= 0,119 (N= 4)

PICHONES
Salvador (2015). Comisuras blancas, interior de la boca rojo.


IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Amarillo con la cara y el dorso grises.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sicalis uropygialis uropygialis (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837) entre los 3000 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies.Los Andes de Perú, Bolivia, Chile y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sicalis uropygialis uropygialis (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)



Catamarca
Citas: Carma (2009); Navas (1964); Nores (1995); Straneck (1990f); Vides Almonacid (1986, 1999)
Jujuy
Citas:Brandán y Antelo (2001); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); De la Peña (1983a); Di Giacomo et al. (2007); Hellmayr (1932, 1938); Lillo (1905); Mazar Barnet et al. (1998c); Narosky e Yzurieta (1987); Salvador (2015)

Observaciones: De la Peña (Abra Pampa, dpto. Cochinoca, 02-02-1977; Lagunilla, dpto. Rinconada, 10-02-1983)

Salta
Citas: Nores (1995); Moschione et al. (2013); Vides Almonacid (1990)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2011b); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lillo (1905); Lucero (1983); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c)

JILGUERO DE CORONA GRIS *Sicalis luteocephala* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)



Otro nombre: Jilguero corona gris.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14 cm.
Coloración. Pico pardo. Patas rosadas. Iris pardo
Macho. Cabeza y parte ventral amarillas. Corona, rabadilla, lados del pecho y flancos grises. Dorsal gris pardusca. Alas y cola pardas.
Hembra. Cabeza parda con tono amarillo, estriada de oscuro. Dorsal parda estriada de oscuro. Ventralmente amarillenta. Alas pardas y cola pardas.

HÁBITAT
Áreas agrícolas, arbustivas, laderas de montañas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N										

En cuevas. Lecho de pajitas.
Uranga (in litt.). Xavi Chico, dpto. La Quiaca, Jujuy, 14-02-2012, varios nidos en cuevas, en barrancas de un río seco. Tacita de pajitas e internamente plásticos desmenusados. Dos nidos con 2 y 4 huevos. En el mismo lugar, 17-02-2013 y 20-02-2014 varios nidos.

Huevos
Pone 4 huevos blancos.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Amarillo con la corona y rabadilla grises.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sicalis luteocephala (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837) en Jujuy y Salta



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Andes de Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy
Citas: Abadie (1991); Blendinger (1998); Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Di Giacomo et al. (2007) ; Mazar Barnett et al. (1998a); Monteleone y Roesler (2005); Moschione et al. (2011); Pearman (1989)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)







Xavi Chico. Jujuy. 14-02-2012 Foto: Máximo Uranga

JILGUERO GRANDE *Sicalis auriventris* (Philippi y Landbeck, 1864)

Otros nombres : Canarito. Chirigue andino. Jilguero amarillo. Jilguero andino. Jilguero andino grande. Jilguero de corona anaranjada. Misto andino. Misto grande.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16,5 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 6 (?) X: 22,8 g (Rango 20,4 a 24,2); Navas (1964): N= 24 ♂ X: 27,2 g (Rango 24,2 a 31,6), N= 6 (H) X: 27,8 g (Rango 25,4 a 29,2); Navas y Bó (2000): N= 30 (M) X: 26,4 g (Rango 22 a 31,6), N= 8 (H) X: 27,1 g (Rango 22,2 a 29,2); Alderete y Capllonch (2012): N= 120 g
Coloración. Pico negruzco, mandíbula más pálida. Patas rosadas. Iris pardo.
Macho. Cabeza y parte ventral amarillas. Nuca con tono pardo. Dorso gris con tono oliváceo. Rabadilla y supracaudales amarillas oliváceas. Alas pardas con ribetes blanquecinos. Cubiertas alares grises. Cola parda oscura con las láminas externas amarillas.
Hembra. Más pálida. Dorso estriado. Ventralmente con tono grisáceo.



COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o en bandadas.

HÁBITAT
Estepas altoandinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en Mendoza.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Nidifica en huecos.

Reed (1913). Mendoza nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.

Huevos
Pone 3 huevos.

Medidas
Goodall et al. (1946): 23,3 x 16,1

Otros
Reed (1913). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza y parte ventral amarillas. Cubiertas alares grises. Cola negruzca con amarillo en las plumas externas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sicalis auriventris (Philippi y Landbeck, 1864) entre los 2000 y los 3500 mde altura en Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Carma (2009); Navas (1964)

Jujuy
Citas:Fiora (1934)

La Rioja
Citas: Nores (1995); Nores y Salvador (1985)

Mendoza
Citas: Barros (1930); Darrieu y Segura (2015); Fitzgerald (1899); Navas y Bó (2000); Navas (1964); Olivera et al. (2009); Pereyra (1951); Reed (1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (Uspallata, dpto. Las Heras, 11-01-1982; Puente del Inca, dpto. Las Heras, 11-01-1982)

Neuquén
Citas:Acerbo (2000); Chehebar et al. (1992); Funes en Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Hellmayr (1932, 1938); Matarasso (2007); Navas (1964); Olrog (1959, 1963); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005); Zotta (1941)

Observaciones: De la Peña (Lago Huechulafquen, dpto. Huiliches, 27-11-1998)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Casas (1992a); Gelain (2012b); Gelain y Tolosa (2011); Kovacset al. (2005); Navas (1964); Paz Barreto (1997b)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Valle Encantado, dpto. Chicoana, 06-12-1977)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (2000)

Santa Cruz
Citas: Imberti (2003, 2005e); Roesler et al. (2014)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2012)

JILGUERO OLIVÁCEO *Sicalis olivascens* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Catita. Jilguero del Norte. Misto oliváceo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13,5 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 6 X= 22,8 g (Rango 20,4 a 24,2); Salvador (1990a): N= 1 (M) 23,3 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 6 ? X: 22 g (Rango 21 a 23); Areta et al. (2012): N= 6 (?) X: 22,8 g (Rango 20,4 a 24,2); Alderete y Capllonch (2012): N= 6 X= 22,0 g (Rango 21 a 23); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (M) 23,5 g, N= 2 (H) 22,0 y 22,5 g
Coloración. Pico grisáceo. Patas rosadas. Iris pardo.
Macho. Dorso pardo oliváceo. Rabadilla, supracaudales y ventral amarillas oliváceas. Alas y cola pardas oscuras con las plumas ribeteadas de amarillo.
Hembra. Dorso pardo con tono oliváceo en la rabadilla. Ventralmente gris amarillenta. Alas y cola pardas oscuras.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o en bandadas. Canta posado en rocas.

HÁBITAT
Estepas y quebradas altoandinas y prepuna.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Tucumán.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N	N									



Semiesfera de pajitas, gramíneas e inflorescencias. Internamente crines y pelos.

Salvador y Narosky (1983). Coraya, dpto. Humahuaca, Jujuy, 27-02-1983, 3 nidos con 3 huevos cada uno y el 02-03-1983, uno con 4 huevos.
Salvador (2015). El Infiernillo, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 21-03-1987, nido en una barranca de tierra con 4 pichones pequeños. Coraya, dpto. Humahuaca, Jujuy, 21-02-1995, nidos con 3 y 4 huevos respectivamente.

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, celeste verdosos con pintas y manchitas pardas y castañas distribuidas por toda la superficie pero más concentradas en el polo mayor.



Medidas
Salvador y Narosky (1983): 19,9 a 21,8 x 15,5 a 16,8 X= 21,1 x 15,8 (N= 10)
Salvador (2015): 22,9 a 24,1 x 15,9 a 16,4 X= 23,2 x 16,2 (N= 7)

Pesos
Salvador y Narosky (1983): 2,4 a 2,8 X= 2,6 (N= 10)
Salvador (2015): 2,9 a 3,2 X= 3,1 (N= 7)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Oliváceo en la cabeza, dorsal y ventralmente.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sicalis olivascens olivascens (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837) entre los 2000 y los 3000 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan.
SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sicalis olivascens olivascens (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Chubb (1923); Nores (1995); Straneck (1990f)

Jujuy
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chapman (1919b); Chebez et al. (1998); Fiora (1934); Hartert y Venturi (1909); Hellmayr (1932, 1938); Lönnberg (1903); Salvadory Narosky (1983)

Observaciones: De la Peña (Humahuaca, dpto. Humahuaca, 02-02-1977; 22-02-1979)

La Rioja
Citas: Esteban (1953); Nores (1995)

Salta
Citas:Moschione et al. (2013); Nores (1995); Vides Almonacid (1990)
Observaciones: De la Peña (Valle Encantado, dpto. Chicoana, 06-12-1977)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Alderete y Capllonch (2012); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Lucero (1983); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c); Salvador (1990a, 2015); Salvador y Di Giacomo (2014)

JILGUERO DEL MONTE *Sicalis mendozae* (Sharpe, 1888)

DESCRIPCIÓN
Largo: 12, 2 cm.
Peso: Navas y Bó (2000): N= 2 (M) 18,2 y 19,8 g, N= 5 (H) X: 18,9 g (Rango 18,1 a 19,5); Alderete y Capllonch (2012): N= 12 (?) X: 17,7 g (Rango 16,5 a 19); Areta et al. (2012): N= 29 (?) X: 18,1 g (Rango 16,5 a 19,8)
Coloración. Pico grisáceo. Patas rosadas. Iris pardo.
El macho se diferencia del Jilguero oliváceo por tener colores más brillantes en el período de reproducción. No tener oliva en la garganta y pecho. No tener moteado o estriado la parte dorsal y además la rabadilla es más oliva.
La hembra es grisácea. Abdomen amarillento. Rabadilla olivácea.
Se parece a la hembra de *Sicalis lebruni*.
La vocalización es diferente entre ambas especies.

HÁBITAT
Quebradas enmonte desértico.


NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en San Juan.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											



El nido tiene forma de semiesfera o tacita de pajitas. Internamente pelos y lanas. Lo ubica en cuevas.Oculto. Elaborado.


De la Peña (2013c). Ruta 436. A 60 km. de Talacasto, dpto. Ullún, San Juan, 15-01-1982, nido en cueva en una barranca terrosa, a 5 m del suelo, sin posturas.
Medidas: Diámetro total: 10 cm. Diámetro interno: 8 cm. Profundidad: 1,5 cm. Alto: 6 cm.





Ruta 436. Talacasto. San Juan. 15-01-1982. Barranca con nidos

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA



Sicalis mendozae (Sharpe, 1888)en el oeste de Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y noroeste de San Luis. Posiblemente noroeste de Córdoba.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica.Endémico del Desierto del monte en el oeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Córdoba

Citas: Miatello (2009)

La Rioja

Citas: Camperi et al. (2008); Esteban (1953)

Mendoza

Citas: Areta et al. (2012b); Blendinger y Ojeda (2001); Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu y Segura (2015); Lucero (2013f); Olivera et al. (2009); Roig (1965); Sosa (1995d)

Neuquén

Citas:Chebez et al. (1993); Matarasso (2007)

Salta

Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan

Citas: Acosta y Murúa (2001); Alderete y Capllonch (2012); Camperi y Darrieu (2004); De la Peña (1983a.); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i); Lucero (Lucero 2013f, 2013i); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (2000); Ortiz y Murúa (1994)

San Luis

Citas: Gil et al. (1995); Nellar Romanella (1993)

JILGUERO AUSTRAL *Sicalis lebruni* (Oustalet, 1891)

Otros nombres: Canario. Jilguero ceniciento. Jilguero del Sur. Jilguero negro. Jilguero patagónico. Misto patagónico.



DESCRIPCIÓN

Largo: 15 cm.

Peso: Humphrey et al. (1970): N= 1 (M) 26,0 g, N= 3 (?) 22,0, 24,0 y 26,0 g; Areta et al. (2012): N= 4 (?) X: 25,3 g (Rango 23,1 a 26,6).

Coloración. Maxila oscura, mandíbula gris azulina. Patas grises. Iris pardo.

Macho. Frente amarilla. Dorso gris manchado de amarillo. Rabadilla y supracaudales amarillas. Ventralmente amarillo con tono grisáceo. Flancos grisáceos. Alas pardas ribeteadas de gris. Cubiertas alares amarillas. Cola parda ribeteada de blanquecino.

Hembra. Grisácea. Abdomen amarillento. Subcaudales blanquecinas. Alas y cola como el macho.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o en bandadas. Canto trinado. Se posa en arbustos, rocas.



Alimentación
Haene et al. (2007). **Vegetales:**Fruto*Berberis buxifolia.*
Reynolds en Humphrey et al. (1970).**Vegetales:**Semillas.

HÁBITAT
Estepas patagónicas, pastizales.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Chubut.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

Nidifica en huecos en barrancas. El nido tiene forma de taza, emplea pajas. Oculto. Elaborado.
De la Peña (2013c). Península Valdés, dpto. Biedma, Chubut, 02-01-2003, nido en una cueva en barranca terrosa, a 1,40 m del suelo, 4 huevos. (Nido localizado por Máximo Uranga).
Medidas: Diámetro total: 16 cm. Diámetro interno: 6 cm. Profundidad: 3,5 cm. Alto: 7 cm.

Huevos
Pone 4 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas
De la Peña (2013c): 22 x 23,2 x 16,1 a 16,2 X= 22,4 x 16,1 (N= 4)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Frente amarilla. Dorso manchado de amarillo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sicalis lebruni (Oustalet, 1891) desde Río Negro y Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Endémico del sur de Argentina y Chile.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (1992); Cozzani et al. (2008); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Narosky et al. (1984)

Chubut
Citas: Darrieu y Camperi 2000 (2001); De la Peña (2005); Sainz-Trápaga (2014); Vuilleumier (1993)

Observaciones: De la Peña (Esquel, dpto. Futaleufú, 04-02-1976; Punta Norte, dpto. Biedma, 27-11-2000)

La Pampa
Citas: Chebez et al. (1998)

Neuquén
Citas:Contreras (1976, 1977b); Daciuk (1978); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)



Península Valdés. Chubut. 02-01-2003

Río Negro
Citas: Casas (1992a); Contreras et al. (1980b); Gelain (2012b); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubullis (1985); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Wetmore (1926b)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1998); De Lucca y Saggese (1992); Di Giacomo et al. (2005); Hellmayr (1938); Imberti (2005e); Oustalet (1891); Stone (1928); Straneck (1990a); Wetmore (1926b)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1984, 1984); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Olrog (1948)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

JILGUERO DORADO *Sicalis flaveola* (Linnaeus, 1766)

Otros nombres: Afrechero. Amarillito. Botoncito de oro. Botón de oro. Canario. Canarito del mortero. Chamuchina. Chijí. Chiú. Doradito. Jilguerito. Jilguero. Jilguero amarillo. Jilguero blanco (a la hembra). Jilguero común. Jilguero criollo. Jilguero grande. Misto amarillo. Pajarillito. Silguero.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 6 X= 15,8 g (Rango 15,0 a 16,80); Salvador (1988): N= 1 (H) 14,0 g, N= 2 (M) 13,5 y 15,0 g; Darrieu y Camperi (1996): N= 1 (H) 16,3 g; Di Giacomo (2005h): N= 5 (M) X= 14,9 g (Rango 14,5 a 15,2), N= 2 (H) X= 17,1 g (Rango 16,4 a 17,8); Salvador (2014a): N= 6 (M) X= 15,8 g (Rango 15,3 a 16,7), N= 8 (H) X= 15,52 g (Rango 14,7 a 16,8); Alderete y Capllonch (2012): N= 1 X= 16 g (*konigi*), Alderete y Capllonch

(2012): N= 20 X= 13,6 g (Rango 10 a 17) (*pelzelni*); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (M) 15,7 g, N= 7 (H) X= 16,4 g (Rango 14,5 a 17,6), N= 22 (M) X= 16,6 g (Rango 15,8 a 18,0), N= 16 (H) X= 17,3 g (Rango 14,7 a 20,5), N= 8 (M) X= 14,9 g (Rango 13,6 a 16,0), N= 3 (H) X= 14,8 g (Rango 13,9 a 15,5), N= 4 juvenil X= 13,8 g (12,5 a 14,5)

Coloración. Pico córneo grisáceo. Patas grisáceas o negruzcas. Iris pardo.

Macho. Frente y ventral amarillas. Dorso amarillo verdoso estriado de pardo oscuro. Alas y cola pardas oscuras con las plumas ribeteadas de amarillo verdoso.

Hembra. Dorsal gris estriada de pardo oscuro. Ventralmente blanquecino estriado de pardo oscuro. Alas pardas oscuras con ribetes ocráceos en las secundarias y en las cubiertas y de amarillento en las barbas externas de las primarias. Cola parda oscura ribeteada de ocráceo.

COMPORTAMIENTO

Anda solitario, en pareja o en bandadas. Muy cantor.

De la Peña (2006d). Recolecta alimentos en el suelo, en el estrato herbáceo y en ramas y follaje, hasta los 5 m.

Alimentación

De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Semilla Brachiaria (*Urochloa plantaginea*)

Aravena (1928) Semillas Coleópteros (Curculiónidos) (Crisomélidos) (*Diabrotica speciosa*) Piedritas Tucura

Zotta (1936). **Vegetales:**Semillas. Vegetales.**Otros:** Arena. Minerales.

Zotta (1940). **Insectos:** Coleópteros (Crisomélidos).

Haro (1998). **Insectos:** Coleoptera.

De la Peña y Pensiero (2003). **Vegetales:**Semilla *Cenchrus myosuroides, Chloris virgata, Eleusine tristachya*, *Setaria parviflora.* Fruto*Holmbergia tweedii, Morus alba, Phorodendron liga.*

Di Giacomo (2005h). **Vegetales:**Semilla *Aloysia gratissima, Paspalum intermedium, Digitaria ciliaris,*

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:**Semilla *Amaranthus* sp*., Brassica* sp*.,* Chenopodium sp. Gramíneas *Panicum mileaceum*. **Insectos:** Coleoptera. Diptera (Muscidae).

De la Peña (2011a). **Vegetales:**Pimpollo *Aloysia gratissima*. Hoja *Geoffroea decorticans*. Fruto *Celtis ehrenbergia*, *Holmbergia tweedii*,*Melica macra, Phorodendron liga.* Semilla *Amaranthus quitensis*, *Cenchrus myosuroides, Conyza bonariensis, Cortaderia selloana, Chloris barbata, Chloris virgata, Echinochloa crusgalli*,*Eleusine tristachya*,*Melica macra, Paspalum* sp*., Setaria lachnea, Setaria parviflora, Sorghum halepense.*

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.



Voces

Straneck (*in litt*.). El canto es una sucesión de trinos agudos: Chirip chilip . tilip.

HÁBITAT

Praderas arboladas, áreas rurales, sabanas, montes, parques.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Mendoza, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



El nido tiene forma de tacita o semiesfera, de pajitas e internamente cerdas o pelos. Lo ubica en el interior de nidos abandonados, en huecos, recipientes o cajas nidos. Oculto. Elaborado.

Dinelli (1924). Tucumán, nidos en diciembre a enero, en huecos y nidos abandonados de Hornero y Carpintero de los cardones.
Smyth (1928). Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Friedmann (1929). Tucumánnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pereyra (1938b). Noreste de la provincia de Buenos Aires, nidifica.
Höy y Ottow (1964). Saltanido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Friemann et al. (1977). Buenos Airesnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Contreras (1980o). Gustavo Andrés, dpto. Lavalle, Mendoza, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Masramón (1980). Nidifica en San Luis.
Mason (1986). Buenos Airesnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando.
Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 4 nidos.
Nores y Nores (1994). Córdoba, nido en nido de Cacholote castaño (*Pseudoseisura lophotes*)
Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nidifica.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 2 nidos.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre noviembre y enero.
Salvador y Bodrati (2011). San Pedro, dpto. San Pedro, Misiones, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador (2012c).Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, entre 1979 y 2005se localizaron 99 nidos en nidos abandonados de otras aves.
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Nacional Chaco, Chaco, Bodrati en setiembre de 2000, localizó uns nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Bodrati (2014a). Characato, dpto. Punilla, Córdoba, J. Heredia, en enero de 2004, localizó dos nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 243, desde el 15-11-1970 al 16-11-12, 5 en provincia de Córdoba, el resto en Santa Fe. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Medidas: Diámetro total: de 9 a 10 cm. Diámetro interno: de 5 a 7 cm. Profundidad: de 2,5 a 3 cm. Alto: de 4 a 5 cm.
Altura: Nido más bajo: 1,20 m. Nido más alto: 8,00 m.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, 2 nidos con 4 y 1 huevos cada uno.
Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 1 nido.

Huevos
Pone 5 huevos, ovoidales, verde pálido o crema con pintas castañas y grises distribuidas por toda la superficie.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 17,5 a 21,0 x 12,0 a 14,5
Dinelli (1924): 20,0 x 14,0 , 17,5 x 14,0 y 20,0 x 13,0
Smyth (1928): 18,0 a 22,5 x 12,5 a 15,0
Pereyra (1938b): 18,0 a 20,0 x 13,0 a 16,0
Di Giacomo (2005h): X= 19,4 x 14,0 (N= 4)
De la Peña (2013c): 17,8 x 21,4 x 13,3 a 16 X= 19,2 x 14,2 (N= 38)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 1,4 a 2,0 X= 1,8 (N= 4)
De la Peña (2013c): 1,6 a 2,6 X= 2,0 (N= 18)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,097 a 0,112 X= 0,110 (N= 16)

PICHONES

Descripción.

De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel naranja. Cavidad bucal rojiza. Comisura blanca. Casi implumes. Escaso plumón fino en la cabeza, dorso y parte dorsal de las alas.

2 días

Ojos cerrados. Comisura y pico blanco-amarillento.

5 días

Ojos abiertos, marrones. Escaso plumón.

6 días

Vivaracho. Vainas en zonas pteridas.

8 días

Abriendo las láminas de las plumas primarias. Plumas ventrales y de los muslos, blanquecinas.

9 días

Emplumado. Abriendo las láminas en las vainas de las zonas ptéridas.

10 días

Primarias pardas. Secundarias pardas orilladas de ocráceo. Ventralmente blanquecino con estrías pardas.

11 días

Extremo de los cañones de las plumas alares y de la cola, pardos oscuros, orilladas de ocráceo. Ventralmente blanquecino. Flancos con tono ocráceo.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,3	0,8	1,2						2,6-2,8
2	0,3-04	1,0	1,3						3,5-4,4
3	0,4-0,5	1,2	1,4						4,3-5,5
4	0,5	1,4	1,7	0,2		0,2			5,2-6,7
5	0,5	1,6	2,2	0,7		0,6			6,0-9,0
6	0,5	1,8	2,5	1,2		0,9		0,5-0,6	8,2-11,7
7	0,5	1,9	2,6	1,3		1,2		0,8	10,5-12,3
8	0,5	2,0	2,6	1,4	0,4	1,4	0,4	1,0	12,7-13,2
9	0,7	2,1	2,7	1,7	0,5	1,6	0,5	0,7	14,0
10	0,7	2,1	2,7	2,0	1,0	1,6	0,7	2,0	14,5

Generalidades

Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 13 días. La pareja alimenta a los pichones y permanecen en el nido entre 11 y 16 días.

De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 11 a 13 días. Período de incubación 13-14 días. Los huevos son puestos en días corridos. Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido 13-14 días.

Otros

Mason (1985). Turienzo y Di Iorio (2010). Antoniazzi et al. (2011). Silvestrini et al. (2011). Salvador en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

Smyth (1928). Friedmann (1929). Höy y Ottow (1964). Friemann et al. (1977). Contreras (1980o). Mason (1986). Salvador y Bodrati (2011). De la Peña (2013c). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*
De la Peña (2003a). En la Reserva de la Escuela Granja de Esperanza se realizó un estudio de la nidificación simultánea y dio como resultado en el año 1998, 0.95 nidos por hectárea y en el año 2002, 0,89 nidos.
Un nido tenía además un huevo de *Troglodytes aedon.*

Depredación
Di Giacomo (2000) adulto por *Falco rufigularis.* De la Peña (2013c). En un nido salía una Culebra verde (*Philodryas patagoniensis*) de comer a los pichones.*Tyto alba* (Morici 1990a, 1990b))

Más información:
Mason (1985). De la Peña (2013c)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: frente y parte ventral amarillas. Dorso estriado de pardo oscuro. Hembra: dorso gris. Ventralmente blanquecina, estriada de pardo.



Esperanza.Santa Fe.09-12-2004
Parasitado por *Molothrus bonariensis*



Esperanza.Santa Fe.18-12-2004



Esperanza.Santa Fe.19-11-2007



Esperanza.Santa Fe.21-12-2004



Esperanza.Santa Fe.26-07-2008



Esperanza. 30-12-2015. Nido en construcción



Esperanza. 28-12-2015. Cortejo



Esperanza.Santa Fe. 05-01-1997. Ubicación de un nido

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Sicalis flaveola pelzelni P. L. Sclater, 1872 desde el norte del país hasta Neuquén y Chubut, *Sicalis flaveola königi* Höy, 1978 en el oeste de Salta y Tucumán y *Sicalis flaveola brasiliensis* (Gmelin, JF, 1789) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cinco subespecies. Existen 3 poblaciones separadas que ocupan Sud América a excepción de Andes y Amazonia: una en el norte de Colombia y Venezuela, otra en Bolivia, Paraguay, noreste de Brasil y centro y norte de Argentina, con una tercera en Ecuador y Perú.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sicalis flaveola pelzelni Sclater, 1872

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Codesido et al. (2011); Dabbene (1919b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987a); Leveau y Leveau (2011b); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Morici (2014); Mason (1985); Montaldo

y Claver (1986); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Salvador y Di Giacomo (2014); Soave et al. (1999b); Straneck (1990b); Turienzo y Di Giorio (2010); White (1882); Zapata (1998); Zuberbhüler (1971)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 08-02-1976)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Vides Almonacid (1999)

Observaciones: De la Peña (Santa María, dpto. Santa María, 08-02-1977)

Chaco
Citas:Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2005); Salvador y Bodrati (2014a); Silvestri (2011)

Observaciones: De la Peña (Basail, dpto. San Fernando, 26-08-1987)

Chubut
Citas: Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Castellanos (1934); Chikilian et al. (1993-1994); Dardanelli et al. (2006b); Dardanelli y Nores (2001); De la Peña (2013c); Haro (1998); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador(1983, 1988, 2012c); Salvador y Bodrati (2013a); Salvador y Bodrati (2014a); Sferco y Nores (2003); Turienzo y Di Giorio (2010); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (La Puerta, dpto. Río Primero, 08-08-2003; Jesús María, dpto. Colón, 23-03-2007; Ascochinga, dpto. Colón, 19-01-2010)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b, 1990b); Darrieu y Camperi (1996); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918); Wilson (1977)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001, 2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975)

Formosa
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Fiora (1934); Lucero (1982); Moschione y Segovia (2005); Olrog (1971)

Observaciones: De la Peña (San Salvador de Jujuy, dpto. Capital, 11-02-1983)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler (1984); Tejerina et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Realicó, dpto. Realicó, 19-11-1998)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1982, 1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Salvador y Di Giacomo (2014)

Mendoza
Citas: Calí et al. (2008); Contreras (1979g, 1980o); Contreras y Fernández (1980); Darrieu y Segura (2015); Gómez (2006); López de Casenave (2001); López de Casenave y Marone (1996); Lucero (2013f); Marone (1991, 1992a); Olivera et al. (2009); Sosa (1995d)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2008); Martínez Gamba (2014); Pereyra (1927e)

Neuquén
Citas:Acerbo (2000); Babarskas et al. (1996); Dupuy (2005); Funes y Sheridan en Fiori y Zalba (1999); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Kovacset al. (2005); Llanos et al. (2005, 2011); Paz Barreto (1997b); Pérezy Petracci (1998)

Observaciones: De la Peña (General Roca, dpto. Gral. Roca, 28-11-1998)

Salta
Citas: Alabarce y Lucero (1977); Alderete y Capllonch (2012); Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (Salta, dpto. La Capital, 30-01-1977)

San Juan
Citas: Gelain (2008a, 2014a); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz y Murúa (1994)

San Luis
Citas: Casares (1944); Masramón (1979, 1983); Nellar Romanella (1993)
Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Santa Fe
Citas: Antoniazzi et al. (2011); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (1983f, 2002a, 2011a, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Quiroga et al. (2003); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson (1926)



Villa Roda. 17-11-2015. Macho



Villa Roda. 25-09-2015. Hembra

Santiago del Estero
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Codesido y Bilenca (2000); Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Bandera, dpto. Belgrano, 30-07-1987)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Dinelli (1924); Echevarría et al. (2008c, 2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Malizia et al. (1998); Ortiz et al. (2011b, 2013c); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014)
Observaciones: De la Peña (San Miguel de Tucumán, dpto. Capital, 30-01-1977)

Sicalis flaveola königi Höy, 1978

Salta
Citas: Höy (1978); Moschione et al. (2013)

Tucumán
Citas : Alderete y Capllonch (2012)

Sicalis flaveola brasiliensis (Gmelin, JF, 1789)

Misiones
Citas: Salvador y Bodrati (2011)

MISTO *Sicalis luteola* (Sparman, 1789)

Otros nombres: Chijí. Chipiú. Chipís. Chipiú. Chirique. Chirigüé. Chollonco. Jilguero campestre. Jilguero chico. Jilguero del campo. Mistito. Misto cimarrón. Misto chico. Misto de campo. Misto de cardo. Quellunche. Tipu.

DESCRIPCIÓN
Largo: 11 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 8 X= 15,3 g (Rango 15,0 a 16,50); Humphrey et al. (1970): N= 1 (M) 16,3 g; Contreras (1975): N= 11 (?) X= 15,9 g (Rango 14,6 a 17,90); Salvador y Salvador (1986): N= 8 X= 15,8 g (Rango 14,5 a 16,6), N= 7 (H) X= 16,2 g (Rango 14,5 a 17,5); Camperi (1992c): N= 2 (M) 14,5, 17,0 g; N= 3 (H) 10,0, 11,0 y

11,0 g; Christie et al. (2004): N= 1 (H) 16,0 g, N= 1 (?) 15,0 g; Camperi y Darrieu (2005): N= 3 (M) 15,0, 15,2 y 16,5 g, N= 1 (H) 15,0 g; Salvador (2014a): N= 21 (M) X= 16,2 g (Rango 14,5 a 17,7), N= 12 (H) X= 16,2 g (Rango 14,5 a 17,5); Alderete y Capllonch (2012): N= 3 X= 15,6 g (Rango 15 a 16); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 9 (H) X= 15,2 g (Rango 14,0 a 16,2), N= 25 (H) X= 15,2 g (Rango 13,5 a 17,0), N= 1 (H) 13,6 g



Coloración. Pico gris-rosado. Patas rosadas. Iris pardo.
Macho. Dorso verdoso estriado de pardo oscuro. Rabadilla olivácea. Lorum, anillos oculares y parte ventral amarillos. Alas y cola pardas con las plumas ribeteadas de oliváceo.
Hembra. Garganta, pecho y flancos pardos grisáceos. Dorso verdoso estriado de pardo. Ventral amarilla.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o en bandadas. En época de reproducción el macho vuela y se deja caer trinando y con las alas y cola entreabiertas.
De la Peña (2006d). Recolecta alimentos en el suelo, en el estrato herbáceo y en ramas y follaje, hasta los 1,50 m.

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Semillas de Pasto borla (*Chloris elata*), Urocloa (*Urochloa panicoides*)
Marelli (1919). **Vegetales:** Semillas. **Insectos.**
Aravena (1928). **Vegetales:** Semillas. **Insectos**. **Otros:** Piedritas.
Reynols en Humphrey et al. (1970). **Vegetales:** Semillas.
Martínez et al. (1975). **Vegetales:** Bromus sp., *Erodium* sp. **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae).
Salvador y Salvador (1986). **Vegetales:** *Chenopodium* sp*., Chenopodium* sp*., Sorghum halepense*, *Setaria* sp.
Comparatore et al. (1996). **Vegetales:** Semilla *Paspalum quadrifarium.*
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semilla *Amaranthu*s sp., *Brassica* sp*., Carduus* sp*., Chenopodium* sp., *Cynodon* sp. Gramíneas *Panicum mileaceum, Chenopodium* sp*., Sorghum halepense*, *Stipa* sp. **Otros:** Arena.
De la Peña (2011a). **Vegetales:** Semilla *Cynodon dactylon, Chloris barbata***,** *Panicum bergii, Paspalum dilatatum,*
Paspalum urvillei, Setaria fiebrigii, Setaria parviflora, Sorghum halepense.
Bodrati y Salvador (2015a). Termites.

Voces
Straneck (*in litt*.). La voz de contacto es un chip.chip. ...chip . chipí, emitido generalmente en vuelo. El canto es una serie de agudos Chipirpchiriptirip y finaliza con un zumbado Tyyyyyy.tyyyyy.tyyyhh.

HÁBITAT
Áreas rurales, praderas, sabanas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N



Ubica el nido en el suelo o en matas de pastos. Es una semiesfera de pajitas. Internamente cerdas o pelos.
Oculto. Elaborado

Smyth (1928). Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pereyra (1938b). Noreste de la provincia de Buenos Aires, nidifica.
Zuberbühler (1956b). Estancia La Brava, Junín, pdto. Junín, Buenos Aires, 25-11-1951, nido con 3 pichones.
Friedmann et al. (1977). Buenos Airesnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Zapata y Cabrera (1969). Chasicó, pdo. Villarino, Buenos Aires, 09-12-1967, un huevo.
Salvador (1983b). Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 1979 a 1983, el 25,0 % (4 de 16) de los nidos estaban parasitados por *Molothrus bonariensis*.
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre octubre y diciembre.
Masramón (1980). Nidifica en San Luis.
Fraga (1983c). Estancia La Candelaria, pdo. Lobos, Buenos Aires. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Salvador (1984). Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 5 nidos: 15-12-1979, 4 huevos propios y 1 de *Molothrus bonariensis*; 10-11-1980, 2 huevos y 2 pichones propios y 1 pichón de *Molothrus bonariensis*; 05-12-1980, 3 huevos propios y 2 de *Molothrus bonariensis*; 16-12-1980, 4 huevos propios y 4 de *Molothrus bonariensis*; 03-01-1981, 4 huevos propios y 1 de *Molothrus bonariensis*
Salvador y Salvador (1986). Villa María, dpto. Gral. San Martín, Córdoba, 32 nidos, entre octubre y enero, construidos en matas de pajas o gramíneas; postura de 3 a 6 huevos (X: 4,7). Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando.nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Salvador y Salvador (1988). Pampa de Achala, Córdoba, 24-01-1988, nido con 4 huevos.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nido en noviembre de 2000.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 5 nidos entre octubre y noviembre.
Christie et al. (2004). Nidos en enero.
Cozzani y Zalba (2009). Buenos Airesnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, Córdoba, se localizaron 8 nidos, entre noviembre y enero.
Codesido et al. (2013). Rincón de Ajó, pdo. Gral. Lavalle, Buenos Aires, nido con 3 huevos.
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 16, desde el 25-10-1970 al 04-11-2003, uno en Río Negro, los restantes en Santa Fe. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Medidas: Diámetro total: de 8 a 10 cm. Diámetro interno: de 5 a 6 cm. Profundidad: de 3 a 5 cm. Alto: de 5 a 7 cm.
Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 3 nidos. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*

Huevos
Pone 4 ó 5 huevos, ovoidales, blancos con tono celeste con pintas pardas y grises, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 15,5 a 19,0 x 12,5 a 14,0
Smyth (1928): 16,5 a 20,0 x 12,5 a 14,0
Pereyra (1938b): 18,0 a 19,0 x 13,0
Zapata y Cabrera (1969): 17,5 x 13,6
Salvador y Salvador (1986): 16,2 a 19,4 x 11,9 a 14,7 X= 17,6 x 13,4 (N= 71)
Salvador y Salvador (2012):16,8 a 19,1 x 12,3 a 14,1 X= 17,1 x 12,9 (N= 16)

De la Peña (2013c): 16,9 x 19,5 x 12,8 a 15 X= 17,7 x 13,6 (N= 20)

Peso
Pereyra (1938b) 18,0 a 19,0 x 13,0
Zapata y Cabrera (1969): 2 (N=1)
Salvador y Salvador (1986): 1,4 a 1,9 X= 1,65 (N= 42)
Salvador y Salvador (2012):1,8 a 2,1 X= 2, 0 (N= 12)
De la Peña (2013c): 1,2 a 1,5 X= 1,3 (N= 5)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,082 a 0,130 X= 0,102 (N= 15)

Observaciones

PICHONES
Descripción
Salvador y Salvador (2012). Los pichones nacen con los ojos cerrados. Piel color carne naranja, con plumón dorsal ralo de color gris claro. Pico pardo con tomio y bordes internos amarillos, comisuras blancas, interior de la boca rojo.

De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Cavidad bucal y paladar, rojos. Comusura blanca. Maxilar oscuro.
Mandíbula amarilla. Plumón fino, ralo, gris claro o blanquecino, en cabeza, dorsal y alas.
3 días
Ojos semiabiertos. Aparecen vainas grises en las alas.
4 días
Abren los ojos. Aparecen las vainas del dorso, alas y cola.
6 días
Aparecen las vainas en la parte ventral. Abriendo las láminas de las plumas dorsales, alas y cola.
8 días
Las plumas de la cabeza y parte dorsal negruzcas orilladas de ocráceo. Costados del pecho y flancos crema amarillentos.
10 días
Ventralmente leve estriado. Dejan el nido.

Peso al nacer
Salvador y Salvador (1986). X= 1,35 (N= 8)

Generalidades
Salvador y Salvador (1986). Los huevos son puestos en días continuos. La hembra incuba. Período de incubación de 11 días. Los pichones permanecen en el nido 10-11 días.
Salvador y Salvador (2012). La incubación estuvo a cargo de la hembra y la alimentación de los pichones por la pareja.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 6 a 8 días. Pone los huevos en días corridos. Período de incubación 11 días. Permanencia de los pichones en el nido de 10 a 11 días.

Otros
Pereyra (1937c)**.**Un ejemplar con Albinismo parcial.
Smyth (1928). Friedmann et al. (1977). Salvador (1983b). Fraga (1983c).Salvador y Salvador (1984). Darrieu et al. (1988).Cozzani y Zalba (2009). De la Peña (2013c). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.
Piantanida (2015b). Un ejemplar con aberración cromática.

Más información: Salvador (1983b).Salvador y Salvador (1986).De la Peña (2013c)



Esperanza.Santa Fe.30-11-1977
Parasitado por *Molothrus bonariensis*



Esperanza.Santa Fe.30-04-2005



Esperanza.Santa Fe. 30-11-1977



Esperanza. 06-10-2015



Esperanza. Santa Fe. 06-11-2002

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorso oliváceo estriado de pardo. Ventralmente amarillo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sicalis luteola luteiventris (Meyen, 1834)desde el norte del país hasta Santa Cruz.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Ocho subespecies. Extenso rango de distribución desde Mejico hasta el sur de Argentina con varias poblaciones separadas. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Antigua y Barbuda, Barbados, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sicalis luteolaluteiventris (Meyen, 1834)

Buenos Aires
Citas: Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Codesido et al. (2011, 2013); Dabbene (1919b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Hartert y Venturi (1909); Isacch y Martínez (2001); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987a); Leveau y Leveau (2004b, 2011b); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012, 2014); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Salvador y Di Giacomo (2014); Soave et al. (1999b); White (1883a); Zapata (1998); Zapata y Cabrera (1969); Zuberbhüler (1971)


Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 08-02-1976)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 12-03-1981; El Alamito, dpto. Andalgalá, 16-12-1999)

Chaco
Observaciones: De la Peña (Basail, dpto. San Fernando, 26-08-1987)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Sainz-Trápaga (2014); Vidoz (1995); Vuilleumier (1993)



Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Castellanos (1934); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983); Salvadory Salvador (1988, 2012); Sferco y Nores (2003); Straneck (1990b); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Villa María, dpto. Gral. San Martín, 13-10-2004; Ascochinga, dpto. Colón, 24-03-2006; Jesús María, dpto. Colón, 24-03-2006)

Corrientes

Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979; Paso de los Libres, dpto. Paso de los Libres, 11-12-2002)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); López-Lanús et al. (2013c); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001, 2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomoy Krapovickas (2005); Laubmann (1930); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Fiora (1934)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Güller (2008); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler (1984, 2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Blendinger y Ojeda (2001); Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu y Segura (2015); Gómez (2006); Lucero (2013f); Marone (1992); Martínez et al. (1997a); Olivera et al. (2009); Sanzín (1918); Wetmore (1926b)

Misiones
Citas: Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a)

Neuquén
Citas:Acerbo (2000); Contreras (1975, 1977b); Chehebar et al. (1992); Daciuk (1968, 1978); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas:Camperi (1998); Camperi y Darrieu (2005); Chehebar y Ramilo (1992); De la Peña (2005); Gelain (2001, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2005, 2011); Pérezy Petracci (1998);

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Lucero (2013f, 2013i); Moschione y Banchs (1992); Ortiz y Murúa (1994)

San Luis
Citas: Casares (1944); Masramón (1979, 1983); Nellar Romanella (1993)

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Santa Cruz
Citas: Di Giacomo et al. (2005); Imberti (2003, 2005); Roesler et al. (2014)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (1983a, 2011a, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Rodríguez Graves et al. (2009); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas:Moschione y Bishels (2005); Nores et al. (1991)
Observaciones: De la Peña (Selva, dpto. Rivadavia, 29-01-1977)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Humphrey y Bridge (1970)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán (2006); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Echevarría et al. (2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Marigliano et al. (2010); Ortiz et al. (2011b, 2013c); Ortiz y Aráoz (2014)

COLUDO GRANDE *Emberizoides herbicola* (Vieillot, 1817)

Otros nombres: Cachilo coludo grande. Cola aguda encuentro amarillo. Juan cola. Pajero. Pajero cola aguda.



DESCRIPCIÓN
Largo: 20 cm.
Peso: Darrieu y Camperi (1996): N= 9 (M) X: 30,1 g (Rango 26,2 a 36,6), N= 5 (H) X: 27,7 g (Rango 25,8 a 29,4); Di Giacomo (2005h): N= 10 X= 28,5 g (Rango 22,5 a 33,0); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 24 X= 29,4 g (Rango 25,0 a 33,8), N= 4 juvenil X= 27,8 g (Rango 25,5 a 32,2)
Coloración. Pico amarillo intenso con culmen negro. Patas rosadas. Iris pardo.
Dorsal ocrácea estriada de pardo oscuro. Rabadilla ocrácea. Lorum, regiones perioculares y garganta blanquecinos. Ventral ocrácea. Alas pardas con las primarias ribeteadas de amarillo, las secundarias de ocre. Cubiertas alares amarillas. Cola, raquis oscuro, láminas pardas ocráceas.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en pareja. Se oculta en los pajonales. Vuela corto y se "zambulle". En vuelo la cola "flamea".

Alimentación
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Pajonales.

NIDIFICACIÓN

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N								N	N

Se localizaron nidos en Formosa, Chaco.



Semiesfera de pajas. Lo ubica entre los pastos.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre noviembre y marzo. Se estudiaron 20 nidos.
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Nacional Chaco, Chaco, Bodrati localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*

Huevos
Pone 3 huevos blancos con manchas rojizas, violáceas y negras, más concentradas hacia el polo mayor.
Medidas
Hartert y Venturi (1909): 23,5 a 25,6 x 18,0 a 19,3 X= 24,5 x 18,6 (N= 9)
Di Giacomo (2005h): 19,3 a 23,9 x 14,9 a 18,0 X= 22,6 x 16,8 (N= 39)

Peso
Di Giacomo (2005h): 2,1 a 3,9 X= 3,2 (N= 38)

Generalidades
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. La pareja alimenta a los pichones y permanecen en el nido entre 10 y 13 días.

Otros
Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

Depredación
Di Giacomo (2005h). De adulto (*Falco femoralis*), de juveliles (*Buteo albicaudatus*)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal estriada de oscuro. Cubiertas alares amarillas. Ventral ocrácea. Cola larga, escalonada.
Difícil de diferenciar del Coludo chico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Emberizoides herbicola herbicola (Vieillot, 1817)en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Córdoba y norte de Santa Fe.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinco subespecies. Presenta 2 poblaciones claramente separadas, una se extiende desde Costa Rica al norte deSudamérica y comprende: Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y las Guayanas.
Una segunda población se extiende por Perú, Bolivia, este de Paraguay, Centro y sudeste de Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Emberizoides herbicola herbicola (Vieillot, 1817)

Chaco
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Salvador y Bodrati (2014a)

Córdoba
Citas: Miatello et al. (2003)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1996); Esteban (1953); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008); Straneck (1990e)

Observaciones: De la Peña (Empedrado, dpto. Empedrado, 23-11-1993)

Entre Ríos
Citas: Abadie (1988); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); Marateo et al. (2009)

Formosa
Citas:Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Grant (1911c); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014)

Misiones
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Krauczuk (2005, 2008); Pereyra (1951)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Hartert y Venturi (1909); Manassero et al. (2004); Pautasso (2002a)

COLUDO CHICO *Emberizoides ypiranganus* H. Ihering& R. Ihering, 1907

Otros nombres: Cachilo coludo chico. Pajero.



DESCRIPCIÓN
Largo: 18 cm.
Peso: Di Giacomo (2005h): N= 2 X= 22,8 g (Rango 19,6 a 26,1); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 23 X= 20,9 g (Rango 19,0 a 24,5)
Coloración. Pico amarillo o amarillo anaranjado con culmen negro. Patas rosadas. Iris pardo.
Dorsal ocrácea muy estriada de negruzco. Rabadilla canela. Cara gris. Cejas y garganta blanquecinas. Pecho gris con tono ocre. Abdomen blanquecino. Subcaudales canelas. Alas pardas ribeteadas de amarillo. Cubiertas alares amarillas. Cola, raquis pardo oscuro, resto gris.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en pareja. Se oculta en los pajonales. Vuela corto y se "zambulle". En vuelo la cola "flamea".

HÁBITAT
Pajonales, juncales.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Formosa.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N


Semiesfera de fibras vegetales.

Di Giacomo (1998a). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, 13-12-1995, nido con3 huevos.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre octubre y marzo. Se estudiaron 40 nidos.

Huevos
Pone 3 huevos, blancos con manchas y pintas rojizas y negras, más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Di Giacomo (1998a): 20.6 a 20,9 x 15,6 a 16,0 X= 20,7 x 15,9 (N= 3)
Di Giacomo (2005h): 19,6 a 22,9 x 15,2 a 16,8 X= 21,2 x 15,9 (N= 68)

Pesos
Di Giacomo (1998a): 2,7
Di Giacomo (2005h): 2,2 a 3,0 X= 2,6 (N= 68)



Generalidades
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. La pareja alimenta a los pichones y permanecen en el nido entre 9 y 11 días.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal ocrácea muy estriada de oscuro. Cara gris. Cejas claras. Cubiertas amarillas. Cola larga, escalonada.
Difícil de diferenciar del Coludo grande.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Emberizoides ypiranganus H. Ihering& R. Ihering, 1907 en Misiones, Corrientes, Chaco, este de Formosa, norte de Santa Fe y noreste de Entre Ríos.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica.Sureste de Brasil, este de Paraguay, norte de Uruguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chaco
Citas: Nores e Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Darrieu y Camperi (1996); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Straneck (1990e)

Entre Ríos
Citas: Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008)

Formosa
Citas: Cano et al. (2010); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Di Giacomo(2005h); Di Giacomo(1998); Fraga (2001b); Ordano et al. (2008); Salvador y Di Giacomo (2014)

Misiones
Citas: Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Krauczuk (2005); Navas y Bó (1993)

Santa Fe
Citas:Fandiño y Pautasso (2011); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Manassero et al. (2004); Manassero y Luna (2009)

VERDÓN *Embernagra platensis* (Gmelin, 1789)

Otros nombres: Cotorra de bañado. Cotorra de los bañados. Chicha fría. Juan chiviro de las pajas. Juan chiviro de pajonal. Malverde. Pajero. Picahueso de las pajas. Picahueso del pajonal. Picahueso pajero. Siete cuchillas de la ciénaga. Verderón.

DESCRIPCIÓN
Largo: 21 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 3 X= 45,5 g (Rango 45,0 a 46,0); (*olivascens*); Contreras (1979f): N= 2 (M) 28,2 y 27,3 g; Contreras y Davies (1980): N= 1 (M) X= 39 g, N= 2 (M) X= 42,3 g (Rango 39,5 a 45,2), N= 1 (H) 43,3 g; Salvador (1990a): N= 1 (?) 46, 2 g; Camperi (1992a): N=2 (M) 49,2 y 50,1 g, N= 1 (H) 51,6 g; Darrieu y Camperi (1996): N= 1 (H) 45,0 g (*platensis*); Navas y Bó (2000): N= 9 (M) X= 43,9 g (Rango 42,8 a 47,1), N= 5 (H) X= 44,7 g (Rango 39,4 a 54,2) (*gossei*); Camperi y Darrieu (2005): N= 5 (M) X= 56,3 g (Rango 54,1 a 58,4), N= 5 (H) X= 52,8 (Rango 48,5 a 56,1) (*platensis*); Di Giacomo (2005h): N= 13 X= 43,6 g (Rango 40,0 a 49,0); Alderete y Capllonch (2012): N= 3 X= 44,6 g (Rango 41,0 a 50,0) (*catamarcanus*), Alderete y Capllonch (2012): N= 3 X= 43,6 g (Rango 41,0 a 45,0) (*platensis*), Alderete y Capllonch (2012): N= 4 X= 42,0 g (Rango 40,0 a 44,0) (*olivascens*); Salvador (2014a) N= 14 (?) X= 44,1 g (Rango 38,5 a 49,3) (*platensis*); N= 3 (?)X= 41,8 g (Rango 40,0 a 44,2) (*olivascens*); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 42,0 y 44,0 g, N= 20 X= 42,7 g (Rango 36,0 a 47,0), N= 2 juvenil 38,0 y 51,0 g (*platensis*)
Coloración. Pico anaranjado o amarillo anaranjado con culmen negro. Patas rosadas. Iris pardo.
Cabeza, garganta y pecho grises. Alrededor de los ojos con un tono más oscuro. Dorso oliváceo, estriado de pardo oscuro (en la raza del este). Abdomen blanquecino. Alas pardas con las barbas externas y las cubiertas amarillas oliváceas. Borde anterior de las alas amarillas. Cola olivácea.
Juvenil. Cejas amarillentas. Estriado dorsal y ventralmente. Rabadilla y subcaudales canelas. Pico negruzco.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja. Se posa sobre yuyos grandes, pajas bravas o matas.
Se oculta en los pajonales. Vuela corto y se "zambulle". En vuelo la cola "flamea".
Busca el alimento en el suelo y entre pastos hasta los 2 m. de altura. Tiene un canto fuerte y voces de alarma y contacto.

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Semillas de Eupatorio (*Urolepis hecatantha*), Brachiaria (*urochloa plantaginea*)
De la Peña (Inéd.). **Insectos:** Lepidoptera (orugas).
Marelli (1919).**Vegetales.Insectos.**
Aravena (1928). **Insectos:**Coleópteros. Escarabajos (Escarabeidos, Curculiónidos). Orthóptero (*Cephalochaema calamus*).
Zotta (1932). **Insectos:** Hymenópteros. Orthópteros.**Arácnidos.**
Zotta (1936). **Insectos:**Lepidópteros (oruga).

Zotta (1940).**Vegetales. Otros:**Huesos. Minerales.
Martínez et al. (1975). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Curculionidae, Estaphylinidae, Tenebrionidae). Homoptera (Membracidae). Orthoptera (Acridiidae).
Beltzer (1990d). **Vegetales:** Semillas *Cassia* sp*., Muehlenbeckia sagittifolia, Polygonum* sp*., Solanum amygdalifolium, Urera aurentiaca*. **Insectos:** Coleópteros (Carabidae, Elmidae, Dytiscidae) (Curculionidae, Hydrophilidae). Hemíptera (Belostomatidae, *Belostoma* sp.). Hymenoptera (Formicidae, *Acromyrmex* sp*., Atta* sp.). Orthoptera.**Anfibios:** (*Hyla pulchela*).**Arácnidos. Molluscos:**(Amplularidae, *Ampullaria insularum*).**Peces:***Hypopomus* sp*.*
Haro (1998). **Insectos:** Coleoptera. Orthoptera (Acridiidae).
Montalti et al. (2005).**Vegetales:** *Chenopodium sp., Eleusinetristachya, Helianthus annuus, Panicum* sp*., Scirpus* sp*., Triticum aestivum, Zea mays*. **Insectos:**Coleoptera (Coccinelidae, Curculionidae, Dytiscidae, no identificado) Hemiptera (Belostomatidae: *Belostoma* sp.).Hymenoptera (Apidae: *Apis mellifera*). Hymenoptera (*Formicidae: Acromyrmex lundi, Acromyrmex striatum, Atta* sp*., Solenopsis saevissima*).**Arácnidos:** Aranea (Lycocidae)
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** *Sorghum halepense*.Gramíneas. Semillas *Zea mays.***Insectos:**Coleoptera (Chrysomelidae, Curculionidae, no identificado).Hymenoptera (Formicidae).Hemiptera (Pentatomidae). Orthoptera (Acridiidae).**Moluscos:** (Planorbidae:**Arácnidos**: arañas.
De la Peña (2011a). **Insectos:** Langosta.
SalvadoryBodrati (2013c). **Anfibios:** Renacuajos.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.



Voces
Straneck (*in litt*.). El canto varía según la raza. Un ejemplo es la repetición de una frase aguda y bisilábica Tsi . psieh .. tsi . psieh.

HÁBITAT
Pastizales, bañados, pajonales.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Formosa, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

El nido tiene forma de taza. Emplea fibras vegetales, tallos de yuyos, hojas. Internamente fibras finas. Sostenido entre hojas de Pajas brava, arbustos o yuyos.Oculto. Elaborado.

Dinelli (1918b).Nidifica en Tucumán en noviembre y diciembre.
Goodall (1923). Córdoba-San Luisnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Smyth (1928). Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Friedmann (1931). Tucumán Norisnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pereyra (1938b). Noreste de la provincia de Buenos Aires, nidifica en noviembre.
Höy y Ottow (1964). Saltanido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Friedmann (1977). Buenos Aires Naroskynido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Masramón (1980). Nidifica en San Luis.



Fraga (1983c). Estancia La Candelaria, pdo. Lobos, Buenos Aires. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando.
Brocca (1997). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, un nido.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 5 nidos entre octubre y noviembre.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre noviembre y febrero. Se estudiaron 12 nidos. Es parasitado por *Molothrus bonariensis*
Salvador (2011c). Córdobanido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador (2012f). Córdobanido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 8, desde el 01-03-1976 al 23-01-2003, todos en provincia de Santa Fe. Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Medidas: Diámetro total: de 12 a 14 cm. Diámetro interno: de 6 a 9 cm. Profundidad: de 3,5 a 7 cm. Alto: de 8 a 14,5 cm.
Salvador y Bodrati (2014a). Magdalena, pdo. Magdalena, Buenos Aires, E. M. Earnshaw, el 11-01-1939 localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", 2 nidos con 2 huevos cada uno.
Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 5 nidos.

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, blancos con pintas y manchitas ocres y negras, más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 23,0 a 28,9 x 17,5 a 19,0
Dinelli (1918b): 24,0 a 25,0 x 18,0 a 19,8 X= 24,5 x 18,9 (N= 2)
Smyth (1928):24,5 a 25,5 x 18,0 a 18,5
Pereyra (1938b): 26,0 x 18,0
Di Giacomo (2005h): X= 25,9 x 15,8 (N= 19)
De la Peña (2013c): 24 a 26,9 x 18,7 a 19,2 X= 25,3 x 18,9 (N= 5)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 3,6 a 5,5 X= 4,5 (N= 18)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,245 a 0,283 X= 0,260 (N= 5)

Generalidades
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 15 días. La pareja alimenta a los pichones y permanecen en el nido entre 13 días.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 8 a 10 días. Pone los huevos en días corridos.

Observaciones
Pautasso (2002b).Reserva Urbana de la Ciudad Universitaria UNL "El Pozo", dpto. La Capital, Santa Fe, 23-11-1999, 2 juveniles, 02-12-1999, un juvenil.
De la Peña (2013c). El 18-01-91 en la Laguna del Platero, dpto. San Justo, Santa Fe un adulto alimentando a un juvenil. El 18-01-01 en Concordia, dpto. Concordia, Entre Ríos dos parejas con un juvenil cada una. El 15-11-02 en Villa Roda, dpto. La Capital, Santa Fe una pareja alimentaba a dos juveniles. El 13-03-03 al oeste de Ascochinga, dpto. Colón, Córdoba un adulto alimentaba a un juvenil.



Cayastá.Santa Fe.20-10-1978
Parasitado por *Molothrus bonariensis*



Jesús María.Córdoba.07-06-2007



Jesús María.Córdoba.21-07-2007



San Javier. Santa Fe. 03-12-1981. Ubicación nido



Cayastá.Santa Fe.15-11-1981



Jesús María.Córdoba.22-07-2007



Jesús María.Córdoba.01-05-2008. Juvenil



San Javier. Santa Fe. 03-12-1981

Otros

Di Giacomo (2005h). Del total de nidos observados, 2 estaban parasitados por *Molothrus bonariensis*. Goodall (1923). Smyth (1928). Friedmann (1931). Höy y Ottow (1964). Friedmann (1977). Fraga (1983c).Di Giacomo (2005h). Salvador (2011c). Salvador (2012f). De la Peña (2013c). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

Más información:
De la Peña (2013c)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pico naranja (con la parte superior negra, en la raza del este). Verdoso, pecho gris. Alas y cola oliváceas. Mancha amarilla en el borde de las alas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Embernagra platensis platensis (Gmelin, 1789) en Misiones, Corrientes, este de Formosa y de Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, sur de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y Río Negro; *Embernagra platensis olivascens* d´Orbigny, 1839 desde Jujuy, Salta y Formosa hasta La Rioja, Córdoba y San Luis ; *Embernagra platensis catamarcanus* Nores (1986) en Catamarca (Campo del Arenal) y *Embernagra platensis gossei* Chubb, 1918 en Mendoza, San Juan, San Luis y Neuquén.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cuatro subespecies. Bolivia, Paraguay, sureste de Brasil, Argentina y Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Embernagra platensis platensis (Gmelin, 1789)

Buenos Aires

Citas: Alderete y Capllonch (2012); Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Codesido et al. (2011, 2013); Contreras y Davies (1980); Dabbene (1919b); Daguerre (1922); Darrieu y

Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Isacch y Martínez (2001); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987a); Leveau y Leveau (2004b, 2011b); Marelli (1933); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b);Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Salvador y Bodrati (2014a); Straneck (1990b); White (1882); Zapata (1998)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 08-02-1976)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Haro (1998); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b); Salvador (1983); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1996); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Salvador y Di Giacomo (2014); White (1882)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 18-09-1979; Paso de los Libres, dpto. Paso de los Libres, 11-12-2002)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); López-Lanús et al. (2013c); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001, 2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975)

Formosa
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Grant (1911c); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014); Wetmore (1926b)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005); Siegenthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

Misiones
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Esteban (1953); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2008)

Río Negro
Citas: Camperi y Darrieu (2005); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Pérezy Petracci (1998)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1990); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2005, 2011); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Esteban (1953); Nores et al. (1991); Salvador (1990a)

Embernagra platensis olivascens d´Orbigny, 1839

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Esteban (1953)

Observaciones: De la Peña (Salado, dpto. Tinogasta, 12-03-1981; El Alamito, dpto. Andalgalá, 16-12-1999)

Córdoba
Citas: Castellanos (1934); Contreras (1980m); Frenzel(1891); Hellmayr (1938); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b); Partridge (1953c); Salvador (1983)

Observaciones: De la Peña (Copina, dpto. Punilla, 25-11-1990; La Falda, dpto. Punilla, 19-01-2000; Villa Tulumba,dpto. Tulumba, 14-11-2001)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Fiora (1934); Moschione y Segovia (2005)

Observaciones: De la Peña (San Salvador de Jujuy, 11-02-1983)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Giacomelli (1907, 1923); Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Chubb (1918a); Contreras (1979g, 1980m); Darrieu y Segura (2015); Lucero (2013f); Navas y Bó (2000); Pereyra (1927, 1951); Roig (1965); Sanzín (1918); Wetmore (1926b)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (Salta, dpto. La Capital, 30-01-1977)

San Luis
Citas: Masramón (1979, 1983); Nellar Romanella (1993).

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996, 1998); Alderete y Capllonch (2012); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Dinelli (1918); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Marigliano et al. (2010); Ortiz et al. (2011b, 2013c); Ortiz y Aráoz (2014)

Embernagra platensis catamarcanus Nores (1986)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Nores (1986)

Embernagra platensis gossei Chubb, 1918

Mendoza
Citas: Chubb (1918a); Contreras (1980m); Lucero (2013f); Navas y Bó (2000); Pereyra (1927, 1951); Roig (1965); Sanzín (1918); Wetmore (1926b)

Neuquén
Citas:Acerbo (2000); Chebez et al. (1993); Fiori y Zalba (1999); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011)

San Juan
Citas:Camperi y Darrieu (2004); Contreras (1980m); Gelain y Pereyra Lobos (2011); Gelain (2013g, 2014a); Haene et al. (1995); Lucero (2013f, 2013i); Navas y Bó (2000); Nores e Yzurieta (1982); Ortiz y Murúa (1994); Zotta (1941b)

San Luis
Citas: Bo (1965); Nellar Romanella (1993); Nores y Yzurieta (1986)

(*). Hayes, F. E. (2003) propone dos especies: Verdón grande o estriado (*Embernara platensis*) (para la raza del este) y Verdón oliváceo (*Embernagra olivascens*) (para la raza del Oeste)

VOLATINERO *Volatinia jacarina* (Linnaeus, 1766)

Otro nombres: Africano. Arrocero negro. Chaqueñito. Dominó negro. Saltarín. Sierra sierra.

DESCRIPCIÓN
Largo: 11 cm.
Peso: Di Giacomo (2005h): N= 5 (H) X= 9,5 g (Rango 7,8 a 10,2); Salvador (2014a): N= 5 (M) X= 9,5 g (Rango 9,1 a 10,1), N= 3 (H) X= 9,2 g (Rango 8,9 a 9,4**)**; Alderete y Capllonch (2012): N= 4 (?) X: 10 g (Rango 9,0 a 11); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 14 (M) X= 9,8 g (Rango 8,2 a 11,0), N= 7 (H) X= 10,3 g (Rango 9,5 a 11,0)
Coloración. Pico negro. Patas negruzcas. Iris pardo oscuro.
Macho. Negro azulado brillante. Alas pardas oscuras. Axilares y tapadas internas de las alas blancas. Cola negra.
Hembra. Dorsal parda. Ventral ocrácea con el pecho estriado de pardo. Alas pardas ribeteadas de ocráceo. Cola parda.

COMPORTAMIENTO
En el período de apareamiento el macho, desde una percha (ramas, postes, alambres) realiza saltos verticales emitiendo un gritito y cae al mismo lugar. Puede estar varios minutos haciendo esto. Luego vuela y puede comenzar nuevamente en otro lugar.
De la Peña, (2006d). Recolecta alimentos entre 0,50 y 2 m.

Alimentación
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:**Semilla *Paspalum urvillei, Paspalum hydrophylum, Paspalum intermedium, Paspalum plicatulum, Panicum prionitis.*
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:**Semilla*Carduus* sp.,Gramíneas *Panicum maximun, Sorghum halepense.*
De la Peña (2011a). **Vegetales:**Semilla*Chloris barbata,Diplachne uninervia,Echinochloa helodes,Eriochloa punctata,Leptochloa chloridiformis,Panicum bergii,Panicum dilatatum,Paspalum urvillei,Setaria fiebrigii, Setaria parviflora.*

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Praderas, sabanas, orillas de montes, matorrales, pastizales.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Formosa, Misiones, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N



El nido tiene forma de tacita, de fibras vegetales. Internamente fibras finas o cerdas. Atado a yuyos u otras plantas.
Expuesto. Elaborado.

De la Peña (Inéd.). Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 01-02-2016. Nido en construcción en un Paico (*Dysphania ambrosioides*) a 1 m del suelo, en la orilla de un camino rural. Mide 7 cm de diámetro externo, 6 cm en el interno, 6 cm de alto y 4 cm de profundidad. Construido con fibras vegetales finas y raicillas, liadas con telas de arañas. Poco atado al paico. Puso 2 huevos y fue destruído por una lluvia.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica en noviembre y diciembre. Se hallaron 15 nidos.
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 7, entre el 14-12-1975 y el 17-12-2003, todos en provincia de Santa Fe.
Medidas: Diámetro total: de 6 a 8 cm. Diámetro interno: de 5 a 5,5 cm. Profundidad: de 2,5 a 4 cm. Alto: de 4,5 a 5 cm. Grosor de la pared: de 0,5 a 1 cm.
Salvador y Bodrati (2014a). Tobuna, dpto. San Pedro. Misiones, Bodrati localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*



Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, verde pálido con pintitas castañas y grises distribuidas por toda la superficie pero más concentradas en el polo mayor, formando una corona.

Medidas
De la Peña (Inéd.): 17,0 x 13,0 y 18,0 x 14,0
Hartert y Venturi (1909): 16,6 a 17,5 x 11,8 a 13,5
Smyth (1928): 18,0 x 12,5
Di Giacomo (2005h): 15,1 a 17,4 x 11,3 a 13,5 X= 16,4 x 12,4 (N= 15)
De la Peña (2013c): 16,7 a 17,9 x 13 a 14,3 X= 17 x 13,4 (N= 5)

Pesos
De la Peña (Inéd.): 1,2 y 1,2
Di Giacomo (2005h): 0,9 a 1,3 X= 1,1 (N= 15)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,097 a 0,101 X= 0,098 (N= 5)

Generalidades

De la Peña (Inéd.). La pareja construye. Demoró en construuir el nido 5 días. Pone los huevos en días corridos.

Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 13 días. La pareja construye y alimenta a los pichones.

Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*



Esperanza.Santa Fe. 07-02-2016. Ubicación nido



Monte Vera. Santa Fe.14-12-1975



Esperanza. Santa Fe. 30-11-2015. Macho



Esperanza. Santa Fe. 07-12-2015. Hembra





Esperanza. Santa Fe. 05-12-2015. Cortejo del macho

Más información:
De la Peña (2013c)



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: negro con blanco en las axilares y en las cubiertas internas de las alas. Hembra: parda. Ventralmente ocrácea con el pecho jaspeado. Diferenciar al macho del de la Reinamora enana.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Volatinia jacarina jacarina (Linnaeus, 1766) desde el norte del país hasta el norte de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luís y Mendoza. En otoño migra al norte.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Desde Mejico hacia el sur hasta el norte de Chile y Argentina: Méjico, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Guayana Francesa, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Volatinia jacarina jacarina (Linnaeus, 1766)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Di Giacomo (1987b); Jaramillo (2000); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Roesler (2003); Savigny (2002a)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Ortiz y Capllonch (2010)

Chaco
Citas: Moschione y Bishels (2005)

Observaciones: De la Peña (Cerrito, 25-11-1972)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015ª); Miatello et al. (1993); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Marull, dpto. San Justo, 25-02-2005; 22-11-2008; 15-01-2009)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008); Ortiz y Capllonch (2010)

Observaciones: De la Peña (Paso de los Libres, dpto. Paso de los Libres, 12-11-2002)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); Chebez et al. (1990); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008)

Formosa
Citas: Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Martelli (1995); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005); Ortiz y Capllonch (2010)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010, 2012b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2008); Martínez Gamba (2014); Ortiz y Capllonch (2010); Partridge (1954); Salvador y Bodrati (2014a)

Mendoza
Citas: Roig (1965)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Esteban (1953); Moschione et al. (2013); Ortiz y Capllonch (2010)

Observaciones: De la Peña (Tartagal, dpto. Gral. J. de San Martín, 01-02-1977; Yatasto, dpto. Metán, 06-02-1983)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero e Izasa (2015)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: De la Peña (1981g, 2002h, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013d); Pautasso (2002b)

Santiago del Estero
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); López de Casenave et al. (1998); Ortiz y Capllonch (2010); Salvador y Eroles (1994); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Alderete y Capllonch (2012); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Ortiz et al. (2011b, 2013c); Ortiz y Capllonch (2010); Ortiz y Aráoz (2014)

CORBATITA OLIVÁCEO *Sporophila frontalis* (J. Verreaux, 1869)

Otros nombres: Corbatita grande. Corbatita turú-tuí. Güirá-yurú. Pichochó. Tuí. Tutú-tuí.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12,5 cm.
Peso: Willis y Oniki (2002): N= 4 (?) RA: 12 a 17 g
Coloración. Pico naranja. Patas rosado oscuro. Iris pardo.
Macho. Dorsal parda olivácea. Frente blanquecina. Cejas posoculares y garganta blancas. Pecho y flancos pardo grisáceos. Abdomen blanquecino. Alas y cola pardas. Cubiertas alares con puntas blanquecinas.

Hembra. Olivácea. Sin cejas. Cubiertas alares con las puntas ocráceas.



COMPORTAMIENTO

Alimentación
Collar et al. (1992). **Vegetales:**Semilla*Merostachys* sp.

HÁBITAT
Tacuarales y vegetación arbustiva en selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Parda olivácea. Frente blanquecina. Cejas posoculares blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sporophila frontalis (J. Verreaux, 1869) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se lo encuentra en áreas dispersas de la Selva Atlántica delsureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Areta et al. (2009); Bertoni (1913); Chebez y Casañas (2000); Chebez (1994, 1996a); Olrog (1979); Saibene et al. (1996); Savigny (2010)

CORBATITA PICUDO *Sporophila falcirostris* (Temminck, 1820)

Otros nombres: Capuchino de Temminck. Corbatita de Temminck. Corbatita de los tacuarales. Tacuarero.



DESCRIPCIÓN
Largo: 11 cm.
Coloración. Pico amarillo. Patas pardas. Iris pardo.
Gris. Abdomen blanco.Mancha en la base de las primarias y banda alar blancas.

HÁBITAT
Orillas de bosques y selvas con tacuarales.

NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N				

Castelino (1990). Parque Nacioanl Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, entre el 15 y 17 de agosto de 1988, nido en construciión a 5 m de altura. Emplea musgos.



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico amarillo. Gris con blanco en las alas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sporophila falcirostris (Temminck, 1820) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se lo encuentra en áreas dispersas de la Selva Atlántica delsureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Areta et al. (2009); Castelino (1990); Chebez y Casaña (2000); Krauczuk (2008); Krauczuk y Castía (2009); Mazart Barnet y Pearman (2001); Navas y Bó (1987); Saibene et al. (1996)

CORBATITA PLOMIZO *Sporophila plumbea* (Wied-Neuwied, 1830)

Otros nombres: Papativa. Paraguayito. Patativa.

DESCRIPCIÓN
Largo: 10,5 cm.
Peso: Belton (1985): N= 1 (M) 13 g, N= 1 (H) 12 g; Rising (2011): 8,8-12 g
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Macho. Dorsal gris celeste. Garganta y "bigotes" blancos. Cuello, pecho y lados del cuerpo grises pálidos. Vientre blanco. Alas negruzcas con las plumas orilladas de gris. Manchas alares blancas. Cubiertas alares orilladas de gris. Cola negra.
Hembra. Dorsal parda olivácea. Ventral ocrácea.



HÁBITAT
Pastizales.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración general gris con "bigotes"vientre y manchas alares blancos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sporophila plumbea plumbea (Wied-Neuwied, 1830) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. Presenta poblaciones claramente separadas por la cuenca del Amazonas. La del norte de Sud América comprende Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam. La que se encuentra al sur del Amazonas abarca Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sporophila plumbea plumbea (Wied-Neuwied, 1830)

Misiones
Citas: Bertoni (1939); Chebez et al (1998); Chebez (1996a, 2009); Militello y Chebez (2009); Saibene et al. (1996)

CORBATITA DOMINÓ *Sporophila collaris* (Boddaert, 1783)

Otros nombres: Chilenito. Corbatita de collar. Dominó. Dominó criollo. Dominó de la isla. Islero. Paraguayito.

DESCRIPCIÓN
Largo: 11 cm.
Peso: Contreras (1979f): N= 1 (M) 12,8 g; Di Giacomo (2005h): N= 4 (M) X= 11,9 g (Rango 10,6 a 12,5), N= 3 (H) X= 12,5 g (Rango 12,0 a 13,2); Alderete y Capllonch (2012): N= 2 (?) 14 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 (M) 14,1 y 14,4 g, N= 17 (M) X= 12,5 g (Rango 11,2 a 14,5), N= 7 (H) X= 11,7 g (Rango 9,8 a 12,4), N= 2 juvenil 12,0 y 14,0 g
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo oscuro.
Macho. Corona y cara negras. Manchita en la frente, por debajo de los ojos y garganta blancos. Collar nucal castaño. Dorsal negruzca con la rabadilla castaña. Collar negro. Resto de la parte ventral castaño. Alas negruzcas con dos bandas castañas en las cubiertas. Cola negruzca.
Hembra. Dorsal parda olivácea. Rabadilla, bandas en las cubiertas y ventral canelas. Garganta blanca. Alas pardas con las secundarias ribeteadas de ocráceo. Manchitas alares blancas. Cola parda.

COMPORTAMIENTO
Anda sola o en pareja. Se alimenta de semillas.

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Semillas de Barabal (*Setaria parviflora*).
Roesler (2003b). **Vegetales:**Semilla *Paspalum* sp.
Di Giacomo (2005h).**Vegetales:**Semilla*Andropogon lateralis,Cyperus entrerrianus,Cyperus giganteus,Echinochloa crusgalli,Hymenachne amplexicaulis,Panicum prionitis,Paspalum hydrophylum,Paspalum intermedium,Paspalum notatum,Paspalum plicatulum,Paspalum urvillei,Polygonum punctatum,Schoenoplectus californicus,Setaria vulpiseta,Sorghastrum pellitum.*

HÁBITAT
Pajonales, bañados, orillas de juncales.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Formosa, Corrientes, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N							N	N

El nido tiene forma de tacita o semiesfera de fibras vegetales. Atado a ramitas o tallos de flores o de plantas acuáticas.
Expuesto. Elaborado.

Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 2 nidos.
Pautasso (2002b).Reserva Urbana de la Ciudad Universitaria UNL “El Pozo”, dpto. La Capital, Santa Fe, 15-12-1999, nido sin postura.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre noviembre y abril. Se estudiaron 70 nidos.
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 5, desde el 22-12-1978 al 05-01-1999, todos en provincia de Santa Fe.
Medidas: Diámetro total 7 cm. Diámetro interno: 5 cm. Profundidad: 4 cm. Alto: 5 cm.

Huevos
Pone 2 ó 3 huevos, ovoidales, verdes azulados o blanco verdosos con pintas castañas, marrones, grises o pardas, a veces más concentradas en el polo mayor.


Cayastá.Santa Fe.22-12-1978


Colastiné.Santa Fe.25-01-1999. Ubicación nido


Saladillo-Cayastá. Santa Fe. 06-11-2012


Cayastá.Santa Fe.22-12-1978




Colastiné.Santa Fe.25-01-1999



Medidas
Hartert y Venturi (1909): 16,5 a 18,2 x 12,6 a 13,0
Smyth (1928): 17,0 x 12,5
Di Giacomo (2005h): 16,4 a 21,0 x 12,2 a 13,6 X= 18,4 x 13,0 (N= 48)
De la Peña (2013c): 16,3 a 19,7 x 12,8 a 13,9 X= 19,3 x 13,3 (N= 4)

Pesos
Di Giacomo (2005h):1,2 a 1,6 X= 1,4 (N= 46)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,100 a 0,108 X= 0,103 (N= 4)
De la Peña (2013c).

Otros
Pautasso en Mastropaolo (2007). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

Generalidades
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 12 ó 13 días. La pareja alimenta a los pichones y permanecen en el nido entre 9 y 12 días.
Contreras (1990b). Los huevos son puestos en días corridos.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: cabeza y collar negros con manchitas en la frente, debajo de los ojos y garganta, blancas. Collar pectoral negro, nucal castaño. Hembra: dorsal parda, ventral canela. Manchitas alares blancas.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sporophila collaris melanocephala (Vieillot, 1817) desde el norte del país hasta Mendoza, Córdoba y norte de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Se encuentra en: Bolivia, Paraguay, sureste de Brasil, Uruguayy Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sporophila collaris melanocephala (Vieillot, 1817)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987a); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Straneck (1990e)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Salvador y Di Giacomo (2014)

Córdoba
Citas:Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b, 1983a); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1980-81, 1987b, 1990b); Darrieu y Camperi (1996); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguelñ, 18-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Muzzachiodi (2011a); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008)

Formosa
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) ; Camperiet al. (2013)

La Pampa
Citas: Roesler (2003)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1907, 1923)

Mendoza
Citas: Contreras y Fernández (1980); Contreras y Roig (1977a); Darrieu y Segura (2015)

Misiones
Citas: Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2008)

Salta
Citas:Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)



San Juan
Ciyas: Gelain (2014a);

Santa Fe
Citas: De la Peña (1981b, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b)

Santiago del Estero
Citas: Olrog (1959, 1963, 1979); Sferco y Baldo (1995)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz et al. (2013c)

CORBATITA OVERO *Sporophila lineola* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Bigote. Corbatita blanquinegra. Corbatita de frente blanca. Corbatita negra y blanca.

DESCRIPCIÓN
Largo: 11 cm.
Peso*:*Salvador (1988):N= 3 (H) X= 9,0 g (Rango 8,0 a 10,0), N= 1 (M)10,0 g, N= 1 (?) 9,0 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 4 (?) X: 11,2 g (Rango 11 a 12)
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Macho. Parte dorsal, garganta, alas y cola, negras. Centro de la corona, franjas malares, rabadilla y ventral blancos. Remeras con manchas blancas.
Hembra. Dorsal parda olivácea. Ventral ocrácea.



COMPORTAMIENTO
Anda sola o en pareja.

Alimentación
Areta y Almirón (2009).**Vegetales:**Semilla*Echinochloa cf. polystachya,Paspalum notatum,Paspalum urvillei.*
Di Giacomo (2005h).**Vegetales:**Semilla*Paspalum intermedium,Paspalum urvillei.*

HÁBITAT
Sabanas, orillas de montes y de selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										N

El nido tiene forma de tacita o semiesfrea de fibras vegetales. Atado a ramitas.Expuesto. Elaborado.



Uranga (*in litt.*). Rosario de la Frontera, dpto. Rosario de la Frontera, Salta, 16-02-2013, nido con un pichón y 2 huevos.
Dinelli (1924). Tucumán, nidos en enero y febrero.
Friedmann et al. (1977). Salta Höy nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Contino (1980). Nidifica en el noroeste.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nido sin postura el 09-12-2003.
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Villa Ángela, dpto. Mayor Luis Jorge Fontana, Chaco, 14-12-1982, 3 nidos con 3 huevos cada uno.
Un nido se hallaba en un bosque abierto e inundado, a 1,5 m de altura en un *Geoffroea decorticans*, semiesfera colgante en una bifurcación, hecho de forma laxa de tallitos, cerdas, hojitas y musgo, de 7 cm de diámetro externo, 4 cm de diámetro interno, altura 5 cm y 2 cm de profundidad.
Otro en un área similar al anterior, a 1,5 m de altura en un *Geoffroea decorticans*, semiesfera bastante transparente de pajitas, tallitos y raicillas, de 6 cm de diámetro externo, 4,5 cm de diámetro interno, 4 cm de altura y 2,7 cm de profundidad.
El restante en un área similar a la de los anteriores, a 1,2 m de altura en un *Geoffroea decorticans*, semiesfera delicada de raicillas y pecíolos finos, de 6 cm de diámetro externo, 5 cm de diámetro interno, 4,5 cm de altura y 3 cm de profundidad.
De la Peña (2013c). Tartagal (Salta), dpto. Gral. San Martín, Salta, 02-02-1977, nido en un Arbusto a 2,50 m de altura, 2 pichones
Medidas: Diámetro total: 5 cm. Diámetro interno: 4 cm. Profundidad: 3 cm. Alto: 4 cm.
Salvador y Bodrati (2014a). Resistencia, dpto. San Fernando. Chaco, Bodrati localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*




Rosario de la Frontera. Salta. 16-02-2013. Foto: Máximo Uranga

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, color celeste muy pálido, con muchas manchitas y pecas pardas y algunas negruzcas.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 15,1 a 16,7 x 12
Dinelli (1924): 16,0 x 12,5 y 18,0 x 12,0
Contino (1980): 16,0 x 12,0

Salvador y Salvador en De la Peña (2010b): 17,0 a 18,5 x 12,4 a 13,2 X= 17,4 x 12,8 (N= 9)



Peso
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b): 1,5 a 1,8 X= 1,56 (N= 6)

Observaciones
Argiroffo, G. (*in litt.*). Cayastá, dpto. Garay, Santa Fe, 28-01-2015, pareja con 2 volantones.

Otros
Friedmann et al. (1977). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Anterior de la corona, franjas malares y ventralmente blancos. Garganta, dorso, alas y cola, negras.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sporophila lineola lineola (Linnaeus, 1758) en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Chaco, Santiago del Estero, centro y norte de Santa Fe, Misiones, Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica.Se diferencian claramente 2 poblaciones, la "del sur que cría en el norte de Argentina, Bolivia, Paraguay y sureste de Brasil, y que presumiblemente migra a Perú, Ecuador, Colombia y norte de Brasil durante el invierno austral, y una población, "del norte" que cría en la Caatinga e inverna en Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, y Surinam. Una parte de esta última es residente permanente.
Comprende: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.
Son migradores australes que se mueven desde el sur de su área de distribución hacia el norte de Sud América durante el invierno austral.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sporophila lineola lineola (Linnaeus, 1758)

Catamarca
Citas: Esteban (1953)

Chaco
Citas:Bodrati y Pietrek (2000); Salvador y Bodrati (2014a)

Observaciones: De la Peña (San Salvador de Jujuy, dpto. Capital, 01-02-1977)

Corrientes
Citas: Contreras (1987b); Darrieu (1984)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Di Giacomo(2005h); López Lanús (1997)

Jujuy

Citas:Alderete y Capllonch (2012); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988)

La Rioja
Citas: Hayward (1967)

Misiones
Citas: Areta y Almirón (2009)

Salta
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); De la Peña (1981b); Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: De la Peña (1988, 1996, 1996b, 2011f); Hartert y Venturi (1909); Luna y Manassero (2013)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Dinelli (1924); Lucero (1983); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014)

CORBATITA AMARILLO *Sporophila nigricollis* (Vieillot, 1823)

Otros nombres: Corbatita de panza amarilla. Corbatita de vientre amarillo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 11,5 cm.
Peso: Rising (2011): 8,5-11,2 g
Coloración. Pico gris azulino. Patas negruzcas. Iris pardo.
Macho. Cabeza, garganta y pecho negros. Espalda, alas y cola oliváceas. Pecho inferior y vientre amarillos pálidos.
Hembra. Dorso pardo oliváceo. Ventralmente ocrácea.



HÁBITAT
Sabanas, matorrales.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza y pecho superior negros. Pecho inferior y vientre amarillentos. Dorsal olivácea.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sporophila nigricollis nigricollis (Vieillot, 1823) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Desde Costa Rica hasta el sur de Brasil (excluida región de Amazonia) y extremo noreste de Argentina. Algunas islas del Caribe. Comprende: Costa Rica, Panamá, Antigua y Barbuda, Barbados,

Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sporophila nigricollis nigricollis (Vieillot, 1823)

Misiones

Citas:Chebez (1996a); Partridge (1961a); Saibene et al. (1996)

CORBATITA COMÚN *Sporophila caerulescens* (Vieillot, 1823)

Otros nombres. Corbatita. Corbatita de doble collar. Dominó. Encorbatado. Gargantilla. Gargantillo.

DESCRIPCIÓN

Largo: 11 cm.

Peso: Fiora (1934): N= 4 X= 10,0 g; Salvador (1988): N= 1 (H) 11,0 g, N= 3 (M) X= 11,9 g (Rango 11,5 a 12,7); Di Giacomo (2005h): N= 2 (M) X= 11,5 g (Rango 11,0 a 12,0), N= 1 (H) 10,8 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 44 X= 10,5 g (Rango 9 a 15); Salvador (2014a): N= 11 (M) X= 11,5 g (Rango 9,5 a 12,7), N= 6 (H) X= 10,9 g (Rango 9,8 a 11,2); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 12 (M) X= 10,9 g (Rango 10,0 a 12,2), N= 12 (H) X= 11,4 g (Rango 8,9 a 14,2), N= (M) 10,5 g, N= 1 (H) 10,0 g, N= 1 juvenil 12,2 g, N= 1 (M) 11,0 g

Coloración. Pico gris o amarillo verdoso. Patas negras. Iris pardo oscuro.

Macho. Dorsal gris plomiza. Garganta y banda pectoral negras. Finos "bigotes" y collar blancos. Resto de la parte ventral blanco. Alas y cola grises parduscas.

Hembra. Dorsal parda olivácea. Ventral ocrácea. Alas y cola pardas grisáceas.

COMPORTAMIENTO

Anda solitaria, en pareja o en grupos.Se alimenta de semillas.

De la Peña (2006d). Busca comida entre los 0,50 y 2 m. de altura.

Alimentación

De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales: Vegetales:** semillas de Gramilla (*Cynodon dactylon),* Pata de gallina (*Eleusine indica*), Canutillo (*Echinochloa crus-galli*). Frutos de *Morus alba*.

Baliño (1984). **Vegetales:** Fruto *Melia azedarach.*

Comparatore et al. (1996).**Vegetales:**Semilla *Carduus acanthoides*

De la Peña y Pensiero (2003).**Vegetales:**Semilla *Conyza floribunda, Melica macra, Sorghum halepense, Urochloa plantaginosa.*

Di Giacomo (2005h).**Vegetales:** Semilla *Digitaria ciliaris, Paspalum urvillei, Paspalum intermedium, Setaria vilpiseta*. **Insectos:** Hormigas aladas (*Acromyrmex* sp.)

Ortiz y Capllonch (2007a).**Vegetales:** Semilla *Cyperus* sp*., Echinochloa cruzgalli, Leptochloa* sp*., Panicum* sp*., Schizachyrium microstachyum, Sorghum* sp.(2 variedades).

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:**Semilla *Carduus* sp*., Chenopodium* sp*.,* Gramíneas *Panicum mileaceum, Sorghum halepense.*

De la Peña (2011a). **Vegetales:**Semilla*Aloysia gratissima,Bothriochloa lagunoides,Conyza bonariensis,Conyza floribunda, Chloris barbata,Diplachne uninervia,Echinochloa helodes, Echinochloa punctata, Leptochloa chloridiformis,Lippia turbinata, Melica macra,Panicum bergii, Panicum dilatatum,Paspalum* sp., *Paspalum urvillei,Setaria fiebrigii,Setaria lachnea,Setaria parviflora,Sorghum halepense, Urochloa plantaginosa.*

Voces

Straneck (*in litt*.). Emite una compleja y rápida frase: Tigli-diyitiglitidip.

HÁBITAT

Sabanas, praderas, estepas arbustivas, pastizales, parques, áreas rurales, jardines, áreas urbanas y periurbanas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Tucumán, Chaco, San Luis, Córdoba, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N								N	N



El nido tiene forma de tacita o semiesfera, de fibras vegetales finas, liadas con telas de arañas. Atado a tallos de plantas.Expuesto. Elaborado.
Hudson (1874). Buenos Aires nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Dinelli (1924). Tucumán, llega en octubre para nidificar.
Friedmann (1929). Tucumán nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pereyra (1938b). Noreste de la provincia de Buenos Aires, nidifica.
Pereyra (1956). Zelaya, pdo. Pilar, Buenos Aires, 17-02-1946, nido con 2 huevos.
Masramón (1962). San Luis, nidos con 3 huevos el 24 de enero y el 5 de febrero.
Klimaitis (1986c). Liebig, dpto. Colón, Entre Ríos, nido dentro de una flor. Tenía 2 huevos.
Alabarce (1987b) . Yuto, dpto. Ledesma, Jujuy, 15-02-1976 y 20-12-1977, dos nidos de la colección Contino; Tucumán, 14-02-1984, nido; 19-01-1084, nido con 2 huevos.
Masramón (1980). Nidifica en San Luis.
Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 21 nidos.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Pautasso (2002b).Reserva Urbana de la Ciudad Universitaria UNL "El Pozo", dpto. La Capital, Santa Fe, 25-11-2000, nido con 2 huevo.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre diciembre y enero. Se hallaron 4 nidos.
Sallvador (2011c). Córdoba nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 62, desde el 01-03-1971 hasta 20-02-2010, todos en provincia de Santa Fe. Es parasitados por *Molothrus bonariensis.*
Medidas: Diámetro total: de 5 a 6 cm. Diámetro interno: de 4 a 5 cm. Profundidad: de 3,5 a 4 cm. Alto: de 5 a 6 cm. Altura: Nido más bajo: 0,30 m. Nido más alto: 3,70 m.
Salvador y Bodrati (2014a). Magdalena, pdo. Magdalena, Buenos aires, E. M. Earnshaw, el 15-12-1937, localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Bodrati (2014a). Salto, pdo. Salto, Buenos Aires, A. Di Giacomo, localizó nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Nacional Chaco, Chaco y Tobuna, dpto. San pedro, Misiones, Bodrati localizó nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", 2 nidos con 2 y 1 huevos cada uno.
Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 7 nidos.



Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, blanquecinos, cremas o blanco verdosos, con pintas pardas, grises y puntos negros distribuidos por toda la superficie.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 16,5 a 20,0 x 12,5 a 13,0
Dinelli (1924): 19,0 x 13,0
Smyth (1928): 17,0 a 19,0 x 12,5 a 14,0
Pereyra (1938b): 18,0 x 13,0
Klimaitis (1986c) : 16,7 a 17,3 x 12,3 a 12,9 X= 17,0 x 12,6 (N= 2)
Alabarce (1987b): 15,5 a 16,0 x 12,0 a 13,5 X= 15,8 x 12,5 (N= 3)
Di Giacomo (2005h):16,1 a 17,2 x 12,0 a 13,2 X= 16,4 x 12,8 (N= 4)
De la Peña (2013c): 16,5 a 18,4 x 12,0 a 13,3 X= 17,3 x 12,3 (N= 25)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 1,2 a 1,3 X= 1,2 (N= 4)
De la Peña (2013c): 1,2 a 1,5 X= 1,4 (N= 15)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,079 a 0,110 X= 0,085 (N= 11)

PICHONES
Descripción.
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel naranja. Comisura amarilla. Cavidad bucal y lengua rosados. Escaso plumón fino, gris, en cabeza, dorsal y dorsal de las alas.
4 días
Abre los ojos. Comisura blanquecina-amarillenta. Cavidad bucal y paladar, rojizos. Mancha amarilla en la parte anterior del paladar. Plumón escaso, gris. Vainas alares canelas.
Zonas ptéridas con vainas grises en dorsal y blanquecinas en ventral.
6 días
Piel verdosa. Pico color natural. Comisura amarilla. Lados del pecho amarillentos jaspeados de pardo. Flancos amarillentos. Láminas de las cubiertas canelas. Láminas de primarias y secundarias, pardas.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,3	0,7-1,0	1,1						1,8-2,9
2	0,3	0,7-0,8	1,1						2,2-2,4
3	0,3	0,8-0,9	1,2	0,2					2,6-3,6
4	0,4	1,2	1,5	0,8		0,6			4,2-4,7
5	0,5	1,4	1,9	1,2		0,9			5,4-6,0
6	0,5	1,5	1,9	1,3	0,2	1,1	0,2	0,2	6,1-6,5
7	0,5	1,6	2,0	1,4	0,6-0,8	1,0	0,6	0,5	6,8-7,1
8	0,5	1,6	2,0	1,3	1,0-1,3	1,0	0,8-1,0	0,7	7,2-8,3

Generalidades
Contreras (1990b). Los huevos son puestos en días corridos. El período de incubación es de 13 días.
El pichón permanece en el nido 10-15 días.

De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 5 a 6 días. Período de incubación 11-12 días. Los huevos son puestos en días corridos. Los pichones nacen en 24 horas.
En un nido luego de volar los pichones, a los pocos días ocupó nuevamente el nido.

Otros

Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Dinelli (1941). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.* Hudson (1874). Friedmann (1929). De la Peña (2013c). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Macho: dorsal gris. Garganta negra bordeada de blanco. Collar pectoral negro.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Sporophila caerulescens caerulescens (Vieillot, 1823) desde el norte del país hasta Neuquén y Chubut.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina.



Esperanza.Santa Fe.31-12-1977
Parasitado por *Molothrus bonariensis*



Esperanza.Santa Fe.23-12-2004



Esperanza.Santa Fe.29-12-2004



Esperanza.Santa Fe.31-12-1977



Esperanza.Santa Fe.31-12-1977



Jesús María.Córdoba.03-05-2008
Comiendo semillas de *Setaria lachnea*



Esperanza. Santa Fe.28-12-2007. Hembra



Jesús María.Córdoba.25-12-2007. Macho



Esperanza.Santa Fe.05-01-2005



Esperanza.Santa Fe.30-12-2004



Jesús María. Córdoba. 26-01-2015

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sporophila caerulescens caerulescens (Vieillot, Vieillot, 1823)

Buenos Aires
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (1997b, 2006b); Dabbene (1919b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987a); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Ortiz y Capllonch (2007a); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Salvador y Bodrati (2013a, 2014); Salvador y Di Giacomo (2014); White (1882); Zuberbhüler (1971)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Ortiz y Capllonch (2007a); Vides Almonacid (1999)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2005); Ortiz y Capllonch (2007a)Salvador y Bodrati (2014a).

Chubut
Citas: Kovacs et al. (2005); Lowery y Short (1969); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Castellanos (1934); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador(1983, 1988); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Jesús María, dpto. Colón, 27-11-2009; Ascochinga, dpto. Colón, 19-11-2110)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b, 1990b); Darrieu y Camperi (1996); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ortiz y Capllonch (2007a); Salvador y Di Giacomo (2014)

Observaciones: De la Peña (Gobernador Virasoro, dpto. Santo Tomé, 13-12-2002)



Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Straneck (1990c); Zapata (1975)

Formosa
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Contreras (1987c); Di Giacomo (2005h); Narosky y Martelli (1995); Ortiz y Capllonch (2007a); Salvador y Di Giacomo (2014)

Jujuy
Citas: Alabarce (1987); Alderete y Capllonch (2012); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Fiora (1934); Lucero(1982); Moschione y Segovia (2005); Olrog (1971, 1976); Ortiz y Capllonch (2007a)
Observaciones: De la Peña (San Salvador de Jujuy, dpto. Capital, 01-02-1977)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Güller (2008); Tejerina et al. (2006); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler (1984)

La Rioja
Citas: Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu y Segura (2015); López de Casenave (2001); Gómez (2006); Lucero (2013f); Marone (1992a); Roig (1965); Sanzín (1918); Wetmore (1926b)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010, 2012b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2008); Martínez Gamba (2014); Ortiz y Capllonch (2007a)Salvador y Bodrati (2014a)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 12-10-1981)

Neuquén
Citas: Contreras (1977b); Matarasso (2007); Veiga et al. (2002); Veiga y Acerbo 2002)

Río Negro
Citas:Contreras (1977c); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011)

Salta
Citas: Alabarce y Lucero (1977); Alderete y Capllonch (2012); Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Ortiz y Capllonch (2007a); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (Salta, dpto. La Capital, 30-01-1977)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i)

San Luis
Citas: Masramón (1983, 1979); Nellar Romanella (1993)

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (1981g, 2011a, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Chébez y Bertonatti (1994) (Isla de los Estados)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996, 1998); Alabarce (1987); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Dinelli (1924); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Malizia et al. (1998); Ortiz et al. (2011b, 2013c); Ortiz y Capllonch (2007a); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Soria et al. (2010)

CORBATITA BLANCO *Sporophila leucoptera* (Vieillot, 1817)

Otros nombres: Corbatita ala blanca. Corbatita blanquigris. Corbatita gris y blanca. Corbatita de pico grueso. Llorón.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12 cm.
Peso: Storer (1989): N= 3 (M) X: 15,5 g
Coloración. Pico naranja. Patas negruzcas. Iris pardo.
Macho. Dorsal, alas y cola grises. Ventral blanca. Base de las remeras blanca.
Hembra. Dorsal parda olivácea. Ventral ocre acanelada. Manchas alares blancas.


HÁBITAT
Sabanas, bosques.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Rising (2011)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal gris plomiza. Ventral blanca.
En vuelo, bandas alares blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sporophila leucoptera leucoptera (Vieillot, 1817) en Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y norte de Santa Fe.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Se encuentra distribuida en parches, una población en centro norte de Brasil, este de Paraguay y norte de Argentina; otras poblaciones en Amazonia y en Surinam, Finalmente otro grupo se encuentra en el sur de Perú y Bolivia.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sporophila leucoptera leucoptera (Vieillot, 1817)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Olrog (1979)

Corrientes
Citas: Baldo et al. (1995); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Darrieu (1984); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b);

Formosa
Citas: Contreras (1987c, 1993b); Di Giacomo(2005h); Grant (1911c); López Lanús (1997); Olrog (1979)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: De la Peña (1996b, 2011f); De la Peña et al. (2003); Fandiño y Pautasso (2011); Hartert y Venturi (1909); Olrog (1979); Pautasso (2002a)

Misiones
Citas: Moschione y San Cristóbal (1993)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Caplloch et al. (2005); Lougheed (1991)

CAPUCHINO DEL PANTANAL *Sporophila nigrorufa* (Orbigny & Lafresnaye, 1837)

DESCRIPCIÓN
Largo: 10 cm.
Coloración. Pico negruzco. Patas negras. Iris pardo.
Macho. Corona, nuca y parte dorsal negras. Rabadilla y parte ventral rojizas. Alas y cola negruzcas. Mancha alar blanca. Remeras orilladas de blanco.
Hembra. Dorsal parda olivácea. Ventral ocrácea.

HÁBITAT
Pastizales, áreas arbustivas cerca del agua..

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Observada en La Pampa.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Este de Bolivia, suroeste de Brasil y Argentina
.
CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

La Pampa
Citas: Güller (2008)

CORBATITA DE BOINA NEGRA *Sporophila pileata* (P. L. Sclater, 1865)




Otros nombres : Caboclinho. Corbatita boina negra. Corbatita brasilera. Corbatita de capucho. Corbatita de corona negra.

DESCRIPCIÓN
Largo: 10,5 cm.
Peso: Short (1971): N= 1 (M) 8,8 g; Darrieu y Camperi (1996): N= 18 (M) X: 8,4 g (Rango 7,6 a 9,5), N= 4 (H) X: 9,1 g (Rango 8,7 a 10)
Coloración. Pico y patas negruzcos. Iris pardo.
Macho. Corona, nuca, alas y cola negras. Dorsal parda. Ventral blanca ocrácea. Manchas alares blancas.
Hembra. Dorsal parda olivácea. Ventral ocrácea. Mancha alares blancas.

HÁBITAT
Pastizales.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Capuchón negro. Dorsal parda. Ventral blanca ocrácea.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sporophila pileata (P. L. Sclater, 1865) en Misiones y Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Extensa área que comprende: este de Bolivia, centro y sur de Brasil, este de Paraguay, Uruguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1996); Esteban (1953); Fraga (2001b) ; López-Lanús et al. (2013b); Short (1971)

Misiones
Citas: Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Dabbene (1915); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2008); Militello y Chebez (2009); Navas y Bó (1988); Zotta (1944a)

CAPUCHINO CANELA *Sporophila hypoxantha* Cabanis, 1851

Otros nombres: Capuchino colorado. Corbatita colorada. Corbatita rojiza. Chocolate. Dominó canela. Ladrillito. Paraguayito.

DESCRIPCIÓN
Largo: 11 cm.
Peso: Contreras (1979f): N= 1 (M) 8,9 g; Di Giacomo (2005h): N= 11 (M) X= 8,6 g (Rango 8,0 a 9,2), N= 6 (H) X= 9,0 g (Rango 8,5 a 9,7); Salvador (2014a): N= 5 (M) X= 8,2 g (Rango 8,1 a 8,4), N= 2 (H) 8,2 y 8,7g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 66 (M) X= 8,6 g (Rango 7,2 a 9,8), N= 58 (H) X= 8,4 g (Rango 7,2 a 10,7)
Coloración. Pico negruzco. Patas negruzcas o gris oscuro. Iris pardo oscuro.
Macho. Corona y dorsal grises plomizos. Rabadilla y ventral canelas. Alas grises parduscas con manchitas blancas. Cola gris pardusca.
Hembra. Dorsal parda olivácea. Ventral ocrácea. Alas y cola pardas. Cubiertas alares pardas orilladas de ocráceo.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario, en pareja o en grupos. Se alimenta de semillas, entre 0,50 y 2 m.

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Semillas de Maicillo (*Sorghum halepense*)
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:** Semilla*Echinochloa crusgalli,Elionurus muticus,Hymenachne amplexicaulis,Panicum bergii,Panicum prionitis,Paspalum hydrophylum,Paspalum intermedium,Paspalum plicatulum, Paspalum urvillei,Setaria parviflora, Sorghastrum pellitum.*
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010).
Vegetales: Semilla*Carduus* sp.,Gramíneas.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:**Semilla*Paspalum* sp.,*Setaria* sp.,*Sorghum halepense.*
De la Peña (2011a): **Vegetales:**Semilla*Chloris barbata,Phalaris angusta, Setaria parviflora*.



HÁBITAT
Pastizales en áreas rurales, praderas, sabanas, bañados.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Formosa, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N

El nido tiene forma de tacita, atado a yuyos. Emplea fibras vegetales, telas de arañas e internamente cerdas. Expuesto. Elaborado.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre octubre y marzo. Se estudiaron 390 nidos.
Di Giacomo et al. (2008). Se estudiaron aproximadamente 200 nidos entre los años 1995 y 2006.
De la Peña (2013c). Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, dos nidos: 22-12-1995, en un yuyo a 0,80 m del suelo, uno huevo y en Trébol blanco a 0,50 de altura, 3 huevos; Cayastá, dpto. Garay, Santa Fe, 02-02-1999, en Trébol blanco a 0,70 m de altura, sin postura.
Medidas: Diámetro total: 5 cm. Diámetro interno: 4,5 cm. Profundidad: 5 cm. Alto: 6 cm.



Esperanza.Santa Fe.22-12-1995


La Brava.Santa Fe.22-10-2008

Huevos
Pone 2 ó 3 huevos, ovoidales, blanquecinos con pintas pardas, grises y castañas.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 14,3 a 16,5 x 12,0 a 12,5 X= 15,4 x 12,5 (N= 4)
Di Giacomo (2005h): 14,3 a 18,5 x 11,0 a 13,3 X= 16,3 x 12,2 (N= 192)
De la Peña (2013c): 17,5 x 12,3 (N= 1)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 0,9 a 1,4 X= 1,1 (N= 192)



Generalidades
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 11 días. La pareja alimenta a los pichones y permanecen en el nido entre 9 y 10 días.

Otros
Areta en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

Depredación
Di Giacomo (2000b). De adulto (*Falco rufigularis).* Di Giacomo (2005h). De adulto (*Falco femoralis*)

Más información:
Di Giacomo (2005h). Areta y Repenning (2011a, 2011b)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: dorsal gris. Rabadilla y ventral canelas. Manchitas blancas en las alas.
Se diferencia del Capuchino castaño y del Capuchino de corona gris por ser más claro, y de este último además por tener dorso gris.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sporophila hypoxantha Cabanis, 1851 en Salta, Jujuy, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe, este de Córdoba y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se encuentra en el este de Bolivia, Paraguay, sureste de Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas:Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (1997b, 2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Ktapovicas et al. (1992); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pereyra(1927d, 1933, 1938a, 1938b); Pugnali y Chamorro (2006, 2008); Roda y Danti (2015)



Chaco
Citas: Herrera (1988)

Observaciones: De la Peña (Cerrito, dpto. Bermejo, 26-09-1972)

Córdoba
Citas:Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b) , Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Areta y Repenning (2011, "morfo uruguaya"); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1996); Giraudo et al. (2003, 2006); López-Lanús et al. (2013b); Salvador y Bodrati (2013a)

Entre Ríos
Citas: Areta y Repenning (2011, "morfo uruguaya"); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); La Grotteria (2013, 2015, "morfo uruguaya"); López-Lanús et al. (2013c); Ronchi Virgolini et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Areta y Repenning (2011, "morfo uruguaya"); Contreras (1987c); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Salvador y Di Giacomo (2014)

Jujuy
Citas:Camperi et al. (2013); Chebez etal. (1998); Höy (1969)

Misiones
Citas : Chebez (1996a);

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Höy (1969a); Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2005, 2009, 2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Manassero y Luna (2009)

Tucumán
Citas: Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014)

CAPUCHINO DE GARGANTA CAFÉ *Sporophila ruficollis* Cabanis, 1851

Otros nombres : Alemancito. Capuchino. Capuchino garganta café. Capuchino garganta negra. Capuchino negro. Chilenito. Corbatita castaña. Corbatita rojiza. Corbatita vientrirufa.

DESCRIPCIÓN
Largo: 11 cm.
Peso: Salvador (2014a): N= 10 (M) X= 8,3 g (Rango 8,1 a 8,7), N= 2 (H) 8,2 y 8,0 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (M) juvenil 11,0 g, N= 2 (M) 8,3 y 9,1 g, N= 1 (H) 8,4 g
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Macho. Corona, nuca y dorso grises. Garganta, regiones auriculares, lados del cuello, rabadilla y ventral castaños. Alas y cola negras. Manchas alares blancas.
Hembra. Dorsal parda olivácea. Ventral ocrácea.



COMPORTAMIENTO
Anda solo o en pareja. Emite un canto suave.
De la Peña (2006d). Se alimenta de semillas, recolecta entre los 0,50 y 2 m.

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Semillas de Cloris (*Chloris canterae*), Paja boba (*Paspalum urvillei*), Flechilla mansa (*Stipa hyalina*) y Alpistillo (*Phalaris angusta*).
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:** Semilla *Paspalum hydrophylum, Paspalum intermedium, Paspalum urvillei.*

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semilla *Carduus* sp*., Digitaria* sp*., Paspalum* sp., *Raphanus* sp*., Setaria* sp*., Sorghum halepense, Stipa* sp*.*
De la Peña (2011a). **Vegetales:** Semilla *Chloris barbata, Diplachne uninervia, Echinochloa helodes, Eriochlora punctata, Leptochloa chloridiformis, Panicum bergii, Panicum dilatatum, Setaria parviflora*



HÁBITAT
Sabanas, pastizales, cerca de ambientes acuáticos.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

El nido tiene forma de tacita, de fibras vegetales, liadas con telas de arañas. Atado a yuyos u otras plantas. Expuesto. Elaborado
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 5, desde el 13-01-1976 al 24-01-2003, todos en provincia de Santa Fe.
Medidas: Diámetro total: 6 cm. Diámetro interno: 4 cm. Profundidad: 4 cm. Alto: 5 cm.

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, blanquecinos con pintas y manchitas ocres, grises y negras, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 15,0 a 17,0 x 11,4 a 13,0 X= 16,0 x 12,5 (N= 5)
De la Peña (2013c): 15,6 a 16,4 x 11,8 a 12,1 X= 16,1 x 11,9 (N= 3)

Peso
De la Peña (2013c): cáscaras 0,068 a 0,076 X= 0,073 (N= 3)

PICHONES
Descripción.
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Plumón gris. Pico y patas grises.
8días
Escaso plumón. Láminas de las plumas primarias pardas con punta ocrácea.
Pecho rojizo. Flancos y lados del pecho ocráceo-rojizo.
Generalidades
De la Peña (2013c). Demora en construir el nido de 5 a 6 días. Período de incubación de 11-12 días. Los huevos son puestos en días corridos.Los pichones permanecen en el nido 12 días.



Elisa. 27-10-2015



Elisa. 27-10-2015



Esperanza. Santa Fe. 29-11-2014



Esperanza.Santa Fe.13-01-1976



Esperanza. Santa Fe. 29-11-2014

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Corona, nuca y espalda grises. Rabadilla y ventral castañas.
Diferenciarlo del Capuchino canela y del Capuchino de corona gris.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sporophila ruficollis Cabanis, 1851desde el norte del país hasta Tucumán, Santiago del Estero, este de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Areta et al. (2011); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (1997b, 2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pugnali y Chamorro (2008)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Vides Almonacid (1999)

Chaco
Citas: Moschione (2005a)

Córdoba
Citas:Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b); Salvador (1983); Salvador y Di Giacomo (2014); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Morteros, dpto. San Justo, 15-11-1990)

Corrientes
Citas: Areta et al. (2011); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Contreras y Contreras (1978); Darrieu y Camperi (1996); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2003b, 2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008); Short (1971)

Entre Ríos
Citas: Areta et al. (2011); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); Codesido y Fraga (2009); De la Peña (2012b); La Grotteria (2013); López-Lanús et al. (2013c); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Straneck (1990e)

Formosa
Citas:Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Narosky y Martelli (1995); Salvador y Di Giacomo (2014)

Jujuy
Citas: APN (2008); Camperi et al. (2013)

Misiones
Citas: Bodrati (2005d); Chebez (1996a)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Esteban (1953); Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: Areta et al. (2011); De la Peña (1981b, 2009, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Manassero y Luna (2009); Ordano y Bosisio (1997)

Santiago del Estero
Citas: Hartert y Venturi (1909)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996, 1998); Brandán y Navarro (2009); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014)

CAPUCHINO IBERÁ *Sporophila digiacomoi* López-Lanús, 2015 (*)




DESCRIPCIÓN
Largo: 10 cm.
Coloración.
Macho. Pico y patas negros. Iris pardo.
Frente y corona grises. Dorso y rabadilla marrón claro. Collar nucal y garganta negros.
Ventral crema pálido. Alas marrones con banda blanca. Cola marrón.
Hembra. Similar a la de otros capuchinos.

HÁBITAT
Pastizales altos anegados o anegables sobre suelos arenosos planos alrededor de esteros vegetados.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron pichones en Corrientes.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N									N	



Di Giacomo, A. S. en López-Lanús (2015). Estancia San Nicolás, dpto. San Miguel, Corrientes, febrero de 2011, observa una pareja alimentando a dos pichones volantones.

Di Giacomo, A. S. y C. Kopuchian, en López-Lanús (2015). Estancia San Nicolás, dpto. San Miguel, Corrientes, en noviembre de 2011, observaron una hembra visitando un nido en pastizal alto en el borde de un estero.

Más información:
López-Lanús (2015); Di Giacomo y Kopuchian (2016)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sporophila digiacomoi López-Lanús, 2015 en Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Argentina, Paraguay y Brasil.

(*). Di Giacomo y Kopuchian (2016). *Sporophila iberaensis*, sp. nov.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes
Citas: López-Lanús (2015); Di Giacomo y Kopuchian (2016)

CAPUCHINO DE PECHO BLANCO *Sporophila palustris* (W. B. Barrows, 1883)

Otros nombres: Corbata blanca. Corbatita de los bañados. Corbatita de pecho blanco. Capuchino blanco. Capuchino de garganta blanca. Capuchino de los pantanos. Capuchino garganta blanca. Capuchino palustre. Capuchino pecho blanco. Chilenito. Dominó pampa. Paraguayito.

DESCRIPCIÓN
Largo: 10 cm.
Peso: Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (M) 9,0 g
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo
Macho. Corona, nuca y dorsal grises plomizas. Regiones malares, garganta, lados del cuello y del pecho blancos. Resto de la parte ventral y rabadilla castaño. Alas y cola negras con las plumas orilladas de gris. Manchas alares blancas.
Hembra. Dorsal parda olivácea. Ventral ocrácea.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
M. Pearman en Collar et al. (1992). **Vegetales:**Semilla*Cortaderia selloana,Paspalum dilatatum.*
Di Giacomo (2005h).**Vegetales:**Semilla*Paspalum intermedium,Paspalum urvillei.*

HÁBITAT
Bañados.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Corona, nuca y dorso grises. Garganta y pecho,blancos. Rabadilla y abdomen castaños.
Diferenciarlo del Capuchino de collar.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sporophila palustris (W. B. Barrows, 1883) en Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y noreste de Buenos Aires.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Su área de reproducción está limitada a UruguayyArgentina. En invierno migra hacia el norte al este de Paraguay y sur de Brasil.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Darrieu y Camperi (2001a); Di Giacomoet al. (1991); Narosky y Di Giacomo (1993); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Chaco
Citas: Saibene (1985)

Corrientes
Citas: Areta y Perman (2009); Chatellenaz et al. (2010); Chebez et al. (1998); Codesido y Fraga (2009); Contreras (1987b); Giraudo et al. (2003b, 2006); Kraucuk y Di Giacomo(2005); López-Lanús et al. (2013b); Narosky (1983); Salvador y Di Giacomo (2014); Vizentín-Bugoni et al. (2013)

Entre Ríos
Citas: Areta y Perman (2009); Beltzer et al. (2006); Chebez et al. (1990); Ordano y Bosisio (1997); Ronchi Virgolini et al. (2008); Vizentín-Bugoni et al. (2013)

Formosa
Citas: Di Giacomo(2005h)

Misiones
Citas: Bodrati (2005d); Chebez y Casañas (2000); Chebez (1994, 1996ª)

Santa Fe
Citas: Areta y Perman (2009); Luna et al. (2005); Manassero y Luna (2009a)

CAPUCHINO CASTAÑO *Sporophila hypochroma* Todd, 1915

Otro nombre: Corbatita colorada.

DESCRIPCIÓN
Largo: 10 cm.
Peso: Short (1969): N= 1 (M) 9,4 g; Darrieu y Camperi (1996): N= 1 (M) 9,7 g
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo
Macho. Corona, nuca y dorso grises. Garganta, regiones auriculares, lados del cuello, rabadilla y ventral castaños. Alas y cola negras. Manchas alares blancas.
Hembra. Dorsal parda olivácea. Ventral ocrácea.



COMPORTAMIENTO

Alimentación
Di Giacomo (2005h).Semilla*Pennisetum nervosum.*

HÁBITAT
Pastizales.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

Semiesfera de fibras vegetales.

Roda y López Lanús (2007). Saladillo, pdo. Saladillo, Buenos Aires, 3 nidos: 19-12-1990, en construcción, 04-01-1991 con un pichón y el 12-12-1992, con 2 huevos.

Huevos
Medidas
Roda y López Lanús (2007): 16,2 x 11,7 y 16,2 x 12,1

Más información:
Roda y López Lanús (2007).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Corona, nuca y espalda grises. Rabadilla y ventral castañas.
Diferenciarlo del Capuchino canela y del Capuchino de corona gris.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sporophila hypochroma Todd, 1915 en Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe, norte de Entre Ríos. Observado además en Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en un área reducida de Argentina yParaguay. En invierno migra a Bolivia y suroeste de Brasil.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarkas et al. (2003); Bodrati et al. (1997b); Darrieu y Camperi (2001a); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y López Lanús (2007); Wege y Long (1995)



Chaco
Citas: Herrera (1988); Moschione (2005a)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1996); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2003b,2006); Heinonem y Sutton en Chebez (1994); López-Lanús et al. (2013b); Nores (1986a); Short(1969, 1971)

Entre Ríos
Citas: La Grotteria (2013); Ronchi Virgolini et al. (2008)

Formosa
Citas: Contreras (1993b.); Di Giacomo(2005h)

Misiones
Citas: Bodrati (2005d)

Santa Fe
Citas: Giraudo et al. (2008); López-Lanús et al. (2013a); Luna et al. (2011a); Manassero et al. (2006); Manassero y Luna (2009)

CAPUCHINO DE CORONA GRIS *Sporophila cinnamomea* (Lafresnaye, 1839)

Otros nombres: Capuchino canela. Capuchino colorado.Capuchino colorado corona gris. Capuchino corona gris. Chilenito. Corbatita canela. Corbatita castaña. Corbatita colorada. Paraguayito.

DESCRIPCIÓN
Largo: 10,5 cm.
Peso: Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 (M) 9,2 y 9,8 g, N= 1 (M) 8,9 g, N= 1 (H) 9,0 g
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo
Macho. Castaño. Corona gris plomiza. Alas y cola negruzcas. Manchas alares blancas.
Hembra. Dorsal parda olivácea. Ventral ocrácea.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Di Giacomo (2005h).**Vegetales:**Semilla*Hymenachne amplexicaulis,Paspalum intermedium,Paspalum urvillei.*

HÁBITAT
Pastizales, bañados.

NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en Corrientes, Entre Ríos.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	

Tacita de tajitas.

Zelich en Narosky (1977). Arroyo Perucho Verne, dpto. Colón, Entre Ríos, nido en 1967.
Uranga (*in litt.*). Colonia Carlos Pellegrini, dpto. San Martín, Corrientes, 10-11-2014, nido atado a un yuyo a 40 cm del suelo en un bañado, 2 huevos.



Huevos
Pone 2, base blanca con pintitas marrón oscuro, castañas, grisáceas y violáceas concentradas en el polo mayor.





Colonia Carlos Pellegrini. Corrientes. 10-11-2014 Fotos: Máximo Uranga

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Castaño con corona gris. Manchas alares blancas.
Se diferencia del Capuchino castaño por tener dorso castaño.
Diferenciarlo además del Capuchino canela.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sporophila cinnamomea (Lafresnaye, 1839) en Misiones, Corrientes, este de Formosa, Entre Ríos y este de Santa Fe. Observado además en Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica.Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. En invierno austral migra en dirección norte.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Bodrati et al. (1997b); Darrieu y Camperi (2001a); Pugnali y Chamorro (2008)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a)

Corrientes
Citas: Areta y Perman (2009); Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Chebez y Heinonen Fortabat (1987a); Contreras (1987b); Giraudo et al. (2003b, 2006); López-Lanús et al. (2013b); Salvador y Narosky (1987); Salvador y Di Giacomo (2014)



Entre Ríos
Citas: Areta y Perman (2009); Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); La Grotteria (2013); López-Lanús et al. (2013c); Marateo et al. (2009); Narosky (1973); Raffo et al. (2008); Salvador y Di Giacomo (2014)

Formosa
Citas: Di Giacomo(2005h)

Misiones
Citas: Bodrati (2005d); Chebez (1996a); Chebez et al. 1989 ; Chebez y Casañas (2000); Gil y Ciarmello (2005); Saibene et al. (1996)

Santa Fe
Citas: Luna et al. (2011a); Areta y Perman (2009)

CURIÓ *Sporophila angolensis* (Linnaeus, 1766)

Otros nombres: Arrocero. Arrocero castaño. Curié.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13 cm.
Peso: Short (1971): N= 1 (M) 12,5 g; Storer (1989): N= 2 (M) 12 y 14 g, N= 6 (H) X: 13,4 g (Rango 12,5 a 14)
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo
Macho. Negro. Parte inferior del pecho y resto de ventral castaños. Manchas alares y cubiertas internas blancas.
Hembra. Dorsal parda. Ventral parda acanelada. Alas y cola pardas. Cubiertas internas de las alas blancas.

HÁBITAT
Orillas de selvas, capueras.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Oniki y Willis(1983a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: negro con la parte inferior del pecho y resto de lo ventral castaño Hembra: parda.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sporophila angolensis angolensis (Linnaeus, 1766) en Misiones, norte de Corrientes y este de Formosa.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Amplia área de distribución que abarca desde Belice hasta Argentina. Comprende: Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Formosa
Citas:Gorleri et al. (2009); López Lanús (1997)

Corrientes
Citas: Contreras (1987b); Short (1971)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Dabbene (1910); Krauczuk (2008); Navas y Bó (1988); Straneck (1990h)

PIQUITODEORO COMÚN *Catamenia analis* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Corbatita azulada chica. Corbatita gris. Pico de oro chico. Piquito amarillo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13,5 cm.
Peso: Salvador (1990a): N= 1 (H) 11,54 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 43 (?) X: 11,25 g (Rango 9,5 a 15); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (M) 11,8 g
Coloración. Pico amarillento. Patas pardo grisáceas. Iris pardo.
Macho. Dorsal y ventral grises plomizas. Frente y lorum negros. Vientre blanquecino. Subcaudales castañas. Alas negras con las plumas orilladas de gris. Base de las primarias blancas. Cola negra con mancha blanca en la parte media.
Hembra. Dorsal parda grisácea estriada de oscuro. Ventralmente ocrácea, estriada de negruzco. Alas y cola pardas con manchas blancas menos notables que en el macho.

COMPORTAMIENTO
Anda sola o en pareja. Se alimenta de semillas. Busca comida en el suelo o a baja altura.



Alimentación
Pérez et al. (2006).**Vegetales:** Semilla *Agropyron* sp.
Salvador en De la peña y Salvador (2010).**Vegetales:** Semilla *Festuca* sp.
Fracchia y Aranda-Rickert (2015). **Vegetales:** Flor de *Ligaria cuneifolia*.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es un Cheyeyeyeyeyethh emitido esporádicamente.

HÁBITAT
Pastizales serranos, estepas altoandinas, pajonales arbustivos, quebradas, laderas de cerros. También matorrales chaqueños bajoserranos y periserranos.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Tucumán, Catamarca, Córdoba.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

El nido tiene forma de taza. Es construido con pajas, tallos de yuyos. Internamente fibras finas, raicillas, algunas cerdas.Expuesto. Elaborado.

Höy (1976a). Tres Cruces, dpto. Humahuaca, Jujuy, 12-02-1973, nido con 3 huevos.
Handford (1983). Tafí del Valle, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 04-12-1973, dos nidos con 2 huevos cada uno.
Salvador y Narosky (1984). Pampa de Achala, dpto. Punilla, Córdoba, nido a 35 del suelo en una mata de paja. Tenía un huevo huero y 2 pichones.
Salvador y Salvador (1988). Pampa de Achala, Córdoba, 13-01-1983, nido con 2 pichones y 1 huevo; 20-12-1987, nido con 2 pichones.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, Córdoba, se localizaron 2 nidos, 13-01-1983, un huevo y dos pichones; 20-12-1984, nido con 2 pichones.

De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 6 desde el 01-01-1999 al 18-12-1999 en Aconquija y El Alamito, dpto. Andalgalá, Catamarca. Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Medidas: Diámetro total: de 8,5 a 10 cm. Diámetro interno: de 4,5 a 5,5 cm. Profundidad: de 3,5 a 4 cm. Alto: de 6,5 a 8,5 cm.



El Alamito.Catamarca.18-12-1999 Parasitado por *Molothrus bonariensis*



El Alamito.Catamarca.18-12-1999

Huevos
Pone 4 ó 5 huevos, ovoidales, celeste con pintas castañas y grises, por toda la superficie pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Höy (1976a): 17,2 a 18,3 x 13,0 a 13,8
Salvador y Salvador (2012):18,7 x 13,7
De la Peña (2013c): 17,2 a 20 x 125 a 13,9 X = 18,5 x 13,3 (N= 13)

Pesos
Höy (1976a): cáscara 0,082
Salvador y Salvador (2012): 8,7, 9,5
De la Peña (2013c): cáscaras 0,110 a 0,120 X= 0,117 (N= 9)

PICHONES
Descripción
Salvador y Narosky (1984). Ojos abiertos. Pico amarillo, comisuras blanco amarillentas, interior de la boca roja. Patas rosadas. Piel rosa intenso con escaso plumón blancuzco y canutos negruzcos en el dorso, alas, cola y cabeza, además canutos claros en los flancos.

Observaciones
Salvador y Salvador (2012). La alimentación de los pichones estuvo a cargo por la pareja.

Otros
Haedo Rossi y Esteban (1972). Un ejemplar con Albinismo parcial.
De la Peña (2013c). Anfitrion de *Molothrus bonariensis*.



Más información:
De la Peña (2013c).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: pico amarillo. Plomizo con banda blanca en las alas y en la cola. Hembra: parda y ocrácea, estriada. La hembra se diferencia de la hembra del Yal platero por tener patas oscuras y manchas alares blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Catamenia analis analis (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837) entre los 2000 y los 3000 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza,San Luis, oeste de Córdoba y de Santiago del Estero y suroeste de Buenos Aires. Citada además para Entre Ríos y observada en el oeste de Río Negro y Neuquén.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Siete subespecies. Se distribuye a lo largo de los Andes por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamenia analis analis (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Buenos Aires
Citas: Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Holland (1983a, 1983b, 1923); Maugeri (2006); Narosky et al. (1984, 1990); Narosky y Di Giacomo (1993); Savigny (2003)


Catamarca
Citas: Alabarce et al. (1990); Alderete y Capllonch (2012); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); De la Peña (2001a, 2013c); Salvador (1990a); Vides Almonacid (1999); White (1882)

Córdoba
Citas: Heredia (2006); Miatello et al. (1993, 1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1981); Salvador y Narosky (1984); Salvadory Salvador (1988, 2012); Salvador y Di Giacomo (2014); Sferco y Nores (2003); Straneck (1990d); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Ascochinga, dpto. Colón, 20-01-1971; La Cumbre, dpto. Punilla, 20-01-1971; Cuchi Corral, dpto. Punilla, 20-01-2000)

Formosa
Citas: Esteban (1953)

Jujuy
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Budin (1931); Burgos et al. (2009); Campagnola et al. (2011); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Höy (1976a.)



La Pampa
Citas: Bonkewitzz (1990); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Güller (2008); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Pérez et al. (2006); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Veiga et al. (2005)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Fracchia y Aranda-Rickert (2015); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895)

San Luis
Citas:Bó (1965); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993).

Mendoza
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Darrieu y Segura (2015); Gómez (2006); Hartert y Venturi (1909); López de Casenave (2001); Lucero (2013f); Marone (1992a); Martínez et al. (1997a); Milesi et al. (2002); Pereyra (1927e, 1941, 1942); Reed (1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d)

Neuquén
Citas: Christie et al. (2004); Matarasso (2007)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2010); Kovacset al. (2005); Lambertucci et al. (2009); Llanos et al. (2011); Pérez et al. (2006)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (Cachi, 06-02-1977)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz y Murúa (1994)

Santa Fe
Cita antigüa. Fandiño (2014)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Alderete y Capllonch (2012); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011b, 2013c); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014)

PIQUITODEORO GRANDE *Catamenia inornata* (Lafresnaye, 1847)

Otros nombres: Corbatita azul. Corbatita azulada grande. Pico grueso. Pico de oro grande.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14,5 cm.
Peso: Salvador (1990a): N= (?) 17,1 g; Navas y Bó (2000): N= 9 (M) X: 16,7 g (Rango 15,6 a 18), N= 1 (H) 15,5 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 19 (?) X: 15,7 g (Rango 13 a 19)

Coloración. Pico salmón rosado. Patas rosadas. Iris pardo.
Macho. Dorsal gris plomiza, estriada de negro en la espalda. Ventral gris oscura. Subcaudales castañas. Alas y cola pardas oscuras.
Hembra. Parda estriada de oscuro en la espalda.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

HÁBITAT
Estepas y pastizales altoandinos y serranos.


NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Tucumán, Catamarca, Córdoba.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N

Semiesfera de pajitas, raicillas, hojas. Internamente fibras finas, cerdas o lanas.Oculto. Elaborado.

Salvador y Narosky (1983). Las Cuevas, dpto. Humahuaca, Jujuy, 28-02-1983, un nido con 3 huevos y 3 nidos con pichones.
Salvador (1992). Pampa de Achala, Córdoba, 19-12-1989, nido en un pajonal, oculto, a 60 cm del suelo, 4 huevos.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, Córdoba, se localizaron 5 nidos, entre noviembre y enero.
De la Peña (2013c). Las Estancias, dpto. Andalgalá, Catamarca, 07-02-2003, nido en unos yuyos grandes a 0,80 mdel suelo, 3 huevos.
Medidas: Diámetro total: de 10 a 13 cm. Diámetro interno: 5,5 cm. Profundidad: 3,3 cm. Alto: 6 cm.
Salvador (2015). El Infiernillo, dpto. Tafí del Valle, Jujuy, 04-12-1987, nido con 2 pichones. Azul Pampa, dpto. Huamhuaca, Jujuy, 19-02-1995, dos nidos con 4 huevos cada uno. Iturbe, dpto. Humahuaca, Jujuy, 20-02-1985, nido con 3 pichones. Coraya, dpto. Huamhuaca, Jujuy, 21-02-1995, nido con 3 huevos

Huevos
Pone 3 huevos celeste verdosos con pecas pardas y grises, en toda la superficie pero más abundantes en el polo mayor.



Medidas
Salvador y Narosky (1983): 18,5 a 20,1 x 13,5 a 14,1 X= 19,2 x 13,8 (N= 3)
Salvador (1992): 18,6 a 20,5 x 13,9 a 14,7 X= 19,7 x 14,2 (N= 4)
Salvador y Salvador (2012):18,6 a 20,4 x 13,8 a 14,8 X= 19,6 x 14,3 (N= 16)
De la Peña (2013c): 18 a 20 x 14,5 a 15 X= 19 x 14,6 (N= 3)
Salvador (2015): 18,9 a 20,2 x 14,1 a 14,9 X= 19,5 x 14,4 (N= 11)

Peso
Salvador y Narosky (1983): 1,7 a 2,0 X= 1,8 (N= 3)
Salvador y Salvador (2012):1,9 a 2,2 X= 2, 1 (N= 12)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,120 a 0,130 X= 0,126 (N= 3)
Salvador (2015): 2,1 a 2,3 X= 2,2 (N= 11)





Las Estancias.Catamarca.07-02-2003


Observaciones
Salvador y Salvador (2012). La alimentación de los pichones estuvo a cargo de la pareja.
Salvador y Salvador (1988). Pampa de Achala, Córdoba, 06-02-1982, pareja alimentando a un pichón que aún no volaba.

PICHONES
Descripción
Salvador y Salvador (2012). Los pichones nacen con los ojos cerrados. Piel color carne naranja, con escaso plumón dorsal gris pardusco oscuro. Pico amarillento, comisuras blancas y amarillentas, interior de la boca rojo.

Salvador y Narosky (1983). Piel naranja, casi desnudos, con escaso plumón largo de color grisáceo en la cabeza, dorso y alas. Pico amarillo fuerte, comisuras blancuzcas, interior de la boca rosado fuerte. Patas color de la piel. Ojos cerrados.

Peso
Salvador y Narosky (1983): 32, 2; 3,2 y 3,1

Más información en: Salvador y Narosky (1983).
IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: gris. Subcaudales castañas. Hembra: parda. Ambos con el pico anaranjado.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Catamenia inornata inornata (Lafresnaye, 1847) entre los 3500 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Río Negro; *Catamenia inornata cordobensis* Nores e Yzurieta, 1983 en Córdoba y San Luis.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cuatro subespecies. A lo largo de los Andes Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamenia inornata inornata (Lafresnaye, 1847)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); De la Peña (2013c); Hellmayr (1938); Nores (1995); Vides Almonacid (1999)

Observaciones: De la Peña (Andalgalá, dpto. Andalgalá, 08-02-1977; El Alamito, dpto. Andalgalá, 16-12-1999)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Campagno et al. (2011); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Hellmayr (1938); Salvadory Narosky (1983); Salvador (2015)

La Rioja
Citas: Campari et al. (2008); Di Giácomo et al. (2007); Nores (1995)

Mendoza
Citas: Calí et al. (2008); Darrieu y Segura (2015); Gigoux y Looser (1930); Martínez et al. (1997a); Navas y Bó (2000)

Neuquén
Citas:Contreras (1977b)

Río Negro
Citas: Contreras (1977b)

Salta
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Moschione et al. (2013); Nores (1995)

San Juan
Citas: Fava et al. (2012a); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i); Navas y Bó (2000); Nores (1995)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Moyano Wagner (2010); Capllonch et al. (2011b); Esteban (1953); Handford (1983); Lucero (1983); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c); Salvador (1990a, 2015)

Catamenia inornata cordobensis Nores e Yzurieta (1983)

Córdoba
Citas: Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1995, 1996); Nores e Yzurieta (1983); Ordano (1996); Salvador (1992); Salvadory Salvador (1988, 2012); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Pampa de Achala, dpto. San Alberto, 25-11-1990)

San Luis
Citas: Chebez et al. (1985); Nellar Romanella (1993)

AFRECHERO CANELA *Charitospiza eucosma* Oberholser, 1905



Otros nombres: Afrechero brasilero. Afrechero copetón chico. Minerito.

DESCRIPCIÓN
Largo: 11,5 cm.
Coloración. Pico gris azulado con culmen negro. Patas gris rosadas. Iris pardo.
Macho. Copete, corona, lorum, garganta, cuello anterior y centro del pecho, negros. Mejillas y región auricular blancas. Dorso gris. Lados e inferior del pecho y resto de la parte ventral canelas. Alas negras con margen interno de las remeras orillado de gris. Cubiertas alares menores grises. Mayores blanquecinas. Cola negra con blanco en la base de las plumas centrales.
Hembra. Hembra pardusca, más pálida. Sin negro en la cabeza y el pecho.

HÁBITAT
Áreas arbustivas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Copete, garganta y pecho negros. Auriculares y cubiertas alares blancas. Ventralmente canela.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Charitospiza eucosma Oberholser, 1905 en Misiones y Tucumán.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Brasil, Bolivia y Argentina

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas:Partridge (1961a)

Tucumán
Citas: Ortiz et al. (2013c)

CACHILO DE ANTIFAZ *Coryphaspiza melanotis* (Temminck, 1822)

Otros nombres: Cachilo de cara negra. Chingolo de cabeza negra. Orejita negra. Pajerito cabecinegro. Pajerito de cabeza negra.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13 cm.
Peso: Short (1971): N= 2 (M) 15,6 y 15,8 g
Coloración. Pico: maxila negra, mandíbula amarillenta. Patas rosadas. Iris pardo.
Macho. Cabeza negra. Cejas blancas. Dorso gris oliva estriado de pardo oscuro. Ventralmente blanco con tono ocráceo. Lados del pecho negros. Alas pardas con las primarias ribeteadas de amarillo. “Hombros” y

cubiertas internas de las alas amarillos. Cola con las plumas centrales grises, las externas negras con el tercio terminal de las láminas internas blanco.
Hembra. Cabeza y parte dorsal estriadas de pardo oscuro y ocráceo. Cejas ocráceas. Frente negruzca. Alas y cola como el macho.

HÁBITAT
Pastizales, pajonales.

NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Hartert y Venturi (1909). Villa Ocampo, dpto. Gral. Obligado. Santa Fe, 26-12-1905, nido construído con gramíneas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza negra. Cejas y parte ventral blancas. “Hombros” amarillos. Cola larga, graduada, con punta blanca.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Coryphaspiza melanotis (Temminck, 1822) en Misiones, Corrientes, este de Chaco y norte de Santa Fe.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Existen diferentes poblaciones separadas en Perú (Madre de Dios), norte de Bolivia (Beni y La Paz a Brasil (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais y São Paulo) y hacia el sur por el este de Paraguay (Itapúa, San Pedro y Canindeyú a Isla Yacyreta) y noreste de Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes
Citas: Contreras (1987b); Giraudo et al. (2003b, 2006); López-Lanús et al. (2013b); Short (1971)

Misiones
Citas:Krauczuk y Di Giacomo(2005); Narosky en Chebez (1996)

Santa Fe
Citas: Hartert y Venturi (1909); Ordano y Bosisio (1997)

BRASITA DE FUEGO *Coryphospingus cucullatus* (Statius Müller, 1776)

Otros nombres: Afrechero purpúreo. Ará-güirá. Brasita. Cachilo colorado. Chingolito colorado. Chingolito del monte. Chingolo real. Morterito. Pájaro de la luz. Rayito de sol. Rojito.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14 cm.

Peso: Fiora (1934): N= 8 X= 16,7 g (Rango 15,0 a 18,4); Contreras (1979f): N= 2 (M) 14,3 y 14,4 g; Di Giacomo (2005h): N= 1 (M) 13,5 g; N= 1 (H) 13,5 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 17 X= 13,9 g (Rango 11 a 18) (*rubescens*), Alderete y Capllonch (2012): N= 119 X= 14,3 g (Rango 10,5 a 24,5) (*fargoi*); Salvador (2014a): N= 8 (M) X= 14,9 g (Rango 13,8 a 15,8), N= 9 (H) X= 14,9 g (Rango 13,8 a 15,8)
Coloración. Pico negruzco con base de la mandíbula grisácea o córnea. Patas grises. Iris pardo.
Macho. Copete, rabadilla y parte ventral rojos. Anillos perioculares blancos. Dorso gris con tono rojizo. Alas pardas. Cola negruzca.
Hembra. Cabeza, parte dorsal y alas pardas. Rabadilla rojiza. Ventralmente rosado. Cola negruzca.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario, en pareja o en grupos, entre arbustos o en el suelo.
Inquieto. Tiene un canto suave y trinado.
Se alimenta desde el suelo hasta los 3 m. de semillas e insectos.

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Nabiza (*Brassica napus*), Mijo (*Panicum miliaceum*), Sorgo (*Sorghum caffrorum*), Maiz (*Zea mays*)
Foster (1990). **Vegetales:** Fruto *Allophylus edulis.*
Genise et al. (1993). **Vegetales:** Savia *Aspidosperma quebracho-blanco, Prosopis flexuosa.*
Ordano et al. (1999. **Vegetales:** Semillas. **Insectos:** Coleoptera (Hydrophilidae, Helochares sp.). Curculionidae. Hemiptera.
Alessio et al. (2005). **Vegetales:** Semilla Graminae *Polygonum* sp*.* **Insectos:** Coleptera (Carabidae, no identificado). Hymenoptera (Fomicidae). Lepidoptera (larvas). **Arácnidos:** Arachnida.
Di Giacomo (2005h). **Insectos:** Hormigas aladas (*Acromyrmex* sp.).
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semilla *Chenopodium* sp*.,* Gramíneas Semillas. **Insectos:** Coleoptera. Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas). Orthoptera (Tettigonidae).
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semilla *Sorghum halepense.*
De la Peña (2011a). **Vegetales:** Fruto *Morus alba.*
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es la repetición de una estrofa bisilábica: Tchirij . juíih .. tchirij . juíih ... tchirij . juíijh ..

HÁBITAT
Bosques, sabanas, selvas, matorrales.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Formosa, Misiones, Corrientes, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

El nido tiene forma de tacita o semiesfera, atado a ramitas o a tallos de enredaderas. Es construido con fibras vegetales, líquenes, nervaduras de hojas y telas de arañas. Internamente hojitas o fibras finas.Expuesto. Elaborado



Dinelli (1918b).Tucumán, nidifica.
Pereyra (1938b). Moreno, Buenos Aires, nido con huevos en diciembre.
Höy y Ottow (1964). Salta nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Masramón (1980). Nidifica en San Luis.
Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 3 nidos.
Fraga (2002). Misiones nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre octubre y febrero. Se hallaron 18 nidos.
Salvador y Bodrati (2011). San Pedro, dpto. San Pedro, Misiones, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Nacional Chaco, Chaco, Bodrati localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Bodrati (2014a). Vaquerías, dpto. Córdoba, J. Heredia en enero de 2013, localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Bodrati (2014a). San Pedro, dpto. Misiones, Bodrati en noviembre de 2007, localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 17, desde el 04-11-1976 a 23-11-2012, uno en Tartagal, dpto. Gral. San Martín, Salta, el resto en Santa Fe. Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Medidas: Diámetro total: de 6 a 7 cm. Diámetro interno: de 4,5 a 5 cm. Profundidad: de 2 a 4 cm. Alto: de 3 a 5 cm.
Altura: Nido más bajo: 1,00 m. Nido más alto: 3,20 m.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, 3 nidos con 3 huevos cada uno.

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 19,6 x 14,0
Dinelli (1918b): 19,5 x 15,0
Smyth (1928): 17,0 a 18,0 x 13,5 a 14,0
Di Giacomo (2005h): 17,5 a 20,7 x 13,4 a 14,8 X= 18,7 x 14,1 (N= 21)
De la Peña (2013c): 18,8 a 20 x 13,7 a 15,4 X= 19,1 x 14,3 (N= 11)
Pesos
Di Giacomo (2005h): 1,6 a 2,2 X= 1,8 (N= 18)
De la Peña (2013c): 1,8 a 2,0 X= 1,9 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,111 a 0,134 X= 0,126 (N= 11)



PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). Pico y comisura grises. Piel oscura. Escaso plumón gris.
Generalidades
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 12 a 13 días. Los pichones permanecen en el nido 12 ó 13 días.

De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido 6-7 días. Período de incubación 13-14 días.
Contreras (1990b). El pichón permanece en el nido 11 días.

Otros
Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Höy y Ottow (1964).Fraga (2002). Salvador y Bodrati (2011).De la Peña (2013c). Salvador y Bodrati (2014a).
Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

Más información:
Capllonch (2015)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: coloración general rojiza. Copete rojo. Región periocular y mandíbula blancas. Hembra más pálida.



Esperanza.Santa Fe.29-11-1976
Parasitado por *Molothrus bonariensis*



Esperanza.Santa Fe.24-09-2008



Esperanza.Santa Fe.29-11-1976



Jesús María.Córdoba.20-10-2011



Villa Roda.Santa Fe. 10-12-2012



Esperanza.Santa Fe.14-01-2008



Esperanza.Santa Fe.08-12-2007. Macho



Esperanza.Santa Fe.21-12-1998

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Coryphospingus cucullatus rubescens (Swainson, 1825) en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y norte de Buenos Aires y *Coryphospingus cucullatus fargoi* Brodkorb, 1938 desde el norte del país, al oeste de los ríos Paraguay y Paraná hasta Santa Fe, Córdoba, San Luis, Catamarca y La Rioja. Observado además en el oeste de Río Negro

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. Se encuentra en la región central de Sud América. Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, y Argentina. Además existen poblaciones aisladas en Ecuador, Perú, Guayanas y Brasil.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Coryphospingus cucullatus rubescens (Swainson, 1825)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2001, 2006b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey y Carrete (1999); Holland (1893b); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1977c); Lucero et al. (2011); Maugeri (2002a.); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Moschione (1989); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015)

Chaco
Citas: Alderet y Capllonch (2012); Bodrati y Pietrek (2000); Capllonch (2015); Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2004); Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a)Salvador y Bodrati (2014a)



Corrientes
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b, 1990b); Darrieu y Camperi (1996); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 18-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Zapata (1975)

La Pampa
Citas: Hérnandez en Darrieu et al. (2011a)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Krauczuk (2005, 2008); Martínez Gamba (2014); Salvador y Bodrati (2011, 2013a); Salvador y Bodrati (2014a)

Coryphospingus cucullatus fargoi Brodkorb, 1938

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Córdoba
Citas: Castellanos (1934); Dardanelli et al. (2006b); Dardanelli y Nores (2001); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)Salvador y Bodrati (2014a)

Observaciones: De la Peña (Marull, dpto. San Justo, 19-09-2002; Obispo Trejo, dpto. Río Primero, 19-09-2002; Jesús María, dpto. Colón, 10-12-2010)

Formosa
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Capllonch (2015); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Ordano et al. (1999); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Capllonch (2015); Chebez et al. (1998) ; Fiora (1934); Hellmayr (1938); Lucero(1982); Mazza et al. (1928); Moschione y Segovia (2005); Salvadori (1897)

La Rioja
Citas: Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1907, 1923); Hayward (1967)

Río Negro
Citas: Kovacset al. (2005)

Salta
Citas: Alabarce y Lucero (1977); Alderete y Capllonch (2012); Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Capllonch (2015); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); De la Peña (2013c); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b); White (1882)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b)

San Luis
Citas: Masramón (1979, 1983); Nellar Romanella (1993).

Santa Fe
Citas: Alessio et al. (2005); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Martinez Achenbach (1957); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Capllonch (2015); Codesido y Bilenca (2000); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991); Soria et al. (2010)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Alderete y Capllonch (2012); Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch (2015); Dinelli (1918); Echevarría et al. (2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Ortiz et al. (2011b, 2013c); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014)

CARDENAL AMARILLO *Gubernatrix cristata* (Vieillot, 1817)

Otros nombres: Cardenal. Cardenal de copete amarillo. Cardenal dorado. Copetudo amarillo. Crestudo amarillo. Guirá-tirí. Picogrueso crestudo amarillo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 20 cm.
Peso: Contreras y Davies (1980): N= 2 (H) X= 39, 9 g (Rango 36,9 a 43,0); Camperi (1992c): N= 3 (M) 42,0 , 42,0 y 42,5 g; N= 1 (H) 43,5 g; Darrieu y Camperi (1996): N= 1 (M) 46 g, N= 1 (H) 50,8 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (M) 44,0 g
Coloración. Pico negro, base de la mandíbula gris. Patas negras. Iris pardo.
Macho. Copete y garganta negros. Dorso oliváceo con estrías negruzcas. Cejas, regiones malares, lados del cuello y parte ventral amarillos. Alas pardas oscuras con las barbas externas orilladas de oliváceo. Borde de las alas y cubiertas internas amarillos. Cola con las plumas centrales negras, resto amarillos con el borde externo pardo.
Hembra. Copete pardo. Cejas amarillas. Auriculares, pecho y flancos grises. Dorso gris con estrías pardas oscuras. Garganta parda oscura bordeada de blanquecino. Abdomen amarillo. Alas pardas con ribetes ocráceos y amarillos. Borde y cubiertas internas amarillas. Cola igual a la del macho.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en pareja. Se posa en las ramas de árboles o en arbustos.
Se alimenta en el suelo o en árboles. Consume semillas, frutos, insectos

Tiene un canto agradable.




Alimentación
Zotta (1936). **Insectos:**Coleópteros.Hymenoptera (Formicidae).**Vegetales:**Semillas.Vegetales.**Otros:**Arena.
Martínez et al. (1975). **Insectos:**Coleoptera (Curculionidae).**Vegetales:**Geraneaceae (*Erodium* sp.)
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:***Geoffroea decorticans* (fruto).

HÁBITAT
Sabanas, montes, estepas arbustivas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Río Negro, San Luis, Córdoba, Corrientes, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



El nido es una semiesfera o taza de palitos. Internamente pajitas, musgos y cerdas. Sostenido en ramas.
Expuesto. Elaborado.

Castellanos (1934). Valle de los Reartes, dpto. Calamuchita, Córdoba, primavera de 1903, nido.

Masramón (1980). Nidifica en San Luis.
Azategui (1985). Establecimiento Chulumé, dpto. Calamuchita, Córdoba, 08-11-1980, nido con 2 huevos. Noviembre de 1982, 3 nidos.
Salvador en De la Peña (2010b). Viedma, dpto. Adolfo Alsina, Río Negro, 24-11-1995, nido con 3 huevos. Se hallaba en un área de monte con jarillal, a 2,2 m de altura en un *Geoffroea decorticans*, semiesfera de palitos, palitos e inflorescencias, por dentro forrado con finas pajitas y cerdas, de 14 cm de diámetro externo, 7 cm de diámetro interno, 13 cm de altura y 4,5 cm de profundidad.
Domínguez et al. (2013). Corrientes, 12 de 46 nidos estudiados estaban parasitados por *Molothrus bonariensis.*
De la Peña (2013c). La Gallareta, dpto. Vera. Santa Fe, 2 nidos: 17-11-1974, en Tala a 3 m de altura, con 2 pichones y 18-11-1974, en arbusto a 2,80 m de altura, 3 huevos.
Medidas: Diámetro total: 16 cm. Diámetro interno: 10 cm. Profundidad: 7 cm. Alto: 20 cm.
Domínguez et al. (2015). Establecimiento La Vertiente, dpto. Belgrano, San Luis. Diciembre de 2013, tres nidos con 2 y 3 huevos y sin postura.

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, celeste verdosos con pintas, manchitas y rayitas negras distribuidas por toda la superficie.

Medidas
Pereyra (1938b): 24,0 x 18,0

Azategui (1985): 20,1 a 22,1 x 16,0 a 19,2 X= 21,1 x 17,4 (N= 3)
Salvador en De la Peña (2010b): 23,1 a 23,7 x 17,1 a 17,9 X= 23,3 x 17,4 (N= 3)
De la Peña (2013c). 25,2 a 25,9 x 18,2 a 18,7 X= 25,5 x 18,2 (N= 3)

Peso
Salvador en De la Peña (2010b): 3,7 a 3,9 X= 3,8 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,245 a 0,266 X= 0,257 (N= 3)



La Gallareta.Santa Fe.18-11-1974



La Gallareta. Santa Fe. 18-09-1971

Otros
Domínguez et al. (2013). Anfitrión de *Molothrus bonariensis* y víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

Hibridación
Se produce hibridación con Diuca común (*Diuca diuca*) en áreas de La Pampa, sur de Buenos Aires y este de Río Negro. Bertonatti y L. Guerra (1997, 2001), Pessino et al. (2002), Pessino (2006)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: amarillo con copete y garganta negros. Cola amarilla con las plumas centrales negras. Hembra: copete y garganta pardos. Pecho gris.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Gubernatrix cristata (Vieillot, 1817) en Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, sur de Buenos Aires, Río Negro. Observado además en Salta, Tucumán, oeste de Chubut y de Santa Cruz.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Sur de Brasil, Uruguay yArgentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Camperi (1992c); Darrieu y Camperi (2001a); Hartert y Venturi (1909); Leveau y Leveau (2004); Narosky et al. (1990); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Roda y Danti (2015); Zapata (1998)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chubut
Citas: Rubio (2003)

Córdoba
Citas:Azategui (1985); Castellanos (1934); Miatello et al. (1991, 1994); Nores et al. (1983); Nores (1996); White (1883b); Yzurieta (1995)

Observaciones: Salvador, S. (Villa María, posiblemente escapada de cautiverio)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1996); Giraudo et al. (2003b, 2006); Marelli (1918)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Camperi (1992); Canavelli et al. (2004); Chebez (2005); Chebez et al. (1990); De la Peña (2012b); Frucella y Bosso (2005); Serié y Smyth (1923)



La Pampa
Citas: Bonkewitzz (1990); Chebez et al. (1998); Coconier (2005); Contreras y Davies (1980); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005); Maceda et al. (2001); Pereyra (1923a); Pessino (2006); Pessino et al. (2002); Pessino y Tittarelli (2006); Salvador y Di Giacomo (2014); Siegenthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Veiga et al. (2009); Wetmore (1926b)

La Rioja
Citas: Di Giácomo et al. (2007); Hayward (1967); Moschione (2005)

Mendoza
Citas: Pescetti (2005); Sosa et al. (2011)

Neuquén
Citas: Del Valle et al. (1989, 1994) en Veiga et al (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas:Christie et al. (2004); Gelain y Tolosa (2011); Lambertucci et al. (2009); Paz Barreto (1997b); Pérezy Petracci (1998); Seewald y Pérez (2009)

Salta
Citas: Höy (1969a)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Haene (1987); Herrera et al. (2013)

San Luis
Citas: Casares (1944); Chebez et al. (1998); Di Giacomo(2005h); Domínguez et al. (2015); Masramón (1979, 1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: González Acuña et al. (2007)

Santa Fe
Citas: De la Peña (1981a, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002a); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Vides Almonacid (2001)

MIELERO *Coereba flaveola* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Bananero. Cambacica. Saí amarillo. Saí mielero. Temtem.

DESCRIPCIÓN
Largo: 11 cm.
Peso: Darrieu y Camperi (1988): N= 2 (M) 11,1 y 12 g, N= 2 (H) 9,7 y 10,5 g;
Coloración. Pico negro.
Dorsal, alas y cola grises oscuras. Rabadilla amarilla con tono oliva. Cejas y subcaudales blancas. Garganta gris. Resto de la parte ventral amarillo.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

HÁBITAT
Estrato medio en selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Oniki y Willis (1983)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico curvo. Largas cejas blancas. Garganta gris. Ventral amarilla.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Coereba flaveola chloropyga (Cabanis, 1850) en Misiones y noreste de Corrientes. Citada en Jujuy y Salta.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuarenta y una subespecies. Posee un rango de distribución muy extenso, en islas del Caribe, Centro América desde Honduras y Sudaméricahasta Argentina. Comprende: Cuba, Jamaica, Bahamas, Barbados, Puerto Rico, Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Haití, República Dominicana, Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Coereba flaveola chloropyga (Cabanis, 1850)



Corrientes
Citas: Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1988); Giraudo et al. (2006)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009)

Misiones
Citas: Bertoni (1913); Bodrati et al. (2010, 2012b); Castelino (1986); Dabbene (1914); Krauczuk (2005, 2008); Martínez Gamba (2014); Militello y Chebez (2009); Navas y Bó (1988); Straneck (1990g)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 08-02-1973)

Salta
Citas:Moschione et al. (2013)

ESPIGUERO PARDO *Tiaris obscurus* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Corbatita pardo. Corbatita semillera. Semillero. Tordillo pardo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 10,5 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 1 (H) 12,0 g, N= 3 (M) 10,0, 11,0 y 12,0 g, N= 1 (?) 11,0 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 11 (?) X: 10 g (Rango 8,0 a 11); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 9,7 g
Coloración. Pico pardo con base de la mandíbula amarillenta. Patas parduscas. Iris pardo.
Dorsal parda. Garganta, pecho y flancos grises parduscos. Abdomen blanquecino. Alas y cola pardas oscuras.

COMPORTAMIENTO

Se alimenta de semillas y de frutos.

Alimentación
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:** Semilla*Panicum bergii.*
De la Peña (2010).**Vegetales:** Semilla*Tillandsia recurvada.*

HÁBITAT
Sabanas, montes, bosques, orillas de selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N



El nido es globular, redondeado, sostenido en ramas de arbustos. Boca redonda, en la parte superior y lateral con pequeño alero. Emplea fibras vegetales.Expuesto. Elaborado.

Höy (1976a). Orán, dpto. dpto. Orán, Salta, Contino durante varios años localizó 61 nidos, de los cuales 58 estsban cerca de avisperos. Höy, en 1972 localizó 2 nidos cerca de avisperos.En 1973, 15 nidos estaban en Ortiguillas, planta espinosa de la región.
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 19, desde 25-10-1973 a 02-12-2004, 3 en Salta y el resto en provincia de Santa Fe. Dos nidos de San Ramón de la Nueva Orán fueron localizados por G. Höy. De los 17 nidos restantes, uno estaba en una Ortiguilla (Tartagal, Salta), 14 cerca de avisperos y los otros 2 en un Tala y en un Cardo.
Medidas: Alto: de 11 a 16 cm. Ancho: de 7 a 10 cm. Distancia antero-posterior: de 9 a 11 cm. Diámetro de la boca: de 4 a 5 cm. Profundidad de la cámara: 4 cm.
Un nido del 01-02-2004 en Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, estaba construido con pajas de: *Deyeuxia viridiflavescens, Piptochactium lasianthum, Setaria parviflora, Eragrostis virescens, Chaetotropis elongata, Bothriochoa laguroides, Chloris ciliata, Chloris* sp*., Panicum* sp.y *Panicum bergii.*



Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, blancos o blanquecinos con pintas marrones o castañas, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas
De la Peña (2013c): 16,5 x 19,6 x 12 a 13,7 X= 18,0 x 12,7 (N= 15)

Peso
De la Peña (2013c): 1,2 a 1,4 X= 1,3 (N= 4)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,077 a 0,093 X= 0,082 (N= 7)



Esperanza.Santa Fe.03-12-2004



Esperanza.Santa Fe.21-12-2004



Esperanza. Santa Fe. 28-12-2004



La Camila. Santa Fe. 02-12-1997

PICHONES

Descripción

Los pichones nacen con los ojos cerrados. Escaso plumón gris en la cabeza y dorsalmente. Comisura amarillenta.

Peso al nacer

De la Peña (2013c): 1,3

Generalidades

De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 15 a 20 días. Pone los huevos en días corridos. Período de incubación de 12 a 13. Permanencia de los pichones en el nido 12 a 13 días.

Más información:
Höy (1976a).De la Peña (2013c).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración general parda. Se parece a una hembra del género *Sporophila.*

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Tiaris obscurus obscurus (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837) en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Por el oeste, toda Sud América llegando hastaArgentina. Comprende: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Tiaris obscurus obscurus (Orbigny & Lafresnaye, 1837)

Buenos Aires
Citas: Mérida y Bodrati (2006); Pereyra (1938b)

Chaco
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Bodrati y Pietrek (2000); Moschione y Bishels (2005)

Formosa
Citas: Capllonch et al. (2015); Di Giacomo(2005h); Nores et al. (1996)

Jujuy
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Capllonch et al. (2015); Chebez et al. (1998); Contino (1968); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988); Salvador y Di Giacomo (2014)



Salta
Citas: Coconier et al. (2007); De la Peña (1981b, 2005); Höy (1976a); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b); Salvador (1988)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2001c, 2011f, 2013c)

Santiago del Estero
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Capllonch et al. (2015); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011b, 2013c); Ortiz y Aráoz (2014)

ESPIGUERO NEGRO *Tiaris fuliginosus* (Wied-Neuwied, 1830)

DESCRIPCIÓN
Largo: 12 cm.
Peso: Mazar Barnett y Herrera (1996): N= 1 (M) 10,5 g, N= 1 (H) 11 g; Rising (2011): 11-16 g
Coloración. Pico, patas e iris pardos.
Macho. Negro pardusco.
Hembra. Pardo olivácea. Ventralmente más clara.

HÁBITAT
Bordes de bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: negruzco uniforme. Hembra: parda olivácea.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Tiaris fuliginosus fuliginosus (Wied-Neuwied, 1830) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Distribución en varias áreas separadasde Sud América. Comprende: Colombia, Venezuela, Trinidad Tobago, Guyana, Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas:Areta y Bodrati (2008b); Mazar Barnett y Herrera (1996); Straneck (1990g)

CHINGOLO, CACHILOS, CERQUEROS

FAMILIA: EMBERIZIDAE

Aves de pico corto y fuerte o cónico.

Se alimentan de frutas, semillas, hojas, flores, granos, larvas, arácnidos, insectos.

Nidifican en los árboles, arbustos, pajonales, matorrales o en el suelo.

Ponen hasta 3 a 4 huevos.

Frecuentan praderas, arboledas, montes, bañados, pajonales.

CHINGOLO *Zonotrichia capensis* (Statius Müller, 1776)

Otros nombres: Afrecherito. Afrechero. Bitiche. Cachilito. Cachilo. Curandero. Chincol. Chingolo afrechero. Chuschiú. Engrillao. Guitarrita de campo. Icacú. Icanco. Joyerito. Manimbé. Pájaro payador. Pichurro. Tico-tico. Tres pesos. Vichí. Viento sur.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 9 X= 24,3 g (Rango 20,5 a 28,0); Humphrey et al. (1970): N= 2 (H) 19,2 y 24,5 g; Contreras (1975): N= 50 (?) X= 22,1 g (Rango 18,7 a 27,6); Contreras (1979f): N= 3 (M) 22,5, 22,5 y 22,2 g, N= 1 (H) 19,5 g; Salvador (1988): N= 2 (?) 23,0 y 24,0 g, N= 3 (?) X= 20,6 g (Rango 20,5 a 21,0); Navas y Bó (1990): N= 3 (M) X= 21,7 g (Rango 20,5 a22,6); N= 3 (H) X= 20,5 g (Rango 19,7 a 21,5) (*australis*); Camperi (1992a): N= 1 (M) 23,6 g (*hypoleuca*) Camperi (1992c): N= 4 (M) X= 19,2 g (Rango 18,9 a 20,0); N= 3 (H) X= 19,0 g; Darrieu y Camperi (1996): N= 6 (M) X= 20,6 g (Rango 19,3 a 22,0) (*subtorquata*), N= 1 (H) 19,2 g; Blendinger (1999): 18,2 g; Christie et al. (2004): N= 1 (M) 22,0 g, N= 7 (?) 22,7 g (Rango 18,0 a 26,0); Di Giacomo (2005h): N= 3 X= 17,9 g (Rango 17,7 a 18,0); Alderete y Capllonch (2012): N= 74 X= 18,7 g (Rango 16 a 25) (*choraules*), Alderete y Capllonch (2012): N= 30 X= 26,2 g (Rango 24 a 34) (*pulacayensis*), Alderete y Capllonch (2012): N= 112 X= 18,7 g (Rango 16 a 22) (*samborni*), Alderete y Capllonch (2012): N= 276 X= 19,6 g (Rango 15 a 26) (*hypoleuca*); Salvador (2014a): N= 3 (?) X= 20,2 g (Rango 19,3 a 20,6) (*australis*); N= 35 (?) X= 20,3 g (Rango 18,0 a 22,3) (*hypoleuca*)
Coloración. Pico córneo grisáceo o azulado con culmen más oscuro. Patas córneo rosado. Iris pardo o pardo rojizo.
Corona y cara grises. Lados de la corona negros. Collar nucal castaño. Dorsal parda estriada de pardo oscuro. Garganta blanquecina. Lados del pecho negros. Ventralmente blanquecino con los flancos pardo grisáceos. Alas pardas oscuras. Las secundarias con las barbas externas ocráceas. Las cubiertas alares con manchas blanquecinas. Cola parda oscura.
Presenta diferente color en la cabeza según las razas.
El **juvenil** es ventralmente jaspeado de negro.

COMPORTAMIENTO
Solitario, en pareja o en pequeños grupos. Terrícola, entre pastos o en arbustos.
Se alimenta en el suelo, estrato herbáceo, ramas y follaje, hasta los 4 m. Ingiere semillas, frutos, migas de pan, harina de maíz.

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Fruto *Ficus carica*.

Dupuy (*in litt*.).**Vegetales:**Brotede *Beta vulgaris*.
De la Peña (Inéd.).**Vegetales:** Fruto*Ficus carica*.
Marelli (1919).**Vegetales:**Semilla, vegetales.
Aravena (1928).**Vegetales:**Semillas. **Insectos:** Coleópteros (Curculiónidos, Crisomélidos). Hormigas.
Zotta (1932). **Vegetales:**Semilla.
Zotta (1936g).**Vegetales:**Semilla. **Insectos:**Coleópteros (Curculiónidos). Hemípteros. Orthópteros.
Zotta (1940c). **Insectos:**Coleópteros (Curculiónidos, Crisomélidos).
Olrog (1956a).**Vegetales:**Semillas.
Reynolds en Humphrey et al. (1970).**Vegetales:**Semillas.
Martínez et al. (1975). **Vegetales:***Carduus pycnocephalus*, Leguminosae. **Insectos:**Hymenoptera (Formicidae).
Grigera (1976). **Vegetales:**Semilla*Plantago* sp.,*Polygonum* sp.**Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae). Diptera (Bibionidae). Diptera (larvas).
Grigera (1982).**Vegetales:**Semilla.**Insectos.**
Baliño (1984).**Vegetales:**Frutode *Melia azedarach*.
Klimaitis (1993).**Vegetales:** Semillas. **Insectos. Otros:**Piedritas.
Montaldo (1993a).**Vegetales:**Fruto*Ligustrum* sp.
Roitman et al. (1997).**Vegetales:**Pétalos de *Myrrhinium atropurpureum*.
Haro (1998). **Insectos:**Coleoptera (Curculionidae). Homoptera (Cercopidae). Hymenoptera (Formicidae: *Solenopsissacvissima*).
Ordano et al. (1999). **Insectos:**Coleoptera (Dytiscidae, Curculionidae). Coleoptera (Escabaeidae, Hydrophilidae). Hemiptera. Hymenoptera (Formicidae, *Camponotus* sp.).Hymenoptera (*Pheidole* sp.*, Acromyrmex* sp.). Lepidoptera (Larva). Orthoptera.
Blendinger (1999). **Vegetales:**Savia*Prosopis flexuosa*.
De la Peña y Pensiero (2003).**Vegetales:**Semillas de *Chenopodium album, Chloris virgata, Eleusine tristachya, Hyptis mutabilis,Morus alba,Schkuria pinnata* var. *pinnat*a,*Sida spinosa* var. *spinosa*.
Alessio et al. (2005). **Insectos:**Coleoptera (Carabidae, Dytiscidae). Hymenoptera (Formicidae: *Acromymex* sp.*, Atta* sp.*, Camponotus* sp.*, Pheidole* sp.). Orthoptera (*cornops aquaticum*). (Paulinidae: *Paulinia* sp.).**Vegetales:**Semillas, Graminae.
Haene et al. (2007).**Vegetales:** Fruto *Berberis buxifolia*.
Marone et al. (2008).**Vegetales:** Semillas de*Aristida mendozina*, *Neobouteloua lophostachya,Chenopodium papulosum,Digitaria californica*,*Diphachne dubia*, *Glandularia mendocina*, *Heliotropium mendozinun, Pappophorum* sp.,*Parthenium hysterophorus*,*Setaria leucopila, Sphaeralcea miniata,Sporobolus cryptandrus, Trichloris crinite.*
Salvador en De la Peña y Salvador (2010).**Vegetales:**Semilla*Panicum maximun*.**Insectos:**Isoptera (termitas aladas).
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:**Semilla *Amaranthus* sp*., Brassica* sp.*,Chenopodium* sp. Gramíneas *Panicum mileaceum.***Insectos:**Coleoptera (Chrysomelidae, no identificado). Hemiptera. **Otros:**Arena.
De la Peña (2011a).**Vegetales:** Flor *Anredera cordifolia.*Hojas de *Beta vulgaris, Lactuca sativa,Lycopersicon esculentum*. Semillas de *Amaranthus quitensis, Chenopodium album*,*Chloris virgata, Eleusine tristachya, Eupatorio inulifolium, Glycine max,Hyptis mutabilis,Panicum prionitis,Schkuria pinnata* var. *pinnat*a,*Sida spinosa* var. *spinosa, Zea mays*.Fruto*Ligustrum lucidum,Lycium cestroides, Morus alba.* **Insectos:** orugas.**Otros:** pan.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es variable, incluso lo hace de noche. Es bastante simple y varía según las razas y dialectos regionales. El más común es un trisilábico: Tiu . ti . tiu finalizado con un trino tirrrrrrh.
Solamente la raza de la Patagonia hace silbos sin trino: Sie . sie . sií . sihh.

HÁBITAT
Praderas, estepas, bosques, orillas de selvas, sabanas, parques, jardines, serranías, poblaciones.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, Córdoba, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires,Neuquén, Santa Cruz.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N						N	N	N	N



El nido tiene forma de tacita o semiesfera, de pajitas o de cerdas. Internamente pelos, raicillas, cerdas y a veces algunas plumitas. Lo ubica en el suelo, en cercos, huecos en barrancas de tierra, enredaderas, plantas, nidos semidestruidos.
Semioculto. Elaborado.

Hudson (1870). Buenos Aires parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Gibson (1880a). Cabo San Antonio, pdo de la Costa, Buenos Aires. Posturas setiembre a enero. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Barrows (1883). Entre Ríos Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Reed (1913). Mendoza Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Miller (1917). Salta, Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Goodall (1923). Córdoba-San Luis Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, nidifica.
Dinelli (1924). Tucumán, nidos en el suelo, en arbustos densos, cuevas y huecos.Es parasitado por *Molothrus bonariensis*
Smyth (1928). Es parasitado por *Molothrus bonariensis*
Renard (1933). Puerto Belgrano, pdo. Coronel de Marina Leonardo Rosales, Buenos Aires Noviembre y diciembre de 1932, dos nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.* Un nido tenía un huevo propio y 6 huevos de la especie parásita.
Castellanos (1934). Córdoba.Es parasitado por *Molothrus bonariensis*
Pereyra (1938b). Noreste de la provincia de Buenos Aires, nidifica.
Olrog (1950). Archipiélago del Cabo de Hornos, huevos y pichones desde mediados de noviembre.
Pereyra (1951). Loreto, dpto. Candelaria, Misiones, 15 de noviembre, dos nidos con un huevo cada uno.
Masramón (1962). San Luis, nido con 3 huevos.
Zapata y Cabrera (1969). Atalaya, pdo. Magdalena, Buenos Aires, 05-11-1967 nido con 3 huevos.
King (1973). Tucumán parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Fraga (1978). Buenos Airesparasitado por *Molothrus bonariensis*
Fraga (1983). Buenos Airesparasitado por *Molothrus bonariensis*
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre noviembre y enero.
Contreras (1980o). Gustavo Andrés, dpto. Lavalle, Mendoza, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Handford (1983). Tafí del Valle, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, nidos en noviembre y marzo.
Salvador (1983b). Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 1979 a 1983, el 36,4% (8 de 22) de los nidos estaban parasitados por *Molothrus bonariensis*.
Fraga (1983c). Estancia La Candelaria, pdo. Lobos, Buenos Aires, entre setiembre de 1970 y noviembre de 1979, se hallaron 70 nidos. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Salvador (1984). Rosario de la Frontera, dpto. Rosario de la Frontera, Salta,22-02-1983, un huevo y un pichón propios y 2 pichones de *Molothrus bonariensis*; Tafí del Valle, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 20-12-1983, 3 huevos propios y 1 de *Molothrus bonariensis.*



Mason (1986). Buenos Aires parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Salvador (1988). Pampa de Achala, Córdoba, 20-12-1986, nido con 3 huevos; 21-12-1986, 2 nidos con 3 pichones; 20-12-1987, 2 nidos con 3 huevos.
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando.Parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Carman (1989b). Atalaya, pdo. Magdalena, Buenos Aires, 07-12-1983, nido con 3 pichones; 02-12-1986, 01-01-1987, 3 huevos; 3 huevos 12-11-1988, 3 huevos; 07-01-1989, 3 huevos; Salvador, Villa María, dpto. Gral. San Martín, 12-11-1979, 3 huevos; 07-01-1981, nido con 3 huevos; 17-10-1981, 2 huevos; Monte Yucat, dpto. Gral. San Martín, 29-01-1982, 3 huevos; Sierras de Guasayán, Santiago del Estero, 25-11-1981, 3 huevos y nido con 3 pichones; Escobar, pdo. Escobar, Buenos Aires, 05-10-1986, 3 pichones; Salvador y Narosky, 03-03-1989, Las Cuevas, dpto. Humahuaca, Jujuy, 3 pichones; Rosario de la Frontera, dpto. Rosario de la Frontera, Salta, 22-02-1983, nido con un pichón y 2 de *Molothrusbonariensis*; El Infiernillo, Tucumán, 20-01-1983, 2 huevos; Tafí del Valle, dpto. Rafí del valle, Tucumán, 20-12-1983, 3 huevos y uno de *Molothrusbonariensis*; Di Giacomo, Salto, pdo. Salto, Buenos Aires, 20-01-1985, 3 huevos; 27-11-1986, 2 pichones y un huevo; 18-11-1983, 2 huevos y 2 de *Molothrusbonariensis*; Mosteirín, Martínez, pdo. San Isidro, Buenos Aires 26-01-1987, 4 huevos.
Masramón (1980). Nidifica en San Luis.
Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 19 nidos.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Maceda et al. (2001). La Pampa, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Mezquida y Marone (2001). Reserva Ñacuñán, Mendoza.Nidifica.
Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nidos en noviembre y diciembre.
Pautasso (2002b).Reserva Urbana de la Ciudad Universitaria UNL "El Pozo", dpto. La Capital, Santa Fe, 17-12-1999 a 16-11-2000, 4 nidos. Uno de los nidos tenía un huevo de *Molothrus bonariensis*.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 7 nidos en octubre y enero. Un nido estaba parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Mezquida (2003). Reserva de Ñacuñán, dpto. Santa Rosa, Mendoza, observaciones en el período reproductivo desde 1995 a 1999, se localizaron nidos entre octubre y enero.
Christie et al. (2004). Nidos en octubre.
Albrieu et al. (2004). Estuario del río Gallegos, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, nidifica entre setiembre y febrero.
Di Giacomo (2005h).Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre setiembre y enero. Se estudiaron 20 nidos.
Fernández y Duré Ruiz(2007). Buenos Aires, parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Cozzani y Zalba (2009). Buenos Aires, parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Bodrati (2011). San Pedro, dpto. San Pedro, Misiones, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, Córdoba, se localizaron 21 nidos, entre octubre y enero.
Salvador (2012f). Chubut, parasitado por *Molothrus bonariensis.*
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 50,desde el 12-10-1970 al 16-12-2012, 4 en Córdoba, 2 en Entre Ríos y los restantes en Santa Fe.
Medidas: Diámetro total: de 8 a 13 cm. Diámetro interno: de 5 a 6 cm. Profundidad: de 3 a 4 cm. Alto: de 5,5 a 8,5 cm.
Altura: Nido más bajo: en el suelo. Nido más alto: 5,40 m



Salvador y Bodrati (2014a). Reserva El Bagual, Formosa, A. Di Giacomo, localizó nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Provincial Pampa del Indio y Parque Nacional Chaco, Chaco, Bodrati localizó nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*
Salvador (2015). Aparzo, dpto. Humahuaca, Jujuy, 22-02-1995, nido con 2 huevos.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", 6 nidos con 3, 3,3, 3, 2 y 2 huevos cada uno.
Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 6 nidos. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, verdosos con pintas castañas y grises distribuidas por toda la superficie.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 16,5 a 22,5 x14,0 a 16,0
Serié y Smyth (1923): 18,0 a 22,0 x 16,0 a 17,0
Dinelli (1924): 19,5 x 15,0 y 18,0 x 14,0
Smyth (1928): 18,0 a 21,0 x 15,0 a 15,5
Zapata y Cabrera (1969): 19,3 a 20,0 x 15,1 a 15,3 X= 19,6 x 15,2 (N= 3)
Fraga (1983c): X= 19,0 x 14,7 (N= 49)
Salvador y Salvador (1988): 19,6 a 20,6 x 15,4 a 15,7 X= 20,1 x 15,5 (N= 6)
Mezquida (2003): X= 18,6 x 14,4 (N= 19)
Di Giacomo (2005h): 17,8 a 21,1 x 14,3 a 15,7 X= 19,2 x 15,1 (N= 20)
Salvador y Salvador (2012):19,3 a 21,6 x 14,4 a 16,7 X= 20,2 x 15,9 (N= 24)
De la Peña (2013c): 18,7 a 21,4 x 14,6 a 16,6 X= 20,2 x 15,3 (N= 13)
Salvador (2015): 23,9 x 16,3 y 23,4 x 16,1

Peso
Salvador y Salvador (1988): 2,6
Mezquida (2003): X= 2,1 (N= 15)
Di Giacomo (2005h): 1,8 a 2,6 X= 2,2 (N= 18)
Salvador y Salvador (2012):2,2 a 2,8 X= 2, 4 (N= 19)
De la Peña (2013c): 0,116 a 0,151 X= 0,127 (N= 13)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,128 a 0,135 X= 0,130 (N= 8)
Salvador (2015): 3,3 y 3,2

PICHONES
Descripción
Salvador y Salvador (2012). Los pichones nacen con los ojos cerrados. Piel color carne naranja, con escaso plumón dorsal gris oscuro. Pico pardo muy claro, comisuras blancas y amarillentas, interior de la boca rojo.
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel verdosa. Plumón fino gris. Comisura blanquecina-amarillenta. Cavidad bucal, paladar y lengua, rosado fuerte (rojizo).
3 días
Ojos abiertos, marrones. Vainas alares grises. Apenas se ven en la cola. Lados del pecho gris oscuro y blanquecino. Quedan pocas filoplumas.
8 días
Pico gris.Comisura amarilla.
Dorsal pardo jaspeado de ocráceo. Pecho blanquecino jaspeado de pardo. Abdomen blanquecino.
Láminas de las plumas alares, pardas. Secundarias y cubiertas alares, con las barbas externas ocráceas.

Cola con cañones cortos, las láminas chicas pardas y ocráceas.

Generalidades

Contreras (1990b). Los huevos son puestos en días corridos. El período de incubación es de 13 días.
El pichón permanece en el nido 10-15 días.
Mezquida (2003). Los pichones permanecen en el nido 11 días.
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 12 ó 13 días.
La pareja alimenta a los pichones y permanecen en el nido entre 11 ó 12 días.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 8 a 10 días. Período de incubación 11-13 días. Los huevos son puestos en días corridos. Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido 10-11 días.

Observaciones

Humphrey et al. (1970). Ushuaia, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego, Petersen y Humphrey observaron juveniles en diciembre.
Utges (1992).Barranqueras, dpto. San Fernando, Chaco, 08-07-1989, adultos alimentando a un volantón.
Salvador y Salvador (2012). La alimentación de los pichones estuvo a cargo de la pareja.

Otros

Haedo Rossi y Esteban (1972). Tres ejemplares con Albinismo parcial.
Haro (2002). Un ejemplar con Albinismo total y dos con Albinismo imperfecto.
De la Peña y Bruno (2008). Dos ejemplares Albinos (F. Bruno).
Urcola (2011). Un ejemplar con Leucismo parcial y otro con Dilución pastel.
De la Peña (2013c). Esperanza. Santa Fe. 28-12-2009. Albino parcial.

Parasitismo

De la Peña y Salvador en Salvador y Bodrati (2013a). Mason (1985). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Gibson (1880a). Barrows (1883). Reed (1913). Miller (1917). Goodall (1923). Serié y Smyth (1923 Dinelli (1924).). Smyth (1928). Renard (1933). Castellanos (1934). King (1973). Fraga (1978, 1983, 1983c). Contreras (1977b). Salvador (1983b, 2012f). Salvador y Salvador (1984, 1988). Mason (1986). Darrieu et al. (1988). Carman (1989b). Utges (1992). Maceda et al. (2001). Pautasso (2002b). Babarskas et al. (2003). Di Giacomo (2005h).Fernández y Duré Ruiz (2007). Cozzani y Zalba (2009). Salvador y Bodrati (2011, 2014). De la Peña (2013c). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

Depredación

De adultos: *Tyto alba* (Morici 1990a, 1990b)

Más información:
Fraga (1983c).Salvador (1983b). Mezquida (2003).De la Peña (2013c).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Copete gris. Lados de la corona y mancha a los lados de la base del cuello negros. Posterior del cuello canela. Dorsal jaspeada de negro.
Diferenciarlo del Cachilo corona castaña.



Esperanza.Santa Fe.31-10-2006
Parasitado por *Molothrus bonariensis*



Esperanza.Santa Fe.19-12-2014
Parasitado por *Molothrus bonariensis*



Esperanza.19-12-2014. Ubicación de un nido



Esperanza.Santa Fe.22-01-2008. Ubicación de un nido



.Esperanza.Santa Fe.24-11-2007



Ascochinga.Córdoba.17-11-2007



Esperanza. Santa Fe. 28-12-2009. Albino parcial



Esperanza.Santa Fe.10-11-2007. Ubicación de un nido



Esperanza.Santa Fe.31-10-2006
Ubicación de un nido



Campo Andino.25-11-2015



Esperanza.Santa Fe.14-11-2006



Esperanza.Santa Fe.31-12-2009. Pichones



Ascochinga. Córdoba. 17-11-2007

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Zonotrichia capensis pulacayensis (Ménégaux, 1909) entre los 3500 y los 4000 m de altura en centro y oeste de Jujuy, oeste de Salta, oeste de Tucumán, centro de Catamarca, centro de La Rioja y noreste de San Juan; *Zonotrichia capensis subtorquata* (Swainson, 1837) en Misiones y norte y noreste de Corrientes; *Zonotrichia capensis chilensis* (Meyen 1834) en el sur de Neuquén; *Zonotrichia capensis sanborni* (Hellmayr, 1932) a 3000 m o más metros de altura en San Juan y de Mendoza. En otoño migra hacia Tucumán y Salta; *Zonotrichia capensis australis* (Latham, 1790) en Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En otoño migra por el oeste hasta Salta y Jujuy y por el centro hasta Córdoba y Santiago del Estero. Accidental en las islas Malvinas; *Zonotrichia capensis choraules* (Wetmore y Peters, 1922) en el oeste de Córdoba, San Luis, sureste de San Juan, Mendoza, Neuquén, La Pampa, sur de Buenos Aires, Río Negro y este de Chubut. En otoño migra hasta Santiago del Estero; *Zonotrichia capensis hypoleuca* (Todd, 1915) en el sureste de Jujuy, este de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, sureste de Catamarca, Tucumán, sureste de La Rioja, sur de San Juan, norte de Mendoza, Corrientes, norte y centro de Córdoba, Centro de Entre Ríos, norte y centro de Santa Fe; *Zonotrichia capensis argentina*(Todd, 1920) en Buenos Aires, zonas limítrofes del noreste de La Pampa, sur de Entre Ríos, sur de Córdoba, sur de Santa Fe.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Veinticinco subespecies. Amplio rango de distribución desde Mejico hasta Tierra del Fuego. Comprende: Antigua y Barbuda, Haití, República Dominicana, Méjico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Zonotrichia capensis pulacayensis (Ménégaux, 1909)

Catamarca

Citas: Bó (1969); Carma (2009); Piloni (2002, 2004); Zotta (1937e)
Observaciones: De la Peña (El Alto, dpto. El Alto, 29-01-1977; El Alamito, dpto. Andalgalá, 16-12-1999)

Jujuy

Citas: Alderete y Capllonch (2012); Bó (1972); Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Fiora (1934); Lönnberg 81903); Lucero(1982); Piloni (2002, 2004); Salvador (2015); Zotta (1937e)



Observaciones: De la Peña (Humahuaca, dpto. Humahuaca, 23-02-1979)

La Rioja
Citas: Koslowsky (1895b); Esteban (1953); Hayward (1967); Capurro y Bucher (1982, 1986); Giannini et al. (2001); Camperi et al. (2008); Piloni (2002, 2004)

Salta
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Babarskas et al. (1995); Zotta (1937e); Alabarce y Lucero (1977); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013); Piloni (2002, 2004)

Observaciones: De la Peña (Salta, dpto. La Capital, 30-01-1977)

San Juan
Citas: Piloni (2002, 2004)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Alderete y Capllonch (2012); Antelo y Brandán (2006); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch y Moyano Wagner (2010); Dinelli (1924); Echevarría et al. (2008c); Handford (1983); Haro (2002); Lucero (1983); Luceroet al. (2002); Ortizy Capllonch (2011); Ortiz et al. (2013c); Ortiz y Aráoz (2014); Piloni (2002, 2004); Soria et al. (2010) (*)

Observaciones: De la Peña (San Miguel de Tucumán, dpto. Capital, 30-01-1977)

Zonotrichia capensis subtorquata (Swainson, 1837)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1996); Esteban (1953); Piloni (2002, 2004)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Piloni (2002, 2004); Salvador y Bodrati (2011)

Zonotrichia capensis chilensis (Meyen 1834)

D. G. Sur de Neuquén.

Zonotrichia capensis sanborni (Hellmayr, 1932)

Mendoza
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Navas y Bó (1991c); Piloni (2002, 2004)

San Juan
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i); Navas y Bó (1991c); Ortiz y Murúa (1994); Zotta (1941)

Tucumán
Citas:Lucero (1983); Ortizy Capllonch (2011); Ortiz et al. (2013c)

Zonotrichia capensis australis (Latham, 1790)

Buenos Aires
Citas: Morici (2011, 2014); Narosky y Di Giacomo (1993); Navas y Bó (1991c); Zapata (1998)

Chubut
Citas:Camperi (1998); Daciuk (1977c); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Keve y Kovács (1971); Navas y Bó (1991c); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Puerto Madryn, dpto. Biedma, 03-11-1979; 27-11-2000)

Córdoba
Citas: Haro (2002); Miatello et al. (1991-1994, 1993, 1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1981); Piloni (2002, 2004); Salvador(1983)

Jujuy
Citas: Camperi et al. (2013); Piloni (2002, 2004)

La Pampa
Citas: Bianchini y Arenas (2014b); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Güller (2008); Navas y Bó (1986b); Piloni (2002, 2004); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Nores y Yzurieta (1981)

Mendoza
Citas: Piloni (2002, 2004)

Neuquén
Citas: Christie et al. (2004); Contreras (1975); Giai (1942); Keve y Kovács (1971); Navas y Bó (1991c); Piloni (2002, 2004)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Casas (1992a); Christie et al. (2004); Contreras et al. (1980b); Daciuk (1977c); Gelain (1984a, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Pavic (2007); Keve y Kovács (1971); Llanos et al. (2011); Navas y Bó (1990, 1991c); Pérezy Petracci (1998); Piloni (2002, 2004)

Observaciones: De la Peña (Río Colorado, dpto. Pichi Mahuida, 26-11-2000)

Salta
Citas: Capurro y Bucher (1988); Echevarría et al. (2014); Hartert y Venturi (1909); Moschione et al. (2013); Piloni (2002, 2004); Rodríguez(2012b)

San Juan
Citas: Hartert y Venturi (1909)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993); Nores y Yzurieta (1981)

Santa Cruz
Citas: Burmeister (1890); Chebez et al. (1998); Daciuk (1977b); Darrieu et al. (2009); De Lucca y Saggese (1992); Erize (1983); Hartert y Venturi (1909); Humphrey et al. (1985); Imberti (2005); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Peri (2013); Piloni (2002, 2004); Stone (1928); Straneck (1990a); Travaini et al. (2004)

Observaciones: De la Peña (Río Turbio, 09-11-1979)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1937); Chebez y Bertonatti (1994); Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948, 1950); Piloni (2002, 2004); Reynolds (1934); Ripley (1950)

Tucumán
Citas:Antelo et al. (2013); Capllonch et al (2011b, 2014); Lucero(1983); Ortizy Capllonch (2011); Ortiz et al. (2013c)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

Alta mar
Citas: Seco Pon y Favero (2013)

Zonotrichia capensis choraules (Wetmore y Peters, 1922)

Buenos Aires
Citas: Camperi (1992c) (*); Navas y Bó (1991c); Morici (201, 2014); Piloni (2002, 2004)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, 07-02-1976)

Catamarca
Citas: Ortizy Capllonch (2011)

Chubut
Citas: Navas y Bó (1991c); Piloni (2002, 2004)

Córdoba
Citas:Nores et al. (1983); Nores (1996); Piloni (2002, 2004)

La Pampa
Citas:Bruno et al. (2007); Darrieu et al. (2011a); Maceda et al. (2001); Noriega et al. (1993); Pereyra(1927e); Piloni (2002, 2004)

Observaciones: De la Peña (Colonia 25 de Mayo, dpto. Puelén, 9-11-1998; Catriló, dpto. Catriló, 01-12-2000)

La Rioja
Citas: Esteban (1953); Giacomelli (1923)

Mendoza
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Barros (1930); Blendinger (1999) (*); Blendinger y Alvarez (2002) (*); Blendinger y Ojeda (2001) (*); Calí et al. (2008) (*); Contreras (1979g, 1980o) (*); Contreras y Fernández (1980) (*); Cueto et al. (2006, 2008) (*); Darrieu y Segura (2015) (*); Gómez (2006, 2011) (*); Gómez y Capllonch (2009) (*); Jahn et al. (2209) (*); López de Casenave (2001) (*);López de Casenave y Marone (1996) (*);López de Casenave et al. (2008) (*); Lucero (2013f); Lucero (1987b) (*); Marone (1990, 1992, 1992a, 1992b) (*); Marone et al. (1997, 1998, 2000, 2008) (*); Martínez et al. (1997a) (*); Mezquida (2003) (*); Mezquida y Marone (2001, 2003a); Milesi et al. (2002, 2008) (*); Navas y Bó (1991c); Ortiz y Capllonch (2011); Olivera et al. (2009) (*); Pereyra (1927e, 1941, 1942) (*); Piloni (2002, 2004); Rios y Mangione (2010) (*)Fitzgerald (1899); Sosa (1995d); Martínez et al. (1997a); Marone (1991, 1992a, 1992b); López de Casenave (2001); Sanzin (1918); Barros (1930); Reed (1916); Roig (1965); López de Casenave y Marone (1996); López de Casenave et al. (2008); Wetmore (1926); Contreras (1979g) Darrieu y Segura (2015); Mezquida y Marone (2003a); Milesi et al. (2002); Gómez (2006); Cueto et al. (2008); Mezquida (); ; Roig (1965) (*); Sagario y Cueto (2014); Sosa (1995d) (*); Wetmore (1926b) (*); Zotta (1941)

Neuquén
Citas:Acerbo (2000); Alderete y Capllonch (2012); Chehebar et al. (1992); Contreras (1975, 1977b); Daciuk (1968); Gorgoglione (2005); Heredia y Funes (1987); Masramón (1979); Matarasso (2007); Navas y Bó (1991, 1991c); Piloni (2002, 2004); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (Villa La Angostura, dpto. Los Lagos, 30-01-1976)

Río Negro
Citas:Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras et al. (1980b); Gelain (2001, 2010); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera (1976); Hecker y Vidoz (1998); Navas y Bó (1991c); Paz Barreto (1997b); Piloni (2002, 2004)

Observaciones: De la Peña (San Carlos de Bariloche, dpto. Bariloche, 31-01-1976)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001) (*); Navas y Bó (1991c)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Ortizy Capllonch (2011); Piloni (2002, 2004)

Santiago del Estero
Citas: Ortizy Capllonch (2011)

Zonotrichia capensis hypoleuca (Todd, 1915)

Buenos Aires
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bó (1972); Camperi (1992); Codesido et al. (2011); Cueto y López de Casenave (2000B); Dabbene (1919b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Fraga (1978); Isacch et al. (2006); Isacch y Martínez (2001); Klimaitis (1977c, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2004, 2004b, 2006, 2011b); Lucero (1982); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Mason (1985); Montaldo (1993); Montaldo y Claver (1986); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923); Piloni (2004); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Soave et al. (1999); Straneck (1990b); White (1882); Zapata (1998); Zapata y Cabrera (1969)

Catamarca
Citas: Alabarce et al. (1987); Alderete y Capllonch (2012); Bó (1969); Carma (2009); Esteban (1953); Piloni (2001, 2002, 2004); Vides Almonacid (1999)

Chaco
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Bó (1969); Chatellenaz (2005); Moschione y Bishels (2004); Piloni (2000, 2001)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007) (*); Castellanos (1934); Chikilian et al. (1993-1994); De la Peña (2013c); Haro (1998); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1991, 1994, 1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Ordano (1996); Partridge (1953c); Piloni (2000, 2001); Salvador(1983, 1988); Salvadory Salvador (1988, 2012); Salvador y Bodrati (2013a); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Ischilín, dpto. Ischilín, 14-11-2001; Jesús María, dpto. Colón, 16-10-2010; Ascochinga, dpto. Colón, 6-10-20010)

Corrientes
Citas: Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1980-81, 1987b, 1990b); Darrieu y Camperi (1996); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918); Ordano et al. (2008); Piloni (2001, 2002, 2004); Short(1971)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Fandiño et al. (2010); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Peltzer (1998); Piloni (2002, 2001, 2002, 2004); Raffo et al. (2008); Roitman et al. (1997); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975)

Formosa
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Bó (1969); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo, A.G. y Krapovickas (2005); Grant (1911c); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Martelli (1995); Ordano et al. (1999); Piloni (200, 2001, 2002, 2004); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Bó (1972); Burgos et al. (2009) (*); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005); Salvadori (1897)

La Rioja
Citas: Hayward (1967); Salvador (1988)

Mendoza
Citas: Sanzín (1918)

Observaciones: De la Peña (Uspallata, dpto. Las Heras, 11-01-1982; Malargüe, dpto. Malargüe, 14-10-2004)

Salta
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Bó (1969); Camperi (1990); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Piloni (2000, 2001)

San Juan
Citas: Gelain (2014a); Gelain y Pereyra Lobos (2011b) (*)

Observaciones: De la Peña (La Ciénaga, dpto. Jáchal, 15-01-1982)

San Luis
Citas: Casares (1944); Nellar Romanella (1993).

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Santa Fe
Citas: Alessio et al. (2005); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2001, 2002, 2011f, 2013c); Esteban (1953); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Piloni (2002, 2004); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003); Salvador y Bodrati (2013a); Wilson, (1926)

Santiago del Estero
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Bó (1969); Codesido y Bilenca (2000); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991); Piloni (2002, 2001, 2002, 2004); Salvador (1988)

Tucumán
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Bó (1969); Capllonch y Moyano Wagner (2010); Cocimano et al. (2005) (*); Piloni (2002, 2001, 2002, 2004); Rougés y Blake (2001); Zotta (1937)

Zonotrichia capensis argentina(Todd, 1920)

Buenos Aires
Citas: Bó (1969); Morici (2011, 2014); Pereyra (1923b, 1938b); Piloni 2000 (2001), 2002 (2004)

Córdoba
Citas: Piloni 2000 (2001), 2002 (2004)

Entre Ríos
Citas: Piloni 2000 (2001), 2002 (2004)


La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Darrieu et al. (2011a); Maceda y Kin (2001); Piloni 2002 (2004); Siegenthaler (1984); Wedmore (1926b)

Santa Fe
Citas: Piloni 2002 (2004)

CACHILO DE CEJAS AMARILLA *Ammodramus humeralis* (Bosc, 1792)

Otros nombres: Cachilo capü-tí. Cachilo ceja amarilla. Cachirlito. Cejita amarilla. Chingolo de cejas amarillas. Chingolo de tierra. Chingolo del campo. Manimbé. Pajerito. Pajerito común. Saltoncito. Zoncito.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12 cm.




Peso: Contreras (1979f): N= 3 (M) 14,3, 15,5 y 15,2 g; Contreras y Davies (1980): N= 1 (M) 18,0; Salvador (1988): N= 1 (?) 16,0 g, N= 1 (M) 16,0 g; Darrieu y Camperi (1996): N= 1 (M) 16,8 g, N= 2 (H) 16,2 y 17,3 g; Di Giacomo (2005h): N= 18 X= 16,3 g (Rango 14,5 a 18,5); Alderete y Capllonch (2012): N= 11 X= 17,4 g (Rango 15 a 23); Salvador (2014a): N= 10 (?) X= 17,2 g (Rango 16,2 a 18,8); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 17,0 y 18,0 g, N= 65 X= 16,5 g (Rango 14,6 a 21,0), N= 12 juvenil X= 15,2 g (Rango 13,9 a 16,5), N= 1 16 g.

Coloración. Pico córneo grisáceo con culmen negruzco. Patas córneo rosadas. Iris pardo.

Dorsal gris con estrías pardas. Cejas amarillas. Garganta blanquecina. El resto de la parte ventral blanquecino. Flancos ocráceos. Alas pardas con las plumas ribeteadas de gris. Borde de las alas amarillo. Cola parda con fino ribete ocráceo.

COMPORTAMIENTO

Terrícola, anda entre los pastos. Se posa en los alambres o sobre postes. Anda solo o en pareja. Se desplaza rápidamente por el suelo, "corre". Para cantar se posa en postes, alambres, pastos altos, arbustos. Se alimenta en el suelo de semillas e insectos.



Alimentación

Zotta (1936). **Vegetales:** Semillas. Vegetales. **Insectos:** Himenópteros. Orthópteros.

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semilla*Amaranthus* sp.*,Carduus* sp.*,Chenopodium* sp.*,Panicum mileaceum, Sorghum halepense,* Gramíneasno determinada.

Insectos: Coleoptera (Curculionidae, no identificado).Homoptera (Aphidae). Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas).

Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semilla *Stipa* sp.

De la Peña (2011a). **Insectos:** mariposas.

Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces

Straneck (*in litt*.). El canto está compuesto por dos notas, una es un silbo muy agudo y la otra como un zumbido de insecto: Sieiiiihh.tyyyyih.

HÁBITAT

Praderas, pastizales, sabanas, áreas rurales.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Formosa, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N

El nido es una tacita de pajitas. Internamente raicillas. Lo ubica en el suelo.Oculto. Elaborado.

Goodall (1923). Córdoba-San Luis, es parasitado por *Molothrus bonariensis.*

Dinelli (1924). Tucumán, nido en enero de 1903 con 2 huevos de *Molothrus bonariensis*.

Wilson (1926). Dpro. Gral. López, Santa Fe, nido en el suelo.

Pereyra (1951). Conhelo, dpto. Conhelo, La Pampa. Noviembre de 1934, nido a baja altura en un arbusto, un huevo.
Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 2 nidos.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre setiembre y febrero. Se estudiaron 23 nidos.
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 6, desde el 18-10-1970 al 11-12-2002, uno en Corrientes, el resto en Santa Fe. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Medidas: Diámetro total: de 9 a 10 cm. Diámetro interno: de 6 a 7 cm. Profundidad: de 4 a 5 cm. Alto: de 5 a 6 cm.
Salvador y Bodrati (2014a). Salto, pdo. Buenos Aires, A. Di Giacomo, localizó nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, blancos.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 18,0 a 21,0 x 14,0 a 15,5
Dinelli (1924): 21,0 x 15,0 y 18,0 x 14,0
Smyth (1928): 19,5 a 20,0 x 14,0
Pereyra (1951): 18,0 x 14,0
Di Giacomo (2005h): 17,1 a 20,7 x 14,1 a 15,1 X= 19,1 x 14,9 (N= 32)
De la Peña (2013c): 18,5 a 19,7 x 13,8 a 15,2 X= 19,1 x 14,5 (N= 9)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 1,6 a 2,4 X= 2,1 (N= 31)
De la Peña (2013c): 1,8 a 2 X= 1,9 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,128 a 0,135 X= 0,130 (N= 8)

PICHONES
Descripción.
Nace con la cavidad bucal, paladar y lengua, rosados. Comisura amarilla.
9 días
Pico gris oscuro. Patas gris claro.
Láminas de las plumas primarias, pardas oscuras con la punta acanelada. Borde “codo” de las alas amarillento. Dorsalmente pardo con el extremo de las plumas acanelados.
Ventralmente, garganta y pecho blanquecinos, jaspeados de gris. Flancos blanquecinos.

Alimentación.
Los padres les traen langostas chicas.

Generalidades
Contreras (1990b). Los huevos son puestos en días corridos. El pichón permanece en el nido 12 días.
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 12 días. Los pichones permanecen en el nido 10 a 11 días.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 5 a 6. Pone los huevos en días corridos. Permanencia de los pichones en el nido 10 a 11.

Otros
Goodall (1923). Dinelli (1924). De la Peña (2013c). Salvador y Bodrati (2014a).Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

Depredación
Di Giacomo (2005h). Adulto aportado a un nido con pichones (*Buteo albicaudatus*)

Más información:
De la Peña (2013c)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cejas y "hombros" amarillos. Ventralmente blanquecino. Dorso jaspeado.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Ammodramus humeralis xanthornus (Darwin, 1839) desde el norte del país hasta Río Negro.


Esperanza.Santa Fe.16-05-2007


Esperanza.Santa Fe.18-10-1976Parasitado por *Molothrus bonariensis*.


Esperanza.Santa Fe.08-11-1991


Paso de los Libres.Corrientes.11-12-2002



Paso de los Libres.Corrientes.11-12-2002



Esperanza.Santa Fe.18-10-2007



Paso de los Libres.Corrientes.11-12-2002

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cuatro subespecies. Toda Sud América a excepción de la Amazonia y región cordillerana, llegando hasta Argentina. Comprende: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Ammodramus humeralis xanthornus (Gould, 1839)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Marelli (1933); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b); Pugnali y Chamorro (2008); Salvador y Di Giacomo (2014); Savigny (2002a); Zapata (1998)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009)



Chaco
Citas:Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Castellanos (1934); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b); Salvador (1983); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 16-11-2005; Jesús María, dpto. Colón, 12-05-2006)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Contreras (1987b, 1990b); Chatellenaz et al. (2010); Darrieu y Camperi (1996); De la Peña (2013c); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008); Salvador y Di Giacomo (2014); White (1882)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá, 19-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Baliño (1984); Camperi (1992); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); López-Lanús et al. (2013c); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Straneck (1990b)

Formosa
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Chebez et al. (1998); Di GiacomoKrapovickas (2005b); Grant (1911c); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Contreras y Davies (1980); Darrieu et al. (2011a); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Pereyra (1937, 1951); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)

Misiones
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009)

Neuquén
Citas: Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011)

Salta
Citas: Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2005, 2011); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Alderete y Capllonch (2012); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas:Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Dinelli (1924); Handford (1983); Marigliano et al. (2010); Ortiz et al. (2013c)

CACHILO DE CORONA CASTAÑA *Rhynchospiza strigiceps* (Gould, 1839)

Otros nombres: Aimófila cordobesa. Aimófila jujeña. Cachilito. Cachilo corona castaña. Chingolito de los cercos. Chingolo corona castaña. Chisca. Pajero de corona castaña.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14 cm
Peso: Fiora (1934): N= 8 X= 34,0 g (Rango 30,0 a 39,5); Navas (1965): N= 7 (M) X: 22,3 g (Rango 21,2 a 23,2), N= 2 (H) 21,7 y 21,8 g; Camperi (1992a): N= 7 (M) X= 22,3 g (Rango 21,2 a 23,1), N= 2 (H) 21,7 y 21,8 g; Alderete y Capllonch (2012): *R. s. dabbenei* N= 4 (?) X: 29,75 g (Rango 26,5-32), *R. s. strigiceps* N= 13 (?) 19,15 g (Rango 17 a 23); Salvador (2014a): N= 1 (M) 21,3 g, N= 1(H) 20,8 g, N= 6 (?) X= 21,6 g (Rango 20,8 a 22,6); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 19,5 y 21,0 g (*strigiceps*), N= 1 33,5 g (*dabbenei*)
Coloración. Pico pardo negruzco, base de la mandíbula córneo. Patas rosado pálido. Iris castaño rojizo. Cabeza gris con líneas castañas a los lados de la corona. Cejas y regiones malares grisáceas. Dorsal pardo ocráceo, estriado de pardo oscuro. Garganta blanquecina con "bigotes" negros. El resto de la parte ventral grisáceo. Flancos ocráceos. Alas pardas oscuras con las barbas externas de las secundarias ocráceas. Cubiertas alares negruzcas orilladas de ocráceo. Cola parda oscura.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o en pequeños grupos, de 4 a 6 ejemplares. Entre matorrales, en el suelo o en arbustos. Se desplaza por el suelo a saltitos, inquieto.
Recorre los matorrales y se va desplazando por el monte. Cuando anda en grupos emite voces de contacto. A veces se posa en ramas de árboles a 3-4 m para cantar.
Se alimenta de insectos, semillas y frutos. Busca el alimento en el suelo y en la vegetación herbácea hasta los 2 m de altura.

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Semillas de Nabiza (*Brassica napus*), Mijo (*Panicum miliaceum*), Sorgo (*Sorghum caffrorum*), Maiz (*Zea mays*)
Kratter et al. (1993). **Vegetales:** Frutos no determinados. **Insectos:** Ortópteros. **Arácnidos:** Arañas.

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semillas *Amaranthus* sp.*, Chenopodium* sp. no determinadas. **Insectos:** Coleoptera. Hemiptera. Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas). Orthoptera (Acridiidae)
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semilla *Stipa* sp.
De la Peña (2011a). **Vegetales:** Fruto *Holmbergia tweedii.* Semillas *Setaria lachnea, Sorghum halepense, Tillandsia recurvada*
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.



Voces
Straneck (*in litt*.). El canto está compuesto por un melodioso silbo y unos cuatro o cinco trinos: Biiiieehh.piepiepiepie.

HÁBITAT
Sabanas, montes, matorrales, cercos de ramas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
X										N	N

El nido tiene forma de taza. Emplea pajas, tallos de yuyos. Internamente fibras finas. Lo ubica entre matas de pastos, cerca del suelo.Oculto. Elaborado.

Uranga (*in litt*.). Rosario de la Frontera, dpto. Rosario de la Frontera, Salta, 20-01-2013, 3 huevos. (con pintas)
Dinelli (1918b). Nidifica en Tucumán.
Friedmann (1963). Salta, Höy es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Höy (1971). Valle de Lerma, Salta, noviembre de 1963, nido con 3 huevos.
De la Peña (2013c). Calchaquí, dpto. Vera, Santa Fe, 18-11-1989, nido a 0,20 m del suelo, 2 huevos; Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 21-12-2000, nido a 0,30 m del suelo, 3 huevos, ambos en Pastos puna.
Medidas: Diámetro total: de 8 a 12 cm. Diámetro interno: de 5 a 6 cm. Profundidad: de 4,5 a 6 cm. Alto: de 8 a 12 cm.



Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, blancos con pintas pardas claras y oscuras, más concentradas en el polo mayor.
Según Hoy (1971) los huevos son verdes claros inmaculados, iguales a los de la otra especie del género *Rhynchospiza,* que cría en Perú.

Medidas
Höy (1971): 19,7 a 21,2 x 15,5 a 17,0
De la Peña (2013c): 20 a 20,7 x 14 9 a 15,5 X= 20,2 x 15,1 (N= 5)

Peso
Höy (1971): cáscara X= 0,184
De la Peña (3013c): 2,3 a 2,6 X= 2,4 (N= 5)
De la Peña (3013c): cáscaras 0,140 a 0,150 X= 0,144 (N= 5)

Generalidades
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 10 a 11 días. Pone los huevos en días corridos.

Otros
Friedmann (1963). Antitrión de *Molothrus bonariensis*.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Corona rojiza con el centro gris. Cejas y regionesmalares grisáceas. Garganta blanquecina con "bigotes" negros. Cola larga.
Se diferencia del Chingolo por tener rojizo en los lados de la corona y "bigotes" negros.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Rhynchospiza strigiceps strigiceps (Gould, 1839) en Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, San Luis, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y noreste de Buenos Aires y *Rhynchospiza strigiceps dabbenei* (Hellmayr, 1912) en Jujuy, Salta, Tucumán y norte de Catamarca.


Jesús María.Córdoba.23-03-2007


Jesús María.Córdoba.26-07-2008


Esperanza.Santa Fe.06-01-2005


Jesús María.Córdoba.07-06-2007



Jesús María.Córdoba.20-07-2007



Esperanza.Santa Fe.21-12-2000

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Distribución restringida a Región Chaqueña de Argentina,**sur de** Bolivia y este de Paraguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Rhynchospiza strigiceps strigiceps (Gould, 1839)

Buenos Aires

Citas:Babarskas et al. (2003); Bodrati (2001); Darrieu y Camperi (2001a); Krapovicas et al. (1992); Narosky (1978); Narosky y Di Giacomo (1993)

Catamarca

Citas: Salvador y Di Giacomo (2014)

Chaco

Citas:Moschione y Bishels (2004); Navas (1965)

Córdoba

Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Dardanelli et al. (2006b); Dardanelli y Nores (2001); Heredia (2006); Navas (1965); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983); Sferco y Nores (2003); Straneck (1990d); White (1883b); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Chancani, dpto. Pocho, 30-03-2002; Ascochinga, dpto. Colón, 15-09-2006; Jesús María, dpto. Colón, 18-02-2007)



Corrientes

Citas: Antoniazzi (2006); Capllonch et al. (2005)

Entre Ríos

Citas: Beltzer et al. (2006); Camperi (1992); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Navas (1965); Pereyra(1927e)

San Luis
Citas: Di Giacomo et al. (2001)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2002h, 2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Navas (1965)

Santigo del Estero
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Codesido y Bilenca (2000); López de Casenave et al. (1998); Navas (1965); Nores et al. (1991); Salvador y Di Giacomo (2014)

Rhynchospiza strigiceps dabbenei (Hellmayr, 1912)

Catamarca

Observaciones:Salvador, S. (Cuesta de Singuil, Julio de 2003)

Jujuy
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Fiora (1934); Navas (1965)
Observaciones: De la Peña (El Carmen, dpto. El Carmen, 11-02-1983)

La Rioja
Citas: Capurro y Bucher (1986)

Salta
Citas: Capurro y Bucher (1988); Hartert y Venturi (1909); Höy (1971); Moschione et al. (2013); Navas (1965); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (Salta, dpto. La Capital, 04-12-1977)

Tucumán
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007); Dinelli (1918); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983) ; Navas (1965); Ortiz et al. (2013c); Salvador y Di Giacomo (2014)

CERQUERO DE COLLAR *Arremon flavirostris* Swainson, 1838

Otros nombres: Afrechero de collar. Arremón cabeza negra. Gran cantor. Gran cantor cabeza negra.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 6 X= 22,1 g (Rango 20,0 a 25,0); Contreras (1979f): N= 5 (M) X: 28,7 g (Rango 28 a 30,3), N= 3 (H) X: 28,5 g (Rango 27,8 a 29,9); Salvador (1988): N= 1 (H) 26,0 g, N= 5 (M) X= 23,8 g (Rango 23,0 a 25,0), N= 9 (?) X= 25,1 (Rango 21,6 a 27,8); Darrieu y Camperi (1996): N= 3 (N) 28,7, 28,7 y 20,1 g, N= 2 (H) 31,7 y 32,5 g; Di Giacomo (2005h): N= 2 X= 26,7 g (Rango 24,0 a 29,0); Alderete y Capllonch (2012): N= 3 X= 25,5 g (Rango 25 a 26) (*polionotus*), Alderete y Capllonch (2012): N= 55 X= 24,8g (Rango 21 a 30) (*dorbignii*); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 24,5 27,4 g (*dorbignii*)
Coloración. Pico naranja con culmen negro. Patas rosadas o grisáceas. Iris pardo o pardo oscuro.

Cabeza negra con el centro de la corona gris. Cejas superciliares, garganta, pecho y abdomen blancos. Collar negro. Cuello posterior y lados del pecho grises. Dorsal verde olivácea. Alas pardas. Cubiertas amarillo-verdosas. Borde de las alas amarillo. Cola parda oscura.
La raza del noreste tiene el dorso gris y carece de este color en la corona.

COMPORTAMIENTO
Anda solo o en pareja. Terrícola o en estratos bajos. Confiado. Recorre la hojarasca.



HÁBITAT
Bosques, selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Formosa, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

El nido es globular, con entrada grande, lateral. Cerca del suelo o en el suelo. También con forma de taza, protegido por troncos u otros elementos. Emplea pastos, fibras, nervaduras, hojas. Oculto o Semiexpuesto



Friedmann et al. (1977). Salta Höy nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Hartert y Venturi (1909). Villa Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, nido.
Dinelli (1918b).Tucumán, nido en el suelo. Construido con pajas e internamente hebras y crines.
Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 2 nido.
Di Giacomo y López Lanús (1998). Aguas Negras, Parque Nacional Calilegua, dptos. Ledesma y Valle Grande, Jujuy, 01-11-1991, nido con 2 huevos.
Di Giacomo (2005h).Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre noviembre y enero. Se estudiaron 5 nidos.
Auer et al. (2007), ParqueNacional El Rey, dto. Anta, Salta, 72 nidos, construidos en el suelo, entre octubre y diciembre, postura promedio 2,8 huevos.

Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Guaycolec, dpto. Formosa, 25-11-1985, nido con 2 huevos. El nido se halla en un área de selva en galería, semiesfera medio enterrada, con boca lateral a ras del suelo, muy disimulado entre abundantes hojarascas, elaborado de detritos, raicillas y hojitas muy pequeñas, en su interior los mismos elementos pero mas suaves, alto 11 cm, ancho 14 cm, boca oval de 6 x 4 cm, el lecho de 5 cm de diámetro y 3 cm de profundidad.
Lib. Gral San Martín, dpto. 04-11-1991, un nido con 2 huevos y otro con 2 pichones.

El nido con 2 huevos, se hallaba en un área selvática, en el suelo en una depresión, esfera de amplia boca, de hojas de cebil y otras y tapizado en su interior de raicillas, de 15 cm de alto y 13 cm de profundidad, boca 7 cm.
El nido con pichones, de unas 48 horas de vida,.en ambiente similar al anterior, muy disimulado, hecho con hojas y detritos, de 20 cm de ancho y 18 cm de alto.
De la Peña (2013c). Rivadavia, dpto. Rivadavia, Salta, 20-11-1777, nido con 3 huevos (Localizado por G. Höy); Rosario de la Frontera, dpto. Rosario de la Frontera, Salta, 11-12-2003, 2 huevos (Localizado por M. Uranga).
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", un nido con 2 huevos.

Huevos
Pone 2 ó 3 huevos, ovoidales, blancos con manchitas marrones oscuras y grises, estas últimas alargadas y casi todas en el polo mayor.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 24,0 x 17,0
Di Giacomo y López Lanús (1998); 24,0 x 16,7 y 24,1 x 16,7
Di Giacomo (2005h): 22,4 a 23,4 x 15,7 a 17,1 X= 22,8 x 16,3 (N= 4)
Auer et al. (2007): X= 22,3 x 15,8 (N= 4)
Salvador y Salvador en De la Peña (2010): 19,4 a 23,3 x 14,7 a 17,1 X= 21,5 x 15,9 (N= 4)
De la Peña (2013c): 22,8 a 23,8 x 15,6 a 16 X= 23,1 x 15,8 (N= 5)

Pesos
Di Giacomo y López Lanús (1998): X= 3,6 (N= 2)
Di Giacomo (2005h): 2,9 a 3,6 X= 3,2 (N= 4)
Auer et al. (2007): X= 2,9 (N= 4)

De la Peña (2013c): cáscaras 0,159 a 0,191 X= 0,170 (N= 3)



PICHONES
Descripción
Di Giacomo y López Lanús (1998). Piel naranja, con espeso y largo plumón gris oscuro. Pico córneo rosado, comisura amarillenta e interior de la boca rojo pálido.

Generalidades
Contreras (1990b). El pichón permanece en el nido 15 días.
Di Giacomo y López Lanús (1998). Los pichones permanecen en el nido 15 días.
Di Giacomo (2005h). La permanencia de los pichones en el nido fue de 13 días.
Auer et al. (2007). La incubación estuvo a cargo de la hembra y la alimentación de los pichones a cargo de la pareja, período de incubación promedio de 15,3 días y permeancia de los pichones en el nido promedio de 12,2 días.



Otros
Friedmann et al. (1977). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pico anaranjado con culmen negro. Cabeza y collar negros. Cejas, garganta y resto de la parte ventral blancos. Líneas amarillas en el borde de las alas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Arremon flavirostris polionotus Bonaparte, 1850 en Misiones, Corrientes, este de Formosa y de Chaco, norte de Santa Fe y *Arremon flavirostris dorbignii* P. L. Sclater, 1856en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Presenta 2 áreas vecinas pero separadas, una en centro-sur de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina y la otra este de Bolivia y noroeste Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Arremon flavirostris polionotus Bonaparte, 1850

Chaco
Citas:Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005)

Observaciones: De la Peña (Cerrito, dpto. Bermejo, 26-09-1972)

Corrientes
Citas: Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1980-81, 1987b, 1990b); Darrieu y Camperi (1996); Giraudo et al. (2006); Straneck (1990e)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá, 19-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Reales et al. (2015)

Formosa
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Contreras (1987c); Di Giacomoy Krapovickas (2005h); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Krauczuk (2009)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Hartert y Venturi (1909) ; López-Lanús et al. (2013a)

Arremon flavirostris dorbignii P. L. Sclater, 1856

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Nores et al. (2000); Nores y Cerana (1990); White (1882)

Jujuy
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Di Giacomo, A. G. y López Lanús (1998); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Fiora (1934); Hartert y Venturi (1909); Hellmayr (1938); Lucero(1982); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988); Salvador y Di Giacomo (2014)

La Rioja
Citas:Nores e Yzurieta (1982a.); Salvador (1988)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Coconier et al. (2007); De la Peña (2013c); Hartert y Venturi (1909); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b); Salvador y Di Giacomo (2014); Soria et al. (2010)

Observaciones: De la Peña (Camino de Cornisa, dpto. La Caldera, 05-02-1977)

Santiago del Estero
Citas: Ferrari et al. (2006)

Tucumán
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Brandán y Navarro (2009); Echevarría et al. (2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Malizia et al. (1998); Ortiz et al. (2011, 2013); Ortiz y Aráoz (2014); Pereyra (1951); Rougés y Blake (2001); Soria et al. (2010)

Observaciones: De la Peña (Horco Molle, dpto. Capital, 11-05-1987)

CERQUERO DE VIENTRE BLANCO *Arremon torquatus* (Lafresnaye y d´Orbigny, 1837)

Otros nombres: Afrechero grande. Afrechero vientre blanco. Arbustero corbático. Cerquero vientre blanco. Collarcito.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18,5 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 2 (H) 31,0 y 33,0 g; Auer et al. (2007): N= 6 (M) X: 33,3 g, N= 4 (H) X: 34 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 64 (?) X: 33,28 g (Rango 24 a 37); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 8 X= 32,5 g (Rango 30,0 a 36,5)
Coloración. Pico negruzco. Patas pardo grisáceas. Iris pardo.
Cabeza negra. Centro de la corona gris. Cejas blancas. Dorsal olivácea. Alas oliváceas con amarillo en la curvatura. Ventral blanca. Flancos grisáceos. Cola parda olivácea.

COMPORTAMIENTO

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es una serie de silbos muy agudos: Sihíi .. siiieh, siííhiíi.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	

Semiesfera de tallos de enredaderas, hojas y musgos. Internamente fibras finas.



Di Giacomo y López Lanús (2000). Serranía de las Pavas, Parque Nacional Baritú, dpto. Santa Victoria, Salta, 18-11-1992, nido con un huevo; 20-11-1992, dos nidos con 2 huevos cada uno. Nidos a 1 a 2 m del suelo. Medidas: 12,0 a 13,5 cm de diámetro externo; 7,0 a 8,7 cm interno: 9,2 a 11,5 cm de altura y 5,0 a 5,6 cm de profundidad.
Auer et al. (2007). Parque Nacional El Rey, dpto. Anta, Salta, 154 nidos, entre octubre y diciembre, entre 2 y 8,3 m de altura, postura promedio 2,1 huevos.

Huevos
Pone 2 huevos blancos.

Medidas
Di Giacomo y López Lanús (2000): 22,5 a 22,8 x 15,1 a 15,3 (N= 2)
Auer et al. (2007): X: 24,3 x 16,7 (N= 18); 3,77 g

Generalidades
Auer et al. (2007). La incubación estuvo a cargo de la hembra y la alimentación de los pichones a cargo de la pareja, período de incubación promedio de 15,8 días y permeancia de los pichones en el nido promedio de 12,8 días.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza y pico negros. Cejas blanquecinas. Dorso oliváceo. Ventralmente blanco.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Arremon torquatus borellii (Salvadori, 1897) entre los 1000 y los 2500 m de altura en Jujuy y Salta.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. En entro América: Costa Rica y Panamá. En Sudamérica por la cordillera de los Andes entre 1000 y 3000 metros de altura, en Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Arremontorquatus borellii (Salvadori, 1897)

Jujuy
Citas: Berpepsch (1912); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Hellmayr (1938); Malizia et al. (2005); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988); Salvadori (1897); Straneck (1990f)

Salta
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Babarskas et al. (1995); Camperi (1988); Coconier et al. (2007); Di Giacomoy López Lanús (2000); Esteban (1953); Höy (1969a); Moschione et al. (2013); Salvador y Di Giacomo (2014)

CERQUERO DE CABEZA CASTAÑA *Atlapetes fulviceps* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Afrechero cabeza leonada. Afrechero de cabeza canela. Afrechero de cabeza castaña. Arbustero cabecicanela. Cabeza leonada. Cerquero cabeza castaña.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16,5 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 1 X= 28,2 g; Salvador (1988):N= 3 (?) X= 24,3 g (Rango 22,0 a 26,0), N= 1 (M) 21,0 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 2 X= 23,5 g (Rango 23 a 24)
Coloración. Pico negro. Patas parduscas. Iris pardo.
Cabeza castaña. Lorum y parte ventral amarillos. Líneas malares castañas y amarillas. Dorsal y flancos oliváceos. Alas y cola pardas oliváceas.

COMPORTAMIENTO

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es la repetición de una estrofa silbada: Chifio .. fichichi .. chifio . fichichí.

HÁBITAT
Bosques.



Laguna de Yala. Jujuy. 27-01-2016



Ubicación del nido. Fotos. Máximo Uranga

NIDIFICACIÓN

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											

El nido tiene forma de tazón o semiesfera. Lo sostiene en ramas de arbustos. Es construido con algunos palitos, musgos, raíces y raicillas. Internamente cerdas. Oculto. Elaborado.

Uranga (*in litt*.). Laguna de Yala, dpto. Capital, Jujuy, 27-01-2016, nido a 2,5 m del suelo, en un arbusto. Se encontraba oculto entre las ramas y hojas. Tenía 2 huevos.

Huevos
Pone 2 huevos, de base crema con pintas y manchas marrones y rojizas distribuidas por toda la superficie, más concentradas en el polo mayor.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza castaña. Lorum, regiones malares y ventral amarillos.
Se diferencia del Tangará alisero por ser de mayor tamaño, tener manchas loreales y malares amarillas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Atlapetes fulviceps (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)entre los 1000 y los 2500 m de altura en Jujuy y Salta.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Ladera este de Los Andes, desde el norte de Bolivia a noroeste de Argentina, entre 1500 y 3000 metros de altura.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Hellmayr (1938); Mazar Barnet (1998); Monteleone y Roesler (2005); Moschione y Segovia (2005); Straneck (1990f)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Höy (1969a); Moschione et al. (2013); Nores y Yzurieta (1981)

CERQUERO AMARILLO *Atlapetes citrinellus* (Cabanis, 1883)

Otros nombres: Afrechero citrinelo. Afrechero oliváceo. Afrechero de ceja amarilla. Arbustero oliváceo. Citrinelo. Verdón.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16,5 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 1 (M)28,0 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 156 (?) X: 28,11 g (Rango 24 a 33)



Coloración. Pico negro. Patas grises. Iris pardo rojizo.
Dorsal, alas y cola pardas oliváceas. Franjas oculares, regiones auriculares y "bigotes"negros. Cejas superciliares, líneas a los lados del cuello y parte ventral amarillas. Pecho con tono oliváceo.

COMPORTAMIENTO
Anda en el estrato bajo y por el suelo.

Alimentación
Blake y Rougés (1997). **Vegetales**: Frutos. **Insectos:** Coleópteros.Formícidos no determinados.
Rogués y Blake (2001). **Insectos:**Coleópteros. Formícidos.Hymenópteros.**Arácnidos.**
Ruggera et al. (2014). **Vegetales:** Frutos y semillas. **Insectos**. **Moluscos:** pequeños caracoles de tierra.
Capllonch et al. (2014b). **Vegetales:** *Rubus imperialis* (Rosaceae), *Psychotria carthagenensis* (Rubiaceae), *Morus*
alba (Moraceae) y *Solanun riparium* (Solanaceae),

HÁBITAT
Sotobosque en yungas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron ndios en Tucumán, Catamarca.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N

El nido tiene forma de tazón o semiesfera. Lo sostiene en ramas de arbustos. Es construido con pajas y tallos de yuyos. Internamente fibras más finas.Semiexpuesto. Elaborado.

Friedmann (1929). Tucumán, Girard nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Dinelli (1918b).Tucumán, Girard localizó varios nidos, en arbustos a 1,50 m del suelo.
Pereyra (1951). Tafí Viejo, dpto. Tafí Viejo, Tucumán, Girard localizó un nido el 25-11-1930.
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Quebrada de los Sosas, dpto. Montero, Tucumán, 24-12-1983, nido con 3 huevos. El nido se hallaba en un área selvática junto al río, a 2,4 m de altura en un arbusto, semiesfera compacta y de aspecto húmedo, hecho palitos, hojas, musgos y zarcillos, por dentro forrado de raicillas, de 12 x 15 de diámetro externo, 7 cm de diámetro interno, 12 cm de altura y 5,5 cm de profundidad.
De la Peña (2013c). Cuesta del Clavillo, dpto. Andalgalá, Catamarca, 18-12-1999, nido en Arbusto con un huevo, 20-12-2000, nido con 2 huevos.
Medidas: Diámetro total en la base: 14 x 18 cm. Diámetro interno: 5,5 cm. Profundidad: 4 cm. Alto: 10 cm.
Capllonch et al. (2014b). San Agustín, Parque Sierra de San Javier, Tucumán, 4 nidos entre octubre de 2005 y enero de 2006. Los nidos estaban construidos sobre troncos y tallos de arbustos y pecíolos de helechos a una altura de 0,7 a 1,9 m del suelo. Los nidos presentaron forma de copa, con la pared exterior de ramitas, musgo y otros elementos y el interior de fibras finas prolijamente ubicadas. El diámetro interno fue de 7,38 cm, el externo 13,45 cm, la profundidad 6,17 cm y la altura 9,32 cm. El tamaño de nidada fue de 2 a 3 huevos. Otro nido a menor elevación, en la Selva Montana del Río Piedras (800 m) en el Parque Sierra de San

Javier, Tucumán, el 28 de octubre de 1989. El mismo contenía 2 huevos y uno de *Molothrus bonariensis.*Nidifica principalmenteen el Bosque Montano por arriba de los 1200 m y su período de nidificaciónabarca los meses desde octubre a marzo.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", 3 nidos con 3 huevos cada uno.

Huevos
Pone 3 huevos, blanco-crema con manchas pardas claras, pardas oscuras y grises, más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Dinelli (1918b): 22,0 a 24,7 x 16,0 a 17,2 X= 23,3 x 16,6 (N= 2)
Smyth (1928): 21,5 a 22,5 x 16,5 a 17,0
Pereyra (1951): 25,0 x 18,0
Salvador en De la Peña (2010b): 23,3 a 24,0 x 17,2 a 17,6 X= 23,6 x 17,4 (N= 3)
De la Peña (2013c): 23,5 a 24,6 x 17 a 17,7 X= 23,9 x 17,4 (N= 4)
Capllonch et al. (2014b): 21,8 a 23,7 x 15,7 a 16,8

Peso
Salvador en De la Peña (2010b):3,7 a 4,0 X= 3,8 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,190 a 0,220 X= 0,210 (N= 3)

PICHONES
Descripción
Capllonch et al. (2014b). En los nidos muestreados, todos loshuevos eclosionaron y al nacer, los pichones(n= 9) presentaron finos plumones grises en lacabeza y región central del dorso. Losprimeros canutos fueron gris oliváceo en eldorso y en el vientre, amarillos. El pico de todoslos pichones fue amarillo oro y el paladarrojo.


Cuesta del Clavillo.Catamarca.20-12-2000

Otros
Capllonch et al. (2014b). Los pichones presentaron parasitismopor moscas (probablemente del género *Philornis*),
cuyas larvas se ubicaron en la cabeza,garganta, comisuras y dorso.
Friedmann (1929). Capllonch et al. (2014b). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*



Más información:
Ruggera et al. (2014).Capllonch et al. (2014b)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cejas y líneas amarillas encerrando un "antifaz" negro. Ventralmente amarillo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Atlapetes citrinellus (Cabanis, 1883) entre los 1000 y los 2500 m de altura en el sureste de Jujuy, sur de Salta, Tucumán y Catamarca.
Observado en Buenos Aires y Córdoba.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Endémico de un área reducida de nuboselba (Yungas) en el noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Reinaudo (2003)

Catamarca
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Capllonch et al. (2014b); Carma (2009); De la Peña (2013c); Moschione (2005); Nores et al. (2000); Nores y Cerana (1990)

Observaciones: De la Peña (Los Varelas, dpto. Ambato, 12-03-1981)

Córdoba
Observaciones: Salvador, S. (Villa María, posiblemente escapada de cautiverio)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Camperi et al. (2013); Capllonch et al. (2014b); Di Giacomo et al. (2007); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988)

Salta
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Babarskas et al. (1995); Capllonch et al. (2014b); Moschione et al. (2013)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007); Capllonch et al. (2014b); Dinelli (1918); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Malizia et al. (1998); Ortiz et al. (2011, 2013); Ortiz y Aráoz (2014); Pereyra (1951); Rougés y Blake (2001)

Observaciones: De la Peña (Horco Molle, dpto. Capital, 11-05-1987)



FRUTERO YUNGUEÑO *Chlorospingus flavopectus* (Lafresnaye, 1840)

Otros nombres: Fruterito de cabeza parda. Tangará de ojo blanco.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14 cm.
Peso: Contreras (1983a): N= 1 (M) 15 g; Salvador (1988): N= 3 (H) X= 14,0 g (Rango 12,0 a 16,0), N= 1 (M) 15,0 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 6 X= 14,5 g (Rango 12,8 a 17,0)

Coloración. Pico pardo. Patas gris parduscas. Iris pardo
Corona, nuca y lados de la cabeza pardos. Dorsal olivácea. Manchas posoculares, blancas. Garganta blanquecina. Pecho, flancos y subcaudales, amarillos verdosos. Resto de la parte ventral blanquecino. Alas y cola, oliváceas.



HÁBITAT
Estrato medio y alto en bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Nidifica en Salta.

Cadena et al. (2007). Parque Nacional El Rey, dto. Anta, Salta, 21 nidos, en árboles, entre 4 y 22 m de altura (X: 13,1), no se observó el contenido.

Más información: Hilty (2011)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal olivácea. Manchas posoculares blancas. Banda pectoral amarilla.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Chlorospingus flavopectus argentinus Hellmayr, 1921entre los 1000 y los 2500 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.
SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Veintiseis subespecies. Entre 1000 y 2.500 metros en toda Centro América y Sudamérica siguiendo los Andes. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chlorospingus flavopectus argentinus Hellmayr (1921)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Nores e Yzurieta (1983a); Nores et al. (2000)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Contreras (1983a); Chebez et al. (1998); Fanjul et al. (2008, 2009); Hartert y Venturi (1909); Hellmayr (1921); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988)



Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1988, 1990); Coconier et al. (2007); Hartert y Venturi (1909); Moschione et al. (2013); Salvador y Di Giacomo (2014)

Tucumán
Citas:Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Echevarría et al. (2011b); Esteban (1953); Lucero (1983); Malizia et al. (1998); Ortiz et al. (2011, 2013); Ortiz y Aráoz (2014); Rougés y Blake (2001); Soria et al. (2010)

Observaciones: De la Peña (Horco Molle, dpto. Capital, 12-05-1987)

AMBIENTES, LUGARES, EXCURSIONES
2000-2001-2005-2006-2007-2008-2012-2015



2000. Península Valdés. Chubut.


2000. Puerto Madryn. Chubut. Amanecer.


2000. Caleta Valdés. Chubut.


2000. Calchaquí. Santa Fe.




2001. Esperanza. Santa Fe.





2001. Campo Andino. Santa Fe.



2001. Esperanza. Santa Fe.



2005. Colón. Entre Ríos. Hermano Raúl.



2006. La Calera. Córdoba.




2006. Esperanza. Santa Fe.



2007. Ascochinga. Córdoba.



2007. Ongamira. Córdoba.



2007. Ascochinga. Córdoba. Amanecer.



2008. J. Arauz. Santa Fe.





2008. Río Paraná. Diamante. Entre Ríos.



2008. Río Salado. Esperanza. Santa Fe.



2012. Diamante. Emntre Ríos.



2012. Esperanza. Rio Salado. Santa Fe.



2015. Jesús María. Córdoba. Amanecer.



2015. Jesús María. Córdoba.

PEPITEROS, REINAMORAS

FAMILIA: CARDINALIDAE

Aves de pico corto y fuerte o cónico.

Se alimentan de frutas, semillas, hojas, flores, granos, larvas, insectos.

Nidifican en los árboles, arbustos, enredaderas.

Ponen hasta 2 ó 3 huevos.

Frecuentan arboledas, montes, selvas.

FUEGUERO COMÚN *Piranga flava* (Vieillot, 1822)

Otros nombres: Abejero. Frutero rojo. Fueguero. Loica. Naranjero rojo. Piranga. Piranga común. Tordo colorado. Virreina colorada.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17 cm
Peso: Fiora (1934): N= 1 X= 30,0 g; Contreras (1983c): N=2 (M) 33,5 y 32,7g, N= 2 (H) 32,6 y 34,4 g; Camperi (1992a): N= 1 (M) 36,7 g, N= 1 (H) 36,9 g; Salvador (2014a): N= 1 (M) 32,4 g
Coloración. Pico: maxilar negro, mandíbula córneo o amarillento. Patas gris parduscas. Iris pardo.
Macho. Rojo anaranjado.
Hembra. Dorsal amarilla olivácea. Ventral amarilla. Alas y cola pardas con las plumas orilladas de amarillento.

COMPORTAMIENTO
Come abejas que captura al vuelo.

Alimentación
Baliño (1984). **Vegetales:** Fruto *Melia azedarach.*
Genise et al. (1993).**Vegetales:** Savia*Aspidosperma quebracho-blanco, Prosopis flexuosa.*
Di Giacomo (2001). **Insectos.**
Miatello et al. (1994). **Insectos:**Abejas.
Bodrati (2006b).**Vegetales:** Fruto de *Plinia trunciflora.*
Montaldo y Haene (2010).**Vegetales:** Fruto *Blepharocalyx salicifolius.*
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Fruto de *Sapium haematospermum***. Insectos:** Hymenoptera (Vespidae: larvas).
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.




Voces
Straneck (*in litt*.). La voz de contacto es un Síep ... síep ...

HÁBITAT
Estrato alto ensabanas, bosques, selvas. También arboledas en áreas urbanas y periurbanas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones, Formosa, Chaco.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

El nido tiene forma de taza. Sostenido en las ramas. Emplea líquenes y raicillas. Internamente cerdas.Expuesto. Elaborado.



Bertoni, A. de W.(1918c). Misiones, nido en octubre.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, un nido en setiembre con 3 huevos y uno en diciembre con 3 huevos propios y 2 de *Molothrus bonariensis*.
De la Peña (2013c). El Palmar, dpto. San Fernando, Chaco, 13-11-1999, nido en Quebracho colorado, a 5 m del suelo, 3 huevos (Localizado por M. Uranga)
Medidas: Diámetro total: 9,5 cm. Diámetro interno: 6 cm. Profundidad: 4 cm. Alto: 6,5 cm.


El Palmar.Chaco.13-11-1999

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, azules verdosos con pintas y manchitas marrones rojizas, pardas y gris violáceo, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Di Giacomo (2005h): 23,7 a 25,7 x 16,8 a 17,4 X= 24,4 x 17,0 (N= 5)
De la Peña (2013c): 25,2 a 25,8 x 18 a 18,1 X= 25,4 x 18,0 (N= 3)
Pesos
Di Giacomo (2005h): 3,5 a 3,9 X= 3,7 (N= 5)

Otros
Di Giacomo (2005h).Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: rojo anaranjado. Hembra: amarilla, olivácea en la parte dorsal.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Piranga flava flava (Vieillot, 1822)desde el norte del país, excepto Misiones hasta San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y noreste de Buenos Aires, y *Piranga flava saira* Spix, 1825en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Amplio rango de distribución que se extiende desde el suroeste de Estados Unidos al centro de Argentina. Aunque es clasificado como una sola especie existe evidencia como para considerarlo como 3 especies o grupos de subespecies: *P. hepatica* que va desde Estados Unidos a Nicaragua, *P. lutea* desde Costa Rica al norte de Sud América y *P. flava* para la especie más meridional. Comprende: Estados Unidos, Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Piranga flava flava (Vieillot, 1822)

Buenos Aires
Citas: Bodrati et al. (2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Babarskas et al. (2003); Lucero et al. (2011); Montaldo y Claver (1986); Mérida y Bodrati (2006); Moschione (1989); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Vides Almonacid (1999)

Observaciones: De la Peña (La Puerta, dpto. Ambato, 11-03-1981)

Chaco
Citas: Contreras (1983c); De la Peña (2013c); Moschione y Bishels (2004)
Observaciones: De la Peña (Cerrito, dpto. Bermejo, 06-05-1988)

Córdoba
Citas: Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)
White (1883b)

Observaciones: De la Peña (Carlos Paz, dpto. Punilla, 25-05-01 ; Chancani, dpto. Pocho, 30-03-02)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1983c, 1987b); Darrieu y Camperi (1994**);** Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Raffo et al. (2008)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Di Giacomo(2005h); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Serié y Smyth (1923); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) ; Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Fiora (1934); Mazza y Fiora (1930, 1932); Moschione y Segovia (2005)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Giacomelli (1923); Koslowsky (1895)

Misiones
Citas:Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Mendoza
Citas: Haene et al. (1995)

Salta
Citas:Alabarce y Lucero (1977); Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (Cafayate, dpto. Cafayate, 07-02-1977)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene et al. (1995); Luceroy Chebez (2011); Nores e Yzurieta (1982)b.

San Luis
Citas: Contreras (1979b); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993).

Santa Fe
Citas: De la Peña et al. (2011f, 2013c); Giai (1950)

Santiago del Estero
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007); Capllonch y Aráoz (2007); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Luceroet al. (2002); Malizia et al. (1998); Ortiz et al. (2011, 2013)**;** Ortiz y Aráoz (2014)

Observaciones: De la Peña (Horco Molle, dpto. Capital, 12-05-1987)

Piranga flava saira Spix, 1825

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Navas et al. (1992)

FUEGUERO MORADO *Habia rubica* (Vieillot, 1817)



Otros nombres: Tangará copetón. Tié morado.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18 cm.
Peso: Storer (1989): N= 3 (M) X: 34,7 g (Rango 34 a 35), N= 3 (H) X: 32 g (Rango 30 a 34); Hilty (2011): (M) 27,7-42,9g; (H) 27,5-37 g
Coloración: Pico: maxilar pardo, mandíbula pálida. Patas gris parduscas. Iris pardo.
Macho. Pardo rojizo. Semicopete rojo. Garganta y pecho más rojizos. Alas y cola pardas con las plumas orilladas de rojizo.
Hembra. Dorsal parda. Corona canela. Ventral pardo ocrácea.

HÁBITAT
Estrato bajo en selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Hilty (2011)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: pardo rojizo. Hembra: parda. Corona canela.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Habia rubica rubica (Vieillot, 1817) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Diecisiete subespecies.Se extiende desde Méjico hasta Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Habia rubica rubica (Vieillot, 1817)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2009); Martínez Gamba (2014); Pereyra (1951); Straneck (1990g)

REY DEL BOSQUE *Pheucticus aureoventris* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: El overo. Reina del bosque. Reina mora. Sacha lora. Zorzal overo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 20 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 10 X= 55,0 g (Rango 50,0 a 59,0); Salvador (1988): N= 1 (M) 52,0 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 18 (?) X: 53,9 g (Rango 46 a 61); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 51,0 y 54,5 g



Coloración. Pico: maxila negra, mandíbula gris azulina. Patas grises azulinas. Iris pardo.
Macho. Cabeza, garganta, pecho y parte dorsal negros. El resto de la parte ventral amarillo con espaciadas manchas negras en los flancos. Remeras y cubiertas alares negras con manchas blancas. Cubiertas menores amarillas. Cola negra con la punta de las plumas externas blanca.
Hembra. Dorso, alas y cola similares al macho pero pardos, no negros. Pecho amarillo con puntos negros.

COMPORTAMIENTO
Caza insectos al vuelo.


Alimentación
De la Peña (2010c).**Insectos:**Hormigas voladoras.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Fruto de Tala *Celtis tala.*
De la Peña en De la Peña y Salvador 2010). **Insectos:**Mariposas.

HÁBITAT
Quebradas húmedas, bosques.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nido en Tucumán, Catamarca, San Luis.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

El nido tiene forma de tazón. Es construido con tallos de enredaderas. Internamente fibras finas. Los sostiene en las ramas de arbustos o de árboles.Expuesto. Elaborado.



Dinelli (1924). Tucumán, nidos en diciembre a enero.
Friedmann (1929). Tucumán, Girard nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Masramón (1980). Nidifica en San Luis.
De la Peña (2013c). Cuesta del Clavillo, dpto. Andalgalá, Catamarca, 18-12-1999, dos nidos en arbustos, a 3 y 2,70 m del suelo, con 2 pichones y 2 huevos respectivamente. Medidas: Diámetro total: de 10 a 12 cm. Diámetro interno: de 5 a 7 cm. Profundidad: de 5,5 a 6 cm. Alto: de 8 a 10,5 cm.



Huevos
Pone 2 huevos, ovoidales, verdosos con finas pintas castañas, más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Dinelli (1924): 28,0 x 20,0
De la Peña (2013c): 25 a 25,5 x 18,8 a 19,4 X= 25,2 x 19,1 (N= 2)

Peso
De la Peña (2013c): cáscaras 0,290 X= 0,290 (N= 2)

Observaciones
De la Peña (2013c). El 18-12-1899 en la Cuesta del Clavillo, una pareja alimentaba a un juvenil.
Otros
Friedmann (1929). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.




Cuesta del Clavillo. Catamarca. 18-12-1999

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico grueso. Macho: negro con manchas blancas en las alas. Hombros, inferior del pecho y abdomen amarillos. Cola negra con la punta blanca en las plumas externas. Hembra: pardusca. Pecho con puntos negros.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Pheucticus aureoventris aureoventris (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837) entre los 1000 y los 2500 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, La Pampa, Formosa y Chaco. Observado también en Santa Fe.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinco subespecies. Sud América por el oeste. Comprende Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Pheucticus aureoventris aureoventris (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Buenos Aires
Citas: Montaldo y Claver (1986); Narosky e Yzurieta en Naroskyy Di Giacomo (1993)

Catamarca
Citas: Alabarce et al. (1990); Alderete y Capllonch (2012); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); De la Peña (2011a, 2013c); Nores y Cerana (1990)

Chaco

Citas: Chebez y Casañas (1999); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba
Citas: Baldo y Ordano (1993); Brandolín et al. (2007); Castellanos (1934); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Pereyra(1923a); Salvador y Di Giacomo (2014); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas:Giraudo et al. (2006)

Formosa
Citas:Contreras (1987c); Esteban (1953); Gorleri et al. (2009)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Fiora (1934); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988); Salvadori (1897); Straneck (1990f)

Observaciones: De la Peña (El Carmen, dpto. El Carmen, 11-02-1983)

La Pampa
Citas: Willianson (1971)

La Rioja
Citas:Camperi et al. (2008); Freiberg (1943); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895); Lobo Allendeet al. (2014); Nores y Cerana (1990)

Salta
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Babarskas et al. (1995); Camperi (1988, 1990); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b); White (1882)

Observaciones: De la Peña (Camino de Cornisa, dpto. La Caldera, 02-02-1977)

Santa Fe
Citas: Marino y Ordano en Chebez y Casañas (1999)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene et al. (1995); Lucero (2012h)

San Luis
Citas: Casares (1944); Contreras (1979b); Masramón (1979, 1983); Nellar Romanella (1993)

Santiago del Estero
Citas: Ferrari et al. (2004); Nores e Yzurieta (1982a.); Nores et al. (1991); Nores y Cerana (1990)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007); Dinelli (1924); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011, 2013); Ortiz y Aráoz (2014)

REINAMORA ENANA *Amaurospiza moesta* (Hartlaub, 1853)

Otros nombres: Amaurospiza. Arrocero azul. Corbatita negra.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12,5 cm.
Peso: Belton (1985): N= 2 (M) 13 y 13,5 g, N= 3 (H) 13 a 14 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 1 (?) 14 g.
Coloración. Pico y patas negros azulados. Iris pardo.
Macho. Negro azulado, sin brillo. Alas y cola, negras. Cubiertas internas de las alas blancas.
Hembra. Dorsal parda rojiza. Ventral canela. Alas y cola pardas.



HÁBITAT
Estrato bajo y medio en selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: negro azulado. Hembra: parda. Ventralmente canela.
El macho se diferencia del Volatinero por ser de mayor tamaño y negro azulado sin brillo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Amaurospiza moesta (Hartlaub, 1853) en Misiones y noreste de Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monitípica. Endémico de la selva atlántica o paranaense en el sureste de Brasil, noreste de Argentina y este de Paraguay

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Capllonch et al. (2005a, 2005c); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1996)

Misiones
Citas: Areta y Bodrati (2008); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Dabbene (1918); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauciok y Balndo (2004); Krauczuk (2009); Partridge (1954); Straneck en Chebez y Rolón (1989)Straneck (1990h)

REINAMORA CHICA *Cyanoloxia glaucocaerulea* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres. Azulejo. Azulejo chico. Picogordo chico. Reina mora chica.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Belton (1985): N= 3 (M) 16 a 19 g; Storer (1989): N= 1 (M) 16 g, N= 1 (H) 18 g; Orenstein (2011): 16-19,5 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 1 (M) 17 g, N= 1 (H) 15 g.
Coloración. Pico: maxila negruzca, mandíbula gris. Patas pardas. Iris pardo.
Macho. Celeste. Alas parduscas. Cubiertas alares celestes. Cola negra con las plumas externas ribeteadas de celeste.
Hembra. Dorso pardo. Ventralmente canela. Alas pardas ribeteadas de canela. Cola parda.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Bosques, selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Entre Ríos, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Semiesfera de pajitas y palitos.



Uranga (*in litt*.). El Palmar, dpto. Colón, Entre Ríos, 01-12-2012, nido con 3 huevos.
Hartert y Venturi (1909). Barracas al Sud, Buenos Aires, nidos en noviembre-diciembre.
Pereyra (1938b). Nidifica en el noreste de la provincia de Buenos Aires.
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando.

Huevos
Pone de 3 a 4 huevos, celeste pálido con pintas rojizas distribuidas por toda la superficie.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 18,0 a 21,0 x 14,0 a 15,0
Pereyra (1938b): 21,0 x 15,0



El Palmar. Entre Ríos. 01-12-2012
Foto: Máximo Uranga

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: celeste. Alas y cola oscuras. Hembra: parda y canela.
La hembra es parecida a la hembra dela Reinamora grande pero es de menor tamaño y el pico es más chico y más curvado.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Cyanoloxia glaucocaerulea (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837) en Misiones, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y noreste de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica.Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (1997, 2006b); Dabbene (1919b); Darrieu y Camperi (2001a); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodrati (2006b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Corrientes
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1996); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Bodrati y Salvador (2015a); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Straneck (1990c)

Formosa
Citas:Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2009)

Santa Fe
Citas: López-Lanús et al. (2013d)

REINAMORA GRANDE *Cyanocompsa brissonii* Lichtenstein, 1823

Otros nombres: Pepitero. Picogordo guaro. Reina mora.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16,5 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 18 X= 27,5 g (Rango 27,0 a 28,0); Contreras (1979f): N= 2 (M) 22,3 y 20,0 g, N= 1 (H) 20,5 g (*sterea*), N= 1 (H) 21,3 g (*argentina*); Contreras y Davies (1980): N= 3 (M) X= 26,1 g (Rango 25,6 a 27,2); Salvador (1990a): N= 1 (H) 24,5 g; Camperi (1992a): N= 2 (M) 26,0 y 26,3 g, N= 1 (H) 22,1 g; Di Giacomo (2005h): N= 1 (M) 22,7 g, N= 1 (H) 21,7 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 1 23,0 g. (*sterea*), Alderete y Capllonch (2012): N= 22 X= 26,7 g (Rango 22,0 a 30,0) (*argentina*), Alderete y Capllonch (2012): N= 32 X= 24,8 g (Rango 18,0 a 30,0) (*argentina*); Salvador (2014a): N= 2 (M) 24,3 y 25,3 g, N= 2 (H) 24,5 y 26,8 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (H) 23 g

Coloración. Pico negruzco. Patas grisáceas. Iris pardo oscuro.
Macho. Azul. Frente, corona anterior, regiones perioculares y malares y "hombros" celestes. Alas y cola negras.
Hembra. Dorso pardo rojizo. Ventralmente canela. Alas y cola pardas.

COMPORTAMIENTO
De la Peña (2011a). Recolecta alimentos desde el suelo hasta los 5 m. de altura.
Se alimenta de frutos, pimpollos, hojas, semillas (De la Peña, y Pensiero, 2003)




Alimentación
Zotta (1932). **Vegetales:**Semillas. **Insectos:**Coleópteros. **Otros:**Arena.
De la Peña y Pensiero (2003). **Vegetales:** Fruto *Celtis tala.* Semilla *Cenchrus myosuroides.* Pimpollo *Geoffroea decorticans.*
Di Giacomo (2005h).**Vegetales:** Fruto de *Celtis iguanea, Fagara naranjillo.***Insectos:** Hormigas aladas (*Acromyrmex* sp.).
Bodrati (2006b). **Vegetales:** Fruto *Plinia trunciflora.*
De la Peña (2010c). Pimpollo *Celtis tala.*
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semilla *Prosopis ruscifolia.* Fruto *Ziziphus mistol.*
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semilla *Sorghum* sp.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Sabanas, bosques, selvas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, San Luis, Formosa, Corrientes, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N



El nido tiene forma de taza, es sostenido en ramas de árboles. Emplea fibras vegetales. Internamente fibras finas. Semioculto. Elaborado.

Friedmann (1929). Tucumán Girard nido parasitado por *Molothrus bonariensis* Friedmann et al. (1977). Tucumán Norisnido parasitado por *Molothrus bonariensis* .
Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, un nido.
Dinelli (1924). Tucumán, nidifica a baja altura.
Pereyra (1951). Manchalá, dpto. Famaillá, Tucumán, Girard localizó un nido el 3 de noviembre.
Masramón (1980). Nidifica en San Luis.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre octubre y febrero. Se estudiaron 9 nidos.
De la Peña (2013c).Malabrigo, Gral. Obligado, Santa Fe, 13-12-1991, nido a 3 m del suelo, 2 huevos.
Medidas: Diámetro total: 9 cm. Diámetro interno: 5,5 cm. Profundidad: 5 cm. Alto: 7,5 cm.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", 3 nidos con 2 huevos cada uno.



Huevos
Pone 2 huevos, ovoidales, celestes con finas pintas castañas distribuidas por toda la superficie pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 22,0 a 24,0 x 15,0 a 16,0
Dinelli (1924): 22,0 x 16,0 y 24,0 x 16,0
Smyth (1928): 22,0 a 23,5 x 16,0 a 17,0
Pereyra (1951): 22,0 x 15,0
Di Giacomo (2005h): 20,3 a 21,8 x 15,5 a 17,2 X= 20,3 x 21,8 (N= 9)
De la Peña (2013c):22,3 a 22,6 x 16,8 a 17,2 X= 22,4 x 17 (N= 2)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 2,5 a 3,1 X= 2,7 (N= 9)
De la Peña (2013c): 3,1 X= 3,1 (N= 2)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,160 X= 0,160 (N= 2)

Generalidades
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. La pareja alimenta a los pichones y permanecen en el nido entre 16 días.

Otros
Haro (2002). Un ejemplar con Albinismo total.
Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Friedmann (1929). Friedmann et al. (1977). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: azul con la frente y “hombros” celestes. Pico grueso, negro. Hembra: parda rojiza y canela. Diferenciarla de la hembra de la Reinamora chica.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Cyanocompsa brissonii sterea (Oberholser, 1901) en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y noreste de Buenos Aires y *Cyanocompsa brissonii argentina* (Sharpe, 1888)desde el norte del país al oeste de los ríos Paraguay y Paraná hasta Córdoba, San Luis, La Rioja y San Juan.


Esperanza.Santa Fe.07-07-1972. Hembra


Malabrigo. Santa Fe. 13-12-1991



Esperanza. Santa Fe. 27-06-2009. Macho

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cinco subespecies. Poblaciones aisladas, una en Venezuela y Colombia, la otra de extiende por el este de Sudamérica entre Amazonia y la estepa patagónica. Comprende: Venezuela, Colombia, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Cyanocompsa brissonii sterea (Oberholser, 1901)

Buenos Aires


Citas: Babarskas et al. (2003);Bodrati et al. (1997, 2006b); Chimento et al. (2012); Darrieu y Camperi (2001a); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Moschione (1986); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pugnali y Chamorro (2008); Soave et al. (1999)

Corrientes

Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b, 1990b); Darrieu y Camperi (1996); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos

Citas: Abadie (1988); Baliño (1984); Camperi (1992); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Navas (1982); Raffo et al. (2008)



Misiones

Citas: Alderete y Capllonch (2012); Bodrati (2006b); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Salvador y Bodrati (2013a); Straneck (1990e)

Cyanocompsa brissonii argentina (Sharpe, 1888)

Catamarca

Citas:Alderete y Capllonch (2012); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Vides Almonacid (1999); White (1882)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 12-03-1981)

Chaco
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Bodrati y Pietrek (2000); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba
Citas:Dardanelli et al. (2006b); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Jesús María, dpto. Colón, 16-11-2005; Balnearia, dpto. San Justo, 15-07-2006)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Lucero(1982); Olrog (1976); Moschione y Segovia (2005); Salvadori (1897); Zotta (1932)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1982, 1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895)

Salta
Citas: Alabarce y Lucero (1977); Alderete y Capllonch (2012); Babarskas et al. (1995); Camperi (1988, 1990); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b); Salvador (1990a); Salvador y Di Giacomo (2014)

Observaciones: De la Peña (San Ramón de la Nueva Orán, 02-02-1977; Yatasto, 06-02-1983)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene et al. (1995) ; Herrera et al. (2013)

San Luis
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Contreras y Davies (1980); Haro (2002); Masramón (1979, 1983); Nellar Romanella (1993). ; Partridge (1953c)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007); Dinelli (1924); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011, 2013); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Pereyra (1951); Soria et al. (2010)

PEPITERO NEGRO *Saltator fuliginosus* (Daudin, 1800)



Otros nombres: Picogordo pechinegro. Pico pimienta. Pico pimiento. Picudo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 21,5 cm.
Peso: Belton (1985): N= 1 (M) 58 g
Coloración. Pico rojo. Patas pardo grisáceas. Iris pardo.
Negro azulado con la cara, garganta, alas y cola, negras.
La hembra con la garganta gris.

COMPORTAMIENTO

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es una sucesión de silbos: Juitiujueo .. chiveochicichieo ....

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Negro con el pico rojo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Saltator fuliginosus (Daudín, 1800) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se halla en la Selva Atlántica o Paranaense en el este de Brasil, sureste de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Martínez Gamba (2014)

PEPITERO GRIS *Saltator coerulescens* Vieillot, 1817

Otrps nombres: Chiviro. Chiviro de isla.Chiviro de la isla.Chiviro grande. Gran cantor. Habero. Juan chiviro. Juan islero. Juancito chiviro. Juanchito chiviro. Pepitero plomizo. Pico grueso.

DESCRIPCIÓN
Largo: 21 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 7 X= 59,2 g (Rango 57,0 a 62,0); Contreras (1979f): N= 2 (H) 75,3 y 62,5 g, N= 1 (?) 56,0 g; Contino (1980): 45 g; Salvador (1990a): N= (?) 66,5 g; Camperi (1992a): N= 3 (M) X= 64,3 g (Rango 55,0 a 73,0), N= 3 (H) X= 74,7 g (Rango 72,0 a 77,2 g; Darrieu y Camperi (1996): N= 1 (M) 66,7 g; **Di** Giacomo (2005h): N= 6 X= 58,2 g (Rango 51,0 a 65,5); Alderete y Capllonch (2012): N= 41 X= 57,0 g (Rango 50,0 a 68,0); Salvador (2014a): N= 5 (?) X= 61,1 g (Rango 55,6 a 64,2); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 3 X= 53,2 g (Rango 50,0 a 57,5)

Coloración. Pico negro. Patas grisáceas. Iris pardo.
Cabeza y parte dorsal grises. Cejas blanquecinas. Garganta ocrácea orillada de negruzco. Resto de la parte ventral gris y canela. Alas y cola negruzcas.

COMPORTAMIENTO
Anda generalmente en pareja. Bullanguero. Inquieto.
De la Peña (2011a). Se alimenta desde el suelo hasta los 6 m. Recolecta en el suelo, estrato herbáceo, ramas y follaje. Tritura y descarta la semilla de Tala, Paraíso. A los frutos de Ligustro los tritura y traga o a veces tira la semilla.

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Hola de Cina cina (*Parkinsonia aculeata*)
Baliño (1984). **Vegetales:** Fruto Melia azedarach.
Beltzer (1988c). **Vegetales:** Frutos *Cayaponia martiana, Muehlenbeckia sagittifolia, Solanum chroniotrichum, Urera aurentiaca*. Semillas *Passiflora coerulea*, *Polygonum* sp*.* **Insectos:** Carabidae Hormigas (*Acromyrmex* sp.).
Rodriguez et al. (1995). **Vegetales:** Brotes. Flores. Frutos. Hojas.
Ordano et al. (1999). **Vegetales:** Semillas *Solanum* sp.
De la Peña y Pensiero (2003). Vegetales: Frutos *Holmbergia tweedii, Cayaponia podanta, Salpichroa origanifolia, Sapium haematospermum, Schinus longifolius, Morus alba, Celtis ehrenbergiana*. Hoja *Cestrum parqui, Araujia brachystephana*. Flor *Geoffroea decorticans*. Fruto y pimpollo *Muehlenbeckia sagittifolia.*
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:** Fruto *Celtis iguanea, Cissampelos pareira, Citrus* sp., *Chrysophyllum gonocarpum*, *Fagara naranjillo*. Hoja y fruto de *Guettarda uruguensis*. Flor y fruto *Ipomoea amnicola*. Fruto *Lycium moronguii*, *Melia azedarach*, *Psidium* guajava, *Vassobia breviflora*, *Xylosma venosum*. Fruto y hoja *Sapium haematospermum, Schinus fasciculata,* Hoja *Schubertia grandiflora.* Flor *Tabebuia nodosa*. **Insectos:** Hormigas aladas (*Acromyrmex sp.*)
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Fruto *Morus alba, Sapium haematospermum.* **Insectos:** Coleoptera (Elateridae). Hemiptera. (Pentatomidae). Hymenoptera (Formicidae). Orthoptera (Tettigonidae)
De la Peña (2011a). **Vegetales:** Frutos *Asparagus setaceus*, *Celtis ehrenbergiana, Citrus reticulata, Citrus sinensis, Grabowskia duplicata, Holmbergia tweedii, Ligustrum lucidum, Melia azedarach, Morus alba, Muehlenbeckia sagittifolia, Phytolacca dioica*, *Salpichroa origanifolia, Solanum argentinum, Sapium haematospermum, Schinus longifolia.* Fruto-semilla *Styphnolobium japonicum.* Pulpa y Semilla *Carica papaya*. Pulpa *Citrus grandis*. Hoja *Cayaponia podantha, Cestrum parqui, Erythrina crista-galli, Lycium boerhaviaefolium, Holmbergia tweedii, Araujia brachystephana, Muehlenbeckia sagittifolia, Sclerophylax spinescens, Solanum amygdalifolium, Tessaria integrifolia.* Flor y semilla *Araujia brachystephana*. Semilla arilada *Passiflora coerulea*. Semilla *Ipomoea cairica*.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.). Emite un canto complejo y melodioso. Suele cantar a dúo: Siptiplitipiehpieh ... siptiplitipi piehpieh ...

HÁBITAT
Montes,bosques, matorrales y arbustos en las riberas de ríos y arroyos, selvas en galería.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N



El nido tiene forma de tazón, semiesférico, es sostenido en ramas de arbustos o enredaderas. Emplea en la construcción fibras vegetales, tallos. Internamente hojas, a veces algunas cerdas.Semioculto. Elaborado.

Dinelli (1924). Tucumán, nido en noviembre y diciembre. Un nido estaba parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Smyth (1928). Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Friedmann (1929). Tucumánnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Friedmann (1929). Tucumán Girardnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pereyra (1938b). Noreste de la provincia de Buenos Aires, nidifica desde octubre a noviembre.
Contino (1980). Nidifica en el noroeste, pone 2 ó 3 huevos.
Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 3 nidos.
Pautasso (2002b).Reserva Urbana de la Ciudad Universitaria UNL “El Pozo”, dpto. La Capital, Santa Fe, 25-11-2000, nido con 2 pichones.
Di Giacomo (2005h).Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre setiembre y febrero. Se estudiaron 50 nidos. Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Salvador (2012f). Nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 27, entre el 07-11-1971 y el 07-11-2003, uno en Córdoba, el resto en provincia de Santa Fe. Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Tazón o semiesfera de tallos, fibras vegetales. Internamente hojas, raicillas, algunas cerdas.
Medidas: Diámetro total: de 11 a 16 cm. Diámetro interno: de 8 a 9 cm. Profundidad: de 3 a 5 cm. Alto: de 6 a 9 cm.
Altura: Nido más bajo: 1,70 m. Nido más alto: 3,80 m.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, 6 nidos con 3, 2,2, 2, 2 y 1 huevos cada uno.





Huevos
Pone 2 huevos, ovoidales, verde-azulados con líneas y puntos negros en el polo mayor.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 26,5 a 28,5 x 18,5 a 20,5
Dinelli (1924): 29,0 x 19,0 y 26,5 x 18,5
Smyth (1928):25,0 a 30,0 x 19,0 a 20,5
Pereyra (1938b): 33,0 x 21,0
Contino (1980): 30,0 x 19,0
Di Giacomo (2005h): 23,2 a 31,4 x 19,7 a 20,7 X= 23,2 x 31,4 (N= 52)
De la Peña (2013c): 24,7 a 31,5 x 19,3 a 20,5 X= 28,5 x 19,8 (N= 6)

Pesos
Contino (1980): 5,5

Di Giacomo (2005h): 4,3 a 6,5 X= 5,4 (N= 52)
De la Peña (2013c): 5,3 X= 5,3 (N= 1)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,269 a 0,372 X= 0,346 (N= 6)

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c).Nacen con los ojos cerrados. Escaso plumón gris. Cavidad bucal, rosado fuerte. Comisura y bordes internos y externos, amarillo. Pico amarillento. Piel dorsal gris. Ventral naranja-amarillenta.

2 días

Tienen la piel ventral desnuda, verdosa-amarillenta. Dorsalmente verdosa, con plumón largo, gris, en la cabeza, dorso posterior, en dorsal de las alas (espaciado).

Vainas de las plumas alares, grisazulinos. Alrededor de la cloaca, anaranjado.

Borde de la mandíbula y del maxilar, amarillo. La comisura también. Dorsalmente el maxilar es oscuro, el resto más claro.

El paladar tiene la parte anterior amarilla, la parte posterior y el resto del interior de la boca, rosado. Lengua rosada.

3 días

Ojos cerrados.

5 días

Ojos abiertos. Escaso plumón. Vainas de 3-4 mm. en zonas ptéridas.

8 días

Pico verdoso. Comisura amarilla. Emplumado. Ceja amarillenta.

10 días

Cabeza, dorsalmente y cubiertas alares, verdes. Flancos ocráceos. Cavidad bucal y lengua, rosadas. Comisura amarilla. Parpados superiores amarillentos. Patas verdosas. Uñas amarillentas.

Generalidades

Contreras (1990b). El período de incubación es de 13-14 días.

El pichón permanece en el nido 15-16 días.

Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 14 días. Permanecen en el nido entre 12 a 14 días.

De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 8 a 9 días. Período de incubación 13-14 días. Los huevos son puestos en días corridos. Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido 19 días.

Otros

Antoniazzi et al. (2011). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

Dinelli (1924). Smyth (1928). Friedmann (1929). Salvador (2012f).Di Giacomo (2005h).De la Peña (2013c). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

Más información: De la Peña (2013c)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Coloración general gris con tono canela en la parte ventral. Cejas blanquecinas. Garganta ocrácea orillada de negruzco. Pico negro.

Diferenciarlo del Pepitero verdoso y del Pepitero picudo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Saltator coerulescens coerulescens Vieillot, 1817desde el norte del país hasta La Rioja, Córdoba, Santa Fe y norte de Buenos Aires.



Esperanza.Santa Fe.18-12-1990 Nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*



Esperanza.Santa Fe.23-12-2004. Juvenil



Jesús María.Córdoba. 01-08-2006



Esperanza.Santa Fe.14-05-2008



Esperanza. 01-08-2008. Comiendo Ligustro



Esperanza. 31-08-2015. Come hojas de Duraznillo

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Trece subespecies. Amplia área de distribución desde Mejico hasta Argentina y Uruguay.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Saltator coerulescens coerulescens Vieillot, 1817

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Durnford (1878); Klimaitis (1977c); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Soave et al. (1999)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Vides Almonacid (1999)

Observaciones: De la Peña (La Viña, dpto. Paclín, 30-01-1977)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005, 2008a); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); De la Peña (2013c); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Ascochinga, dpto. Colón, 18-02-2007; Jesús María, dpto. Colón, 28-08-2008 ; 01-10-2009)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz (2004, 2008a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b, 1990b); Darrieu y Camperi (1996); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008); White (1882)

De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979; Paso de los Libres, dpro. Paso de los libres, 11-12-2002)

Entre Ríos
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi (1992); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b, 2013c); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001, 2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Pereyra (1927e); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Straneck (1990e); Zapata (1975)

Formosa
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Chatellenaz (2008a); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Grant (1911c); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Ordano et al. (1999); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014)

Jujuy
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Fiora (1934); Hellmayr (1938); Moschione y Segovia (2005); Salvadori (1897)

La Rioja
Citas:Bodrati y Ferrari (2014)

Misiones
Citas: Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Heinonen y Chebez (1989); Krauczuk (2005, 2009); Navas y Bó (1993)

Salta
Citas:Alabarce y Lucero (1977); Alderete y Capllonch (2012); Babarskas et al. (1995); Camperi (1988); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013); Salvador (1990a)White (1882)

Santa Fe
Citas:Antoniazzi et al. (2011); Beltzer (1986c, 1988c); Beltzer et al. (2003-2004); De la Peña (1981a, 2002, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Alderete y Capllonch (2012); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Aráoz (2007); Dinelli (1924); Lucero (1983); Luceroet al. (2002); Malizia et al. (1998); Ortiz et al. (2011, 2013); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Soria et al. (2010)

PEPITERO VERDOSO *Saltator similis* d´Orbigny y Lafresnaye, 1837

Otros nombres: Chiviro verde. Pico de fierro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 21 cm.
Peso: Darrieu y Camperi (1996): N= 3 (M) X: 46,8 g (Rango 46 a 47,3), N= 1 (H) 52 g; Orenstein (2011): 36-54 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 4 (?) X: 49,5 g (Rango 45 a 55)
Coloración. Pico y patas grises. Iris pardo.
Dorso gris con tono oliva. Largas cejas blancas. Líneas malares oscuras. Garganta blanquecina. Resto de la parte ventral gris ocráceo. Alas pardas oscuras con las barbas externas y las cubiertas olivas. Cola parda oscura.

COMPORTAMIENTO
De la Peña (2011a). Recolecta alimentos desde el suelo hasta los 6 m.



Cayastá.Santa Fe.11-12-2007

Alimentación
Baliño (1984).**Vegetales:** Fruto *Melia azedarach.*
De la Peña y Pensiero (2003). **Vegetales:** Hoja *Araujia brachystephana*.
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:** Flor, Hoja *Brunfelsia australis*. Fruto *Celtis iguanea, Cestrum strigillatum, Lycium moronguii, Urera baccifera.*
Olson y Alvarenga (2006). **Insectos:** Isoptera (Termitas).
Bodrati (2006b). **Vegetales:** Fruto *Plinia trunciflora.*
De la Peña (2011a). **Vegetales:** Fruto *Carica papaya, Celtis ehrenbergiana, Citrus reticulata, Citrus sinensis, Ligustrum lucidum, Phytolacca dioica, Solanum boerhaviaefolium*. Pulpa *Citrus grandis*. Hoja *Araujia brachystephana*.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.).El canto es una frase silbada: Siu sidsio Yíiiioohhh ...

HÁBITAT
Bosques, selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Chaco, Formosa, Corrientes.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	



Semiesfera de palitos y fibras vegetales.

Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 4 nidos.
Di Giacomo (2005h).Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, un nido en octubre y otro en noviembre, con 3 huevos cada uno.
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Provincial Pampa del Indio, Chaco, Bodrati localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*

Huevos
Pone 3 huevos de color celeste con manchitas negras en el polo mayor.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 21,5 a 27,5 x 18 a 19,5
Smyth (1928): 26,0 a 27,5 x 19,0
Di Giacomo (2005h): 24,6 a 27,2 x 17,6 a 19,7 X= 25,8 x 18,7 (N= 6)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 4,0 a 5,5 X= 4,7 (N= 6)



Cayastá. 15-05-2008. Come frutos Ombú

Generalidades
Contreras (1990b). El período de incubación es de 13 días. El pichón permanece en el nido 15 días.

Otros
Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cejas blancas. Garganta blanquecina marginada de oscuro. Dorso y alas oliváceos.
Se diferencia del Pepitero gris por tener la parte dorsal y las cubiertas alares oliváceas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Saltator similis similis d´Orbigny y Lafresnaye, 1837en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, este de Formosa, de Chaco, Santa Fe y noreste de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies.Este de Bolivia, centro y sureste de Brasil, este de Paraguay,Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Saltator similis similis d´Orbigny y Lafresnaye, 1837

Buenos Aires
Citas: Bodrati et al. (2001a, 2006b); Bodrati y Sierra (2008); Fernández(1991a); Mérida y Bodrati (2006); Pagano et al. (2012); Pugnali y Chamorro (2008)

Chaco
Citas:Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005); Salvador y Bodrati (2014a)

Corrientes
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b, 1990b); Darrieu y Camperi (1996); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Corrientes, dpto. Capital, 31-10-1991)

Entre Ríos
Citas: Abadie (1988); Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Bodrati y Sierra (2008); De la Peña (2002, 2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001, 2001a., 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Ronchi Virgolini et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Straneck (1990c)

Formosa
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Grant (1911c); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Nores (1992); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Misiones
Citas: Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)



Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

PEPITERO PICUDO *Saltator maxillosus* Cabanis, 1851



Otros nombres: Habiá-tihvihtá. Pepitero de pico grueso.

DESCRIPCIÓN
Largo: 20 cm.
Peso: Belton (1985): N= 2 (M) 48 y 51g, N= 3 (H) 50 a 54 g; Orenstein (2011): 48-54 g
Coloración. Pico pardo, naranja en la base. Patas grisáceas. Iris pardo. Dorsal, alas y cola grises oscuras. Cejas blancas. "Bigotes" negros. Ventral ocráceo, más gris en el pecho. Subcaudales ocráceas claras.
La hembra es similar al macho pero con la parte dorsal olivácea.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Bodrati (2006b). **Vegetales:** Fruto de *Plinia trunciflora.*
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Orenstein (2011)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico grueso, curvado, corto, negro con amarillo en la base de la mandíbula. Cejas blancas. Parte dorsal gris oscuro. Ventralmente ocráceo.
Se diferencia del Pepitero gris por la forma y el color del pico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Saltator maxillosus Cabanis, 1851en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Sureste de Brasil y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Bertoni (1913); Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b); Bodrati y Cockle (2006); Bodrati y Salvador (2015a); Chebez (1994, 1996a); Pearman y Navas (2002)

PEPITERO DE COLLAR *Saltator aurantiirostris* Vieillot, 1817

Otros nombres: Gente veo. Juan chiviro. Juan chiviro de pico amarillo. Pepetero. Pepitela. Pepitero de corbata. Pepitero picodorado. Picahueso. Rompehueso. Semillero. Siete cuchillas. Siete cuchillos. Viracocha.

DESCRIPCIÓN

Largo: 21 cm.

Peso: Fiora (1934): N= 6 X= 47,0 g (Rango 38,0 a 55,6); Salvador (1988): N= 1 (H) 50,5 g, N= 1 (?) 44,5 g; Camperi (1992a): N= 4 (M) X= 53,5 g (Rango 50,1 a 55,9), N= 4 (H) X= 57,0 g (Rango 54,7 a 59,4); Darrieu y Camperi (1996): N= 2 (M) 42,7 y 42,9 g, N= 1 (H) 52,1 g; Blendinger (1999): 47,0 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 67 X= 41,3 g (Rango 35,0 a 48,0) (*aurantiirostris*), Alderete y Capllonch (2012): N= 4 X= 48,0 g (Rango 47,0 a 49,0) (*tilcarae*), Alderete y Capllonch (2012): N= 26 X= 44,3 g (Rango 39,5 a 50,0) (*nasica*); Salvador (2014a): N= 11 (?) X= 44,9 g (Rango 41,0 a 48,3)

Coloración. Pico naranja. Patas pardo grisáceas. Iris pardo.

Frente, cara, lados del cuello y collar negros. Corona gris oscura. Dorsal gris pardusca. Cejas posoculares y garganta blanquecinas o canelas. Ventral gris con tono canela. Alas pardas oscuras. Cola negruzca.

COMPORTAMIENTO

Anda solitario o en pareja. Se alimenta de frutos, flores, hojas, pimpollos, semillas.

De la Peña (2011a). Recolecta los alimentaos en el suelo, estrato herbáceo, ramas y follaje. Hurga en materias fecales de vacas o caballos. Tritura y traga frutos de Tala, Molle (tira la semilla de Tala). Tritura el fruto y come las semillas inmaduras de Campanilla lilácea (*Ipomoea cairica*). Para comer las semillas de Mata pulga (*Schkuria pinnata*) saltaba desde el suelo unos 20 cm. o se posaba en un tallo grueso para llegar a la comida. Los frutos de Ligustro los toma en forma directa o salta desde tallos cercanos. Algunos frutos de Sófora, los corta y los lleva a posaderos cercanos, los tritura y saca la semilla. Traga enteros los frutos de Coco (*Fagara coco*). Tritura y traga los frutos de Naranjillo.

Alimentación

De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Fruto de Helecho esoárrago (*Asparegus densiflorus*), Santa Lucía (*Commelina erecta*). Hojas de Chili (*Lycium americanum*). Semillas de Mijo (*Panicum miliaceum*)

Marelli (1919). **Vegetales:** Semillas. **Insectos:** Coleópteros. **Otros:** Piedritas.

Zotta (1932). **Vegetales. Insectos:** Coleópteros (Chrysomelidae, Cassidae, Staphylinidae).

Williamson (1975). **Vegetales:** Flores y Pimpollos *Iris* sp*., Narcissus* sp.

Baliño (1984). **Vegetales:** Fruto *Melia azedarach*.

Beltzer (1988c). **Vegetales:** Fruto *Muehlenbeckia sagittifolia, Solanum amygdalifolium, Urera aurentiaca*. Semilla *Polygonum* sp. **Insectos:** Carabidae. Hormigas (*Acromyrmex* sp.).

Roitman et al. (1997). **Vegetales:** Pétalo *Myrrhinum atropurpureum*.

Blendinger (1999). **Vegetales:** Savia *Prosopis flexuosa.*

Beltzer et al. (1999). **Vegetales:** Semilla Cayaponia martiana, Cyperus sp., Muehlenbeckia sagittifolia, *Solanum amygdalifolium*, *Spergula arvensis, Urera aurentiaca*. **Insectos:** Carabidae. Coleoptera (Curculionidae, Dystiscidae, Hydrophilidae). Hemiptera. Hymenoptera (*Acromyrmex* sp.). Orthoptera.

De la Peña y Pensiero (2003). **Vegetales:** Hoja *Celtis ehrenbergiana, Cestrum parqui, Verbena rigida*. Flor *Geoffroea decorticans*. Hoja Fruto *Holmbergia tweedii*. Fruto *Lycium ciliatum*, *Morus alba, Phoradendron liga, Schinus longifolius.* Hoja Flor *Araujia brachystephana*. Pimpollo Fruto *Muehlenbeckia sagittifolia*. Corteza de agalla *Prosopis alba, Sapium haematospermum.*

Di Giacomo (2005h). **Vegetales:** Semilla *Funastrum clausum*. Chaucha *Prosopis alba.* **Insectos:** Hormigas aladas (*Acromyrmex* sp.)

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semilla *Panicum miliaceum.* Fruto *Pyracantha coccinea.* Solanácea, Semilla *Sorghum halepense*. **Insectos:** Coleoptera (Cerambycidae, Curculionidae, no identificado). Hymenoptera (Formicidae).

De la Peña (2011a). **Vegetales:** Semillas *Acacia atramentaria, Brassica napus, Glycine max, Ipomoea cairica, Ipomoea indica, Araujia brachystephana, Passiflora caerulea, Passiflora morifolia, Panicum miliaceum, Schkuria pinnata, Sorghum* sp., *Sorghum halepense, Styphnolobium japonicum.* Pulpa *Citrus grandis*. Frutos *Carica papaya, Celtis tala, Citrus reticulata, Citrus sinensis, Eriobotria japonica, Zanthoxylum coco, Holmbergia tweedii, Ligustrum lucidum, Lycium cestroides, Morus alba, Muehlenbeckia sagittifolia, Phoradendron liga, Pyracantha angustifolia, Sapium haematospermum, Schinus fasciculata, Schinus*

longifolius, Solanum argentinum, *Tripodanthus flagellari.* Pimpollo *Clematis montevidensis, Geoffroea decorticans, Gleditsia triacanthos, Muehlenbeckia sagittifolia*, *Schinus fasciculata*. Hojas *Cestrum parqui, Condalia buxifolia, Geoffroea decorticans, Grabowskia duplicata, Holmbergia tweedii, Araujia brachystephana, Verbena rigida*. Flores *Cestrum parqui, Geoffroea decorticans, Araujia brachystephana*. Pulpa de la chaucha *Gleditsia triacanthos*. Pulpa y Semilla *Carica papaya*. Brote *Sapium haematospermum.* Corteza de agalla *Prosopis alba, Sapium haematospermum*
Bodrati y Salvador (2015a). Termites.



Voces
Straneck (*in litt*.). El canto está compuesto por fuertes silbos: Juitiojeochiveo ... juitiojeochiveo ...

HÁBITAT
Sabanas,bosques.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

El nido tiene forma de taza o semiesfera. Es sostenido en ramas de arbustos o en enredaderas. Es construido con pajas, tallos, líquenes. Internamente hojas o raicillas.Semioculto. Elaborado.



Reed (1913). Mendoza nido parasitado por *Molothrus bonariensis*
Reed (1919). Mendoza, varios nidos desde la llanura hasta los 1500 m de altitud.
Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, nidifica.
Dinelli (1924). Tucumán, nido en noviembre y diciembre.
Smyth (1928). Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Friedmann (1929). Entre Ríosnido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Friedmann (1929). Tucumán Girardnido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Friedmann et al. (1929). Tucumánnido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Dinelli (1937). Tucumánnido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Pereyra (1951). Rincón del Atuel, dpto. Mendoza, diciembre, nido con 3 huevos.
Masramón (1962). San Luis, nidifica.
Masramón (1980). Nidifica en San Luis.
Mezquida y Marone (2001). Reserva Ñacuñán, Mendoza.Nidifica.
Mezquida (2003). Reserva de Ñacuñán, dpto. Santa Rosa, Mendoza, observaciones en el período reproductivo desde 1995 a 1999, se localizaron nidos entre octubre y diciembre.
Di Giacomo (2005h).Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre noviembre y enero. Se estudiaron 10 nidos.

De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 22, desde el 13-01-1971 al 26-11-2012, 3 en Córdoba, el resto en Santa Fe. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Medidas: Diámetro total: de 10 a 15 cm. Diámetro interno: de 7 a 9 cm. Profundidad: de 2 a 6 cm. Alto: de 7 a 12 cm.
Altura: Nido más bajo: 1,20 m. Nido más alto: 3,70 m.
Salvador y Bodrati (2014a). La Paz, Traslasierra, Córdoba, J. Heredia, diciembre de 2003, localizó dos nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", 2 nidos con 2 huevos cada uno.

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, celeste verdosos con pintas, rayitas y líneas negras en el polo mayor, a veces formando corona.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 24,5 a 30,0 x 18,0 a 20,0
Reed (1919): 28,0 x 21,0
Serié y Smyth (1923): 25,0 a 29,0 x 19,0 a 20,0
Dinelli (1924): 26,5 x 19,0 y 27,0 x 19,5
Smyth (1928): 26,0 a 28,5 x 19,0 a 21,5
Pereyra (1938b): 26,0 x 19,0
Mezquida (2003): X= 27,1 x 19,4 (N= 9)
Di Giacomo (2005h): 24,4 a 27,8 x 18,3 a 19,9 X= 26,3 x 19,1 (N= 20)
De la Peña (2013c): 23,4 a 27,8 x 18,4 a 20,5 X= 25,9 x 19,1 (N= 23)



Pesos
Mezquida (2003): X= 5,6 (N= 6)
Di Giacomo (2005h): 4,0 a 5,4 X= 4,7 (N= 20)
De la Peña (2013c): 4,1 a 5,4 X= 4,9 (N= 11)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,264 a 0,400 X= 0,335 (N= 17)

PICHONES
Descripción
Nacen con los ojos cerrados. Piel oscura. Cavidad bucal, paladar y lengua, rojos. Comisura amarilla.
Parte dorsal del pico verdosa. Escaso plumón grisáceo, en la cabeza, dorso y dorsal de las alas.
4 días
Escaso plumón fino en la cabeza, dorsalmente y parte dorsal de las alas. Vainas de primarias grises.
5 días
Abre los ojos.
6 día
Se notan las vainas en dorsal y ventral. Escaso plumón en la cabeza y dorso.
7 días
Plumas ventrales oscuras en los lados del pecho, flancos crema. Cabeza y dorsalmente gris.
9 días
Leve deja ocrácea. Ventral ocráceo. Pico verdoso.

Generalidades
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 14 días. Los pichones permanecen en el nido entre 12 a14 días.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 8 a 9 días. Pone los huevos en días corridos. Período de incubación 14 días. Permanencia de los pichones en el nido de 17 a 18 días.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,8	1,0-1,2	1,9						5,1-5,4
2	0,9	1,4	2,2						9,0-11,0
3	0,9	1,8	2,5	0,3					11,3-16,6
4	0,9	1,9	2,7	0,8		0,3			13,8-17,8
5	0,9	2,2	3,0	1,2		0,7			17,0-20,0
6	1,0	2,4	3,2	1,5		1,2			21,0-25,0
7	1.0	2,6	3,6	2,0	0,5	1,7	0,3	0,4	26,0-27,0
8	1,0	3,3	4,0	2,6	0,9	2,0	0,5	0,7	32,0-33,0

Otros
Grilli et al. (2006). Un ejemplar conLeucismo parcial.
Ferrer (2014). Un ejemplar con Leucismo.

Otros
Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Antoniazzi et al. (2011). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Reed (1913). Smyth (1928). Friedmann (1929). Friedmann et al. (1929). Dinelli (1937). De la Peña (2013c). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

Más información:
Mezquida (2003).De la Peña (2013c)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico anaranjado. Cara, lados del cuello y collar negros. Ventral canela. Dorsal gris pardusca.


Cacique Ariacaiquín.Santa Fe.08-12-1990Parasitado por *Molothrus bonariensis*


Esperanza.Santa Fe.19-11-2007



Jesús María.Córdoba. 26-07-2008



Cayastá.Santa Fe.22-11-1981



Jesús María. Córdoba. 13-11-2005



Esperanza.Santa Fe.15-11-2007

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Saltator aurantiirostris iteratus Chapman, 1927en el oeste de Jujuy, Salta y Catamarca; *Saltator aurantiirostris aurantiirostris* Vieillot, 1817desde el este de Jujuy y Salta, Tucumán, Formosa, Corrientes hasta Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, este de Río Negro y de Chubut; *Saltator aurantiirostris parkesi* Cardoso da Silva, 1990en Entre Ríos y *Saltator aurantiirostris nasica* Wetmore y Peters, 1922en La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y oeste de La Pampa.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Seis subespecies. Amplia área de distribución en Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Saltator aurantiirostris iteratus Chapman, 1927

Catamarca

Citas: Contreras (1980a)



Jujuy
Citas:Aldetere y Capllonch (2012); Chebez et al. (1998); Contreras (1980a); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Fiora (1934); Lucero(1982); Salvador (1988)

Saltator aurantiirostris aurantiirostris Vieillot, 1817

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Contreras (1980a); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey (1992); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky et al. (1990); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Catamarca
Citas: Alabarce et al. (1990); Alderete y Capllonch (2012); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Vides Almonacid (1999); White (1882)

Observaciones: De la Peña (La Guardia, dpto. La Paz, 14-12-99 ; San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 13-03-1981)

Chaco
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Bodrati y Pietrek (2000); Bodrati y Salvador (2015a); Chatellenaz (2005); Contreras (1980a); Moschione y Bishels (2004); Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a)

Córdoba
Citas: Brandolín et al. (2007); Castellanos (1934); Chikilian et al. (1993-1994); Contreras (1980a); Dardanelli et al. (2006b); Dardanelli y Nores (2001); De la Peña (1981a, 2013c); Heredia (2006); Navas y Bó (1991c); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983); Sferco y Nores (2003); Straneck (1990d); Yzurieta (1995)
Observaciones: De la Peña (Marull, dpto. San Justo, 18-09-2002 ; Jesús María, dpto. Colón, 16-11-05 ; Ascochinga, dpto. Colón, 04-02-2006)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1980a, 1987b); Darrieu y Camperi (1996); Giraudo et al. (2006); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918)

Observaciones: De la Peña (Mercedes, dpto. Mercedes, 19-09-1979)

Formosa
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Chebez et al. (1998); Contreras (1980a, 1987c); Di Giacomo(2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Aldetere y Capllonch (2012); Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Fiora (1934); Grilli et al. (2006); Mazar Barnet et al.(1998c); Moschione y Segovia (2005); Zotta (1932)

Observaciones: De la Peña (San Salvador de Jujuy, dpto. Capital, 01-02-1977)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bruno et al. (2007); De la Peña y Tittarelli (2011); Güller (2008); Maceda et al. (2001); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1923); Hayward (1967); Salvador (1988)

Río Negro
Citas: Pérez et al. (2006); Pérez y Petracci (1998); Llanos et al. (2011)

Observaciones: De la Peña (Río Colorado, dpto. Pichi Mahuida, 26-11-2000)

Salta
Citas: Alabarce y Lucero (1977); Alderete y Capllonch (2012); Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b); White (1882)

Observaciones: De la Peña (Salta, dpto. La Capital, 30-01-1977)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Herrera et al. (2013); Lucero (2013f, 2013i)

Observaciones: De la Peña (La Ciénaga, dpto. Jachal, 15-01-1982)

San Luis
Citas:Ferrer (2014); Masramón (1979, 1983); Nellar Romanella (1993);

Santiago del Estero
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Codesido y Bilenca (2000); Contreras (1980a); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Pinto, dpto. Aguirre, 29-01-1977)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c, 1988c); Beltzer et al. (1999); Contreras (1908a); De la Peña (2011a, 2011f, 2013c); Esteban (1953); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Antelo y Brandán (2006); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007); Capllonch y Aráoz (2007); Dinelli (1924); Echevarría et al. (2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Luceroet al. (2002); Malizia et al. (1998); Ortiz et al. (2011, 2013); Ortiz y Aráoz (2011); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014)

Saltator aurantiirostris parkesi Cardoso da Silva, 1990

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992); Canavelli et al. (2004); Contreras (1980a); De la Peña (2012b); Fandiño et al. (2010); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001, 2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Roitman et al. (1997); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975)

Saltator aurantiirostris nasica Wetmore y Peters, 1922

Buenos Aires
Citas: Delhey et al. (1992); Narosky et al. (1990)

La Pampa
Citas: Bonkewitzz (1990); Chapman (1927); Chebez et al. (1998); Contreras (1980a); Darrieu et al. (2011a); Güller (2008); Maceda et al. (2001); Navas y Bó (1986); Olrog (1979); Pereyra (1937); Siegenthaler et al. (1990); Wetmore (1926b); Willianson (1975)

La Rioja
Citas: Capurro y Bucher (1982, 1986); Contreras (1980a); Hayward (1967); Koslowsky (1895)

Mendoza
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Blendinger (1999); Calí et al. (2008); Contreras (1979g, 1980a); Contreras y Fernández (1980); Darrieu y Segura (2015); Gómez (2006); López de Casenave y Marone (1996); Lucero (2013f); Marone (1991, 1992a, 1992b); Martín et al. (2011a, 2011b); Mezquida (2003); Mezquida y Marone (2001, 2003a); Milesi et al. (2002); Pereyra (1951); Reed (1919); Roig (1965); Sanzín (1918); Wetmore (1926b)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Veiga et al (2005)

Observaciones: De la Peña (Río Colorado, dpto. Pichi Mahuida, 26-11-2000)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Alderete y Capllonch (2012); Camperi y Darrieu (2004); Gelain (2014a); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (1991c)

San Luis
Citas: Bo (1965); Casares (1944); Contreras (1980a); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

PEPITERO COLORADO *Saltator rufiventris* d´Orbigny y Lafresnaye, 1837 (*dubusia*)

Otros nombres: Pepitero alisero. Pepitero colorado. Pepitero de vientre colorado.



DESCRIPCIÓN
Largo: 23,5 cm.
Peso: Orenstein (2011): (M) 68-80,5 g; (H) 67,8-79,3 g
Coloración. Pico y patas pardos. Iris rojo.
Dorsal, garganta y pecho grises. Inferior del pecho y resto de la parte ventral castaños. Cejas blancas. Alas y cola oscuras con las plumas orilladas de gris.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Collar et al. (1992). **Vegetales:**Frutos Lorantaceae. *Schinus molle.*
Rodríguez (2014b).**Vegetales:**Hojas de Sauce, de Trébol blanco (*Trifolium repens*), flores de Diente de león (*Taraxacum officinale*), fruto de Pera de monte (*Iochroma australe*)

HÁBITAT
Bosques.

NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en Salta.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		N									

Forma de taza, construido con palitos.

Rodríguez (2014b). Cuesta del Obispo, dpto. Chicoana, Salta, 02-03-2013, nido en un Álamo (*Populus* sp.) a 7 m del suelo. Nido tosco, de palitos entrecruzados, con forma de taza abierta, oculto entre el follaje. Tenía un pichón.

PICHONES
Descripción
Rodríguez (2014b). Comisuras amarillas. Interior del pico anaranjado y el cuello casi desprovisto de plumas.

Más información:
Rodríguez (2014b).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cejas blancas. Dorsal y pecho grises. Vientre castaño.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Saltator rufiventris 2000 a 2800 m de altura en Jujuy y Salta.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica.En los Andes de Bolivia y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy
Citas: Blendinger (1998); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Di Giacomo et al. (2007); Mazar Barner et al. (1998c); Monteleone y Roesler (2005); Olrog y Contino (1970); Olrog (1972b);

Salta
Citas: Chani et al. (2002); Chebez et al. (1998); Mazar Barnett et al. (1998a); Moschione (2005); Moschione et al. (2013); Ridgely y Tudor (1989)

PEPITERO CHICO *Saltatricula multicolor* (Burmeister, 1860)

Otros nombres: Chiviro chico. Manchadito. Margarita. Montero manchado. Pepetero. Pepiterito. Pica hueso chico. Vira vira.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16 cm.



Peso: Navas y Bó (1991): N= 5 (M) X: 23,1 g (Rango 21,5 a 26), N= 5 (H) X: 24,5 g (Rango 22,3 a 25,8); Camperi (1992a): N= 1 (M) 27,4 g, N= 1 (H) 26,5 g; Blendinger (1999): 22,9 g; Alderete y Capllonch (2012): N= 73 (?) X: 22,51 g (Rango 19,5 a 25,5); Salvador (2014a): N= 3 (?) X= 23,8 g (Rango 21,2 a 26,3)

Coloración. Pico amarillo. Paras pardas. Iris pardo.

Frente y lados del cuello negros. Cejas posoculares blancas. Dorso pardo. Garganta blanca. Collar gris. Resto de la parte ventral canela. Abdomen blanquecino. Alas pardas con las plumas ribeteadas de canela. Cola negra con el tercio terminal de las plumas externas blanco.

COMPORTAMIENTO

Anda solitario o en pareja. Se desplaza rápido entre los matorrales.
Canta muy bien, posado en ramas expuestas o a veces semioculto.
Busca alimentos desde el suelo hasta los 3 m. de altura.

Alimentación

De la Peña (Inéd.). Mariposas.
Zotta (1936). Vegetales. **Insectos:** Coleópteros (Scarabaeidae).
Blendinger (1999).**Vegetales:** Savia *Prosopis flexuosa.*
De la Peña y Pensiero (2003). **Vegetales:** Semilla *Chloris ciliata*,*Melica macra.* Fruto *Holmbergia tweedii*. Pimpollo *Muehlenbeckia sagittifolia*.
Marone et al. (2008). **Vegetales:** Semilla *Aristida mendozina, Chenopodium papulosum, Digitaria californica, Diphachne dubia,Eragrotis* sp., *Glandularia mendocina, Neobouteloua lophostachya*, *Pappophorum* sp*., Setaria leucopila, Sporobolus cryptandru, Trichloris crinita.*
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semilla *Chenopodium* sp. Gramíneas, *Panicum miliaceum,* frutos y semillas no determinadas.Fruto *Schinus longifolia*. **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Scarabaeidae, no identificado). Hemiptera (Cercopidae). Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas). Orthoptera (Acridiidae).
De la Peña (2011a). **Vegetales:** Semillas *Chloris ciliata, Melica macra.* Fruto *Holmbergia tweedii*. Pimpollo *Muehlenbeckia sagittifolia*. **Insectos:** Libélulas. **Otros:** gusanos.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces

Straneck (*in litt*.). El canto es la repetición de dos sílabas: Wira . wira .. wira . wira ... wira . wira ..

HABITAT

Montes, sabanas, matorrales.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

El nido tiene forma de tacita o semiesfera, sostenido entre hojas de plantas o atado a ramitas. Emplea fibras vegetales, pajas. Internamente raicillas, fibras finas.Expuesto. Elaborado.

Dinelli (1918b).Tucumán, nidifica en diciembre y enero.
Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, nidifica.
Smyth (1928). Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Höy y Ottow (1964). Salta, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Masramón (1980). Nidifica en San Luis.
Salvador y Salvador (1984). Cura Brochero, dpto. San Alberto, Córdoba, 12-01-1983, 4 huevos propios y 2 de *Molothrus bonariensis.*
Mezquida y Marone (2001). Reserva Ñacuñán, Mendoza.Nidifica.
Mezquida (2003). Reserva de Ñacuñán, dpto. Santa Rosa, Mendoza, observaciones en el período reproductivo desde 1995 a 1999, se localizaron nidos entre octubre y febrero.
Salvador (2012f). Santiago del Estero, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 17, desde el 15-11-1971 al 10-11-2007, todos en provincia de Santa Fe. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Medidas: Diámetro total: de 9 a 10 cm. Diámetro interno: de 6 a 7,5 cm. Profundidad: de 3 a 4,5 cm. Alto: de 6 a 7 cm.
Altura: Nido más bajo: 0,10 m. Nido más alto: 2,20 m.
Salvador y Bodrati (2014a). Merlo, dpto. San Luis, A. Di Giacomo, localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, blancos con pintas negras, más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Dinelli (1918b): 21,0 a 22,5 x 15,5 a 16,0 X= 21,7 x 15, 7 (N= 2)
Smyth (1928): 20,0 a 21,0 x 15,5 a 16,0
Mezquida (2003): X= 21,1 x 15,8 (N= 44)
De la Peña (2013c):21 a 23 x 15,8 a 17,6 X= 21,8 x 16,5 (N= 11)



Peso
Mezquida (2003): X= 2,9 (N= 39)
De la Peña (2013c): 3,3 a 3,5 X= 3,4 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,156 a 0,208 X= 0,188 (N= 11)

PICHONES
Descripción.
Nacen con los ojos cerrados. Piel negra. Pico gris. Comisura blanquecina. Cavidad bucal, paladar y lengua, rosados. Parte anterior del paladar, amarillenta. Escaso plumón fino, gris claro.
4 días
Color general oscuro. Vainas alares y de la cola, oscuros.
7días
Muy vivaracho. Si se lo suelta se escapa.
Comisura blanquecina-amarillenta. Cavidad bucal rosada. Parte anterior del paladar amarillento. Dorsalmente pardo. Garganta y lados del pecho, grises. Abdomen blanquecino. Cejas postocular, blanquecina. Pecho grisáceo. Flancos canelas. Alas parduscas. Cañones de las plumas externas de la cola, blancos.



Generalidades
Mezquida (2003). Período de incubación X= 13,8 días.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 10 a 12 días. Período de incubación 13 días. Los huevos son puestos

en días corridos. Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido 10-11 días.

Otros
Smyth (1928). Höy y Ottow (1964). Salvador y Salvador (1984).Salvador (2012f). De la Peña (2013c).Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

Más información
De la Peña (2013c)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico amarillo con el culmen negro. Garganta blanca bordeada de negro. Collar gris. Ventralmente canela con blanco en el abdomen. En vuelo, ápice blanco de las plumas externas de la cola.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Saltatricula multicolor (Burmeister, 1860)desde el norte del país, excepto Misiones, hasta San Juan, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.



Grutly.Santa Fe.05-01-1991
Parasitado por *Molothrus bonariensis*



Esperanza.Santa Fe.15-11-2007



Esperanza.Santa Fe.20-10-2008



Grutly.Santa Fe.05-01-1991



Esperanza.Santa Fe.22-06-2009



Jesús María. Córdoba. 08-08-2012



Esperanza.Santa Fe.11-11-2007. Ubicación del nido.



Esperanza.Santa Fe. 29-11-1976

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica.Sur de Bolivia, oeste de Paraguay, suroeste de Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas:Babarskas et al. (2003); Bodrati (2001); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey y Carrete (1999); Delhey y Scorolli (2002); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993)

Catamarca

Citas:Alderete y Capllonch (2012); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Navas y Bó (1991c)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 13-03-1981; La Guardia, dpto. La Paz, 14-12-1999)

Chaco

Citas: Moschione y Bishels (2004)

Córdoba
Citas:Dardanelli et al. (2006b); Heredia (2006); Navas y Bó (1991c); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983); Sferco y Nores (2003); Straneck (1990d); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Cuchi Corral, dpto. Punilla, 20-01-2000; Dean Funes, dpto. Ischilín, 14-11-2001; Jesús María, dpto. Colón, 20-10-2011)



Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Camperi (1992); Canavelli et al. (2004); De la Peña (1996, 2012b); Marateo et al. (2009); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomoy Krapovickas (2005); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Navas y Bó (1991c)

Jujuy
Citas:Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Di Giacomo et al. (2007); Moschione y Segovia (2005); Navas y Bó (1991c)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Delhey y Scorolli (2002); Di Gicomo et al. (2005); Maceda et al. (2001); Navas y Bó (1991c); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1982, 1986); Di Giácomo et al. (2007); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895); Navas y Bó (1991c)

Mendoza
Citas: Alderete y Capllonch (2012); Blendinger (1999); Contreras (1979g); Cueto et al. (2008); Darrieu y Segura (2015); López de Casenave (2001); López de Casenave y Marone (1996); López de Casenave et al. (2008); Marone (1991, 1992a, 1992b); Marone et al. 1997, 1998, 2000); Mezquida (2003, 2004); Mezquida y Marone (2001, 2003a); Milesi et al. (2002); Roig (1965); Sagario y Cueto (2014); Zarco et al. (2007)

Salta
Citas: Alabarce y Lucero (1977); Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Navas y Bó (1991c); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (Salta, dpto. La Capital, 30-01-1977)

San Juan
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene et al. (1995); Lucero (2013f, 2013i); Navas y Bó (1991c); Nores e Yzurieta (1982b)

San Luis
Citas: Esteban (1953); Masramón (1979, 1983); Navas y Bó (1991c); Nellar Romanella (1993); Salvador y Bodrati (2014a)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013d); Martinez Achenbach (1957); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Bodrati y Salvador (2015a); Codesido y Bilenca (2000); López de Casenave et al. (1998); Navas y Bó (1991c); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas:Alderete y Capllonch (2012); Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Navas y Bó (1991c); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz et al. (2013c)

ARAÑEROS

FAMILIA: PARULIDAE

Aves pequeñas, de pico largo y delgado.

Se alimentan de larvas, insectos y arácnidos.

Nidifican en los árboles, arbustos, pajonales, matorrales.

Frecuentan bosques, selvas, arboledas, pajonales.

ARAÑERO DE AGUA *Parkesia noveboracensis* (Gmelin, 1789)

DESCRIPCIÓN
Largo: 14 cm.
Peso: Curson (2010): 13,8-24,4 g
Coloración. Pico pardo con base rosada. Patas rosadas. Iris pardo.
Dorsal parda olivácea. Cejas ocráceas amarillentas. Ventral blanca amarillenta con el pecho rayado de pardo oscuro. Alas y cola pardas.

HÁBITAT
Cerca del agua, en arroyos, lagunas, pantanos.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cejas amarillentas. Ventralmente blanco-amarillento jaspeado de pardo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Parkesia noveboracensis (Gmelin, 1789)en el este de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Nidifica en los bosques del norte de Canadá y estados Unidos. Migra en el invierno boreal hasta el norte de Sudamérica. Ocasional más al sur.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Moschione (1988b)

ARAÑERO DE CARA NEGRA *Geothlypis aequinoctialis* (Gmelin, 1789)


Otros nombres: Amarillito. Amarillito cara negra. Arañero. Arañero carinegro. Arañero cara negra.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13 cm.

Peso: Contreras (1979f): N= 3 (M) 15,5, 11,5 y 12,8 g, N= (H) 10,8 g; Contreras (1983b): N=1 (M) 11,3 g; Salvador (1988):N= 2 (H) 12,9 y 14,5 g; Di Giacomo (2005h): N= 1 (H)11,0 g; Salvador (2014a): N= 3 (M) X= 13,1 g (Rango 12,2 a 13,8), N= 3 (H) X= 12,2 g (Rango 11,9 a 12,6)
Coloración. Pico negruzco con la base de la mandíbula rosada. Patas rosadas. Iris pardo oscuro.
Macho. Antifaz negro. Corona gris plomiza. Dorsal olivácea. Ventral amarilla. Alas pardas con las barbas externas ribeteadas de oliva. Cola parda olivácea.
Hembra. Dorsal parda grisácea. Ventral amarilla pálida. Alas y cola, pardas.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en pareja. A veces es difícil verlo (anda oculto), solamente se lo escucha cantar. Se desplaza a baja altura en arbustos, árboles y matorrales.
En la época de reproducción el macho es muy cantor y emite permanentemente un fuerte y melodioso canto.
Es más abundante en los matorrales y pajonales de las selvas en galería o bosques húmedos. En verano aparece también en bosques secos.
De la Peña (2011a). Se alimenta de insectos, arácnidos, larvas. Desde el suelo hasta 2 m. Es recolector.
A los pichones les lleva larvas (orugas, gusanos).

Alimentación
Zotta (1936).**Insectos:** Coleópteros (Curculionidae, Chrysomelidae, Scarabacidae). Hemípteros (Membracidae). Lepidópteros (Noctuidae). **Otros:** Piedritas.
Zotta (1940). **Insectos:** Coleopteros. Hemípteros. Himenópteros.
Contreras y Fernández (1978).**Insectos:** Coleópteros (Curculuionidae, Chrysomelidae, Scarabaeidae). Dipteros. Himenópteros (Membracidae). Himenópteros. Lepidópteros (Noctuidae).
Ordano et al. (1999).**Insectos:** Coleópteros (Curculionidae). Lepidoptera (Larva).
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae, no identificado).Diptera (Culicidae).Hemiptera. Homoptera (Membracidae). Hymenoptera (Formicidae, Vespidae). Lepidoptera (orugas, polillas).**Arácnidos:** arañas.
De la Peña (2011a).**Insectos:** Langostas. Gusanos. Orugas.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.



HÁBITAT
Bañados, pajonales, matorrales, yuyales en orillas de caminos, orillas de bosques y de selvas en galería.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

El nido tiene forma de taza, es construido con fibras vegetales en la base y raicillas internamente. Lo ubica en el suelo o entre los pastos, sostenido a baja altura.Oculto o semioculto.

Miller (1917). Saltanido parasitado por *Molothrus bonariensis*.



Dinelli (1922). Tucumán, nidifica desde octubre.
Friedmann (1929). Tucumán, Girard nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pereyra (1938b). Noreste de la provincia de Buenos Aires, nidifica desde octubre a noviembre.
Salvador y Salvador (1984). Miramar, dpto. San Justo, Córdoba, 12-12-1983, 4 huevos propios y 1 de *Molothrus bonariensis.*
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando.Nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pautasso (2002b). Reserva Urbana de la Ciudad Universitaria UNL "El Pozo", dpto. La Capital, Santa Fe, 26-10-1999, nido sin postura, 08-11-1999, nido con 3 huevos.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 2 nidos en noviembre.
Pautasso (2006b). Reserva Urbana de la Ciudad Universitaria UNL "El Pozo", dpto. La Capital, Santa Fe. Se localizaron 3 nidos: 17-10-1998, 3 huevos; 26-10-1999, sin postuta y 08-11-1999, 3 huevos.
Auer et al. (2007). Parque Nacional El Rey, dto. Anta, Salta, 12 nidos, entre fines de octubre y mediados de diciembre, entre 0 y 50 cm de altura, postura promedio 3,1 huevos.
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 7, desde el 27-11-1971 al 28-01-2003, uno en Entre Ríos, losrestantes en Santa Fe. Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Medidas: Diámetro total: de 8 a 11 cm. Diámetro interno: de 4 a 6 cm. Profundidad: de 3,5 a 6 cm. Alto: de 9 a 11 cm.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", un nico con 3 huevos.

Huevos

Pone 3 huevos, ovoidales, blancos con pintas y manchitas castañas y grises, más concentradas en el polo mayor, formando una corona.



Medidas

Dinelli (1922): 18,0 a 19,0 x 13,5 a 14,0 X= 18,5 x 13,7 (N= 2)
Pereyra (1938b): 19,0 x 14,0
Pautasso (2006b): 19,0 a 19,6 x 14,0 a 14,8 X= 19,3 x 14,2 (N= 3)
Auer et al. (2007): X: 18,4 x 14,1 (N= 12)
De la Peña (2013c): 18 a 19,3 x 13,3 a 15 X= 18,6 x 13,8 (N= 10)

Peso

De la Peña (2013c): cáscaras 0,106 a 0,110 X= 0,107 (N= 8)

PICHONES

Descripción

Pautasso (2006b).Pichón de 6 días. Pico marrón claro con la comisura amarillenta. Piel rosa oscuro. Algunas filoplumas dispersas en el cuerpo de color gris oscuro. En las alas las vainas son grises azuladas oscuras y en la corona tienen tonos negruzcos.
De la Peña (2013c).Nacen con los ojos cerrados. Escaso plumón gris. Cavidad bucal y paladar, rojos. Comisura amarilla.
4 días
Ojos cerrados.
Vainas dorsales emergiendo, grises. Ventrales amarillentas.
Vainas de las plumas primarias de 0,9 cm.
5 días
Abren los ojos.

Alimentación.
Los padres alimentan a los pichones con larvas (gusanos) y langostas.
Generalidades
Pautasso (2006b). Período de incubación de 12 días.
Auer et al. (2007). Solo la hembra incuba, la incubación demandó en promedio 13,3 días, la permanencia de los pichones en el nido fue en promedio de 9,7 días, y que ambos miembros de la pareja alimentan los pichones.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 6 a 7 días. Pone los huevos en días corridos. Período de incubación 14 días. Permanencia de los pichones en el nido de 10 a 11 días.

Observaciones
Pautasso (2006b). A los 7 días escapan del nido ante la presencia de observadores.
De la Peña (2013c). El 12-03-1981, en Chumbicha, dpto. Capayán, Catamarca, una pareja de adultos andaban con dos juveniles. El 15-12-20'02, en Santa Fe, dpto. La Capital, un macho alimentaba a un juvenil con una langosta chica.
Los nidos sufren elevado índice de depredación, de huevos y de pichones.

Otros
Miller (1917). Dinelli (1922). Friedmann (1929).Salvador y Salvador (1984).Darrieu et al. (1988). De la Peña (2013c). Anfitrión de*Molothrus bonariensis*.

Más información: Pautasso (2006b). De la Peña (2013c)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Amarillo. Corona gris. Dorsal olivácea. Antifaz negro en el macho.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Geothlypis aequinoctialis velata (Vieillot, 1807)desde el norte del país hasta Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinco subespecies. Amplio rango de distribución desde Costa Rica y Panamá, hasta Argentina y Uruguay. Comprende: Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay.


Santa Fe.15-12-2002Parasitado por *Molothrus bonariensis*


Santa Fe.10-11-1998



Esperanza.Santa Fe.22-02-2007.Macho



Santa Fe.10-11-1998



Esperanza.Santa Fe.22-02-2007.Macho




Santa Fe.10-11-1998. Ubicación nido.



Santa Fe.15-12-2002

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Geothlypis aequinoctialis velata (Vieillot, 1807)



Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Contreras y Fernández (1978); Darrieu y Camperi (2001a); Durnford (1878); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Soave et al. (1999); Straneck (1990c)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Vides Almonacid (1999)

Observaciones: De la Peña (Chumbicha, dpto. Capayán, 12-03-1981; El Alamito, dpto. Andalgalá, 17-12-1999)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba
Citas: Baldo y Ordano (1993); Castellanos (1934); Dardanelli et al. (2006b); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores et al (1983); Partridge (1953c); Salvador (1983); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (La Granja, dpto. Colón, 20-11-2003; Balnearia, dpto. San Justo, 18-03-2004; Jesús María, dpto. Colón, 18-02-2007)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1980-81, 1987b); Contreras y Fernández (1978); Darrieu y Camperi (1993); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Bodrati y Salvador (2015a); Canavelli et al. (2004); Contreras y Fernández (1978); De la Peña (2012b, 2013c); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas:Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); López Lanús (1997); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Lucero (1982); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (1997); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Serracín y Romero (1998); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1907, 1923); Salvador (1988)

Mendoza
Citas: Contreras y Fernández (1978, 1980); Darrieu y Segura (2015); Lucero (2013f)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 12-10-1981)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Contreras (1983b); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)
White (1882)

San Juan
Citas: Fontana (1908); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene et al. (1995); Lucero (2013f, 2013i); Nores e Yzurieta (1985)

San Luis
Citas: Casares (1944); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2005, 2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Ordano et al. (1999); Pautasso (2002b, 2006); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)


Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Alabarce y Antelo (1998); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007); Dinelli (1922); Echevarría et al. (2011b); Handford (1983); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011, 2013); Ortiz y Ruiz (2011, 2014); Soria et al. (2010)

PITIAYUMÍ *Setophaga pitiayumi* (Vieillot, 1817)

Otros nombres: Almita. Amarillito. Arañero.

DESCRIPCIÓN
Largo: 10 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 1 7,0 g; Contreras (1979f): N= 1 (H) 7,3 g; Camperi (1992a): N= 1 (H) 7,1 g; Camperi (1992c): N= 1 (M) 8,0 g; N= 1 (H) 7,0 g; Di Giacomo (2005h): N= 2 X= 7,1 g (Rango 6,8 a 7,4); Salvador (2014a): N= 4 (?) X= 7,9 g (Rango 7,3 a 8,6); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 7,2 g
Coloración. Pico negruzco con mandíbula amarilla. Patas rosadas o rojizas. Iris pardo oscuro.
Dorsal gris azulada con la espalda olivácea. Garganta y pecho naranjas. Lorum negro. Abdomen amarillo. Alas negruzcas con las barbas externas ribeteadas de gris. Dos bandas blancas en las cubiertas alares. Cola negruzca con blanco en las timoneras externas.

COMPORTAMIENTO



Solitario, excepto en época de reproducción. Inquieto. Recorre las ramas en la parte media y alta de los árboles. De la Peña (2011a). Recolecta en ramas y hurga entre los Claveles del aire y líquenes en busca de insectos (es un recolector de follaje). A veces caza en vuelo.
El canto es una sucesión de silbos.

Alimentación

Zotta (1932). **Insectos:** Dípteros. Himenópteros.
Carman (1987).**Insectos:** Hormigas voladoras (*Brachymyrmex* sp.).
Milat y Klimaitis (1993). **Insectos:** Aphidos.
López (1993b).**Insectos:** Lepidopteros (Arctidae: *Halisidota schausi*).
Roitman et al. (1997).**Vegetales:** Pétalo *Myrrhinum atropurpureum.*
Olson y Alvarenga (2006).**Insectos:** Isoptera (Termitas).
Bodrati y Haene (2006).**Vegetales:** Fruto *Psychotria carthagenensis.*
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:** Néctar *Pisonia aculeata, Pisonia zapallo, Tabebuia hepptaphyllas.*
Cortes et al. (2009).**Vegetales:** Fruto *Eugenia umbelliflora.*
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, no identificado). Diptera. Homoptera (Cercopidae). Hymenoptera (Formicidae, Vespidae). Lepidoptera (orugas).
De la Peña (2011a). **Insectos.**
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT

Montes,bosques, selvas, parques, jardines, arboledas exóticas. En Córdoba en áreas periserranas y bajoserranas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N


Construye el nido en matas de líquenes, ocupa estos elementos e internamente algunas cerdas. Tiene forma globular o cesta colgante.Oculto. Elaborado.

Hartert y Venturi (1909). Villa Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, 03-12-1903, nido con huevos.
Gibson (1918). Cabo San Antonio, Buenos Aires, nidificaría en la zona.
Pereyra (1938b). Gral. Lavalle, pdo. Gral. Lavalle, Buenos Aires, 24 de noviembre nido con 2 huevos.
Contino (1980). Nidifica en primavera.
Alabarce (1987b). Tucumán, 30-11-1978, nido con 3 huevos.
Milat y Klimaitis (1993). Punta Blanca, pdo. Berisso, Buenos Aires, se localizaron 5 nidos, con huevos en diciembre y pichones en enero. En Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, Moschione halló un nido el 07-10-1990 con 2 huevos y Di Giacomo uno en construcción en Otamendi, pdo. Camoana, Buenos Aires el 17-10-1990.
Di Giacomo (2005h).Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre setiembre y diciembre. Se hallaron 7 nidos.
De la Peña (2013c). La Camila, dpto. San Justo, Santa Fe, 02-12-1997, nido en Chañar a 3,50 m del suelo, 3 huevos, 23-12-1997, en el mismo lugar, nido en Quebracho colorado a 3,50 m de altura, no observado. Medidas: Diámetro interno: 3 cm. Profundidad: 3 cm. Alto: 6 cm. Diámetro de la boca de entrada: 3 cm.

Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 1 nido.



Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, blancos con finas pintas pardo rojizas, más concentradas en el polo mayor.
Medidas
Hartert y Venturi (1909): 15,9 x 12,0 y 16,0 x 12,1
Alabarce (1987b): 15,0 x 12,5 y 15,0 x 12,0
Milat y Klimaitis (1993): 15,8 a 16,9 x 11,8 a 12,6 X= 16,2 x 12,1 (N= 5)
Di Giacomo (2005h): 15,3 a 16,4 x 11,3 a 12,0 X= 15,8 x 11,7 (N= 6)
De la Peña (2013c): 16,1 a 16,3 x 11,4 a 12 X= 16,2 x 11,7 (N= 3)



Pesos
Di Giacomo (2005h): 0,9 a 1,0 X= 0,9 (N= 6)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,075 X = 0,075 (N= 3)

PICHONES
Descripción
Milat y Klimaitis (1993). Pichones de 4-5 días de edad. Piel rosado-anaranjado. Corona y espalda suave y largo plumón grisáceo. Alas con cortos y delgados canutos gris oscuro. Vientre con dos largas bandas laterales de incipientes canutos amarillo-verdoso. Pico y comisuras rictales amarillo-anaranjado al igual que el interior de la boca.

Generalidades
Milat y Klimaitis (1993). Período de incubación 11 a 13 días.
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. La permanencia de los pichones en el nido fue de13 días.


Cayastá.Santa Fe.16-04-2008


La Camila.Santa Fe.02-12-1997

Observaciones
De la Peña (2013c): El 23-03-2001, en Concordia, dpto. Concordia, Entre Ríos, una pareja alimentaba a un juvenil. Se desplazaban en lo alto de los árboles.



Depredación
Di Giacomo (2000).Adulto capturado por *Falco rufigularis*.
Di Giacomo (2005h). Adulto capturado por *Glaucidium brasilianum*.
Andreu y Fernández (2010). Adulto capturado*Cyclarhis gujanensis*

Más información:
Milat y Klimaitis (1993)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Amarillo en la parte ventral. Gris azulado en la dorsal. Dos bandas alares blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Setophaga pitiayumi pitiayumi (Vieillot, 1817)desde el norte del país hasta Mendoza, La Pampa, este de Río Negro y este de Chubut.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Catorce subespecies. Extenso rango de distribución desde el sur de Texas, Estados Unidos, Centro América y Sud América, hasta Argentina. Ausente en la cuenca del Amazonas. Comprende: Estados Unidos, Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Setophaga pitiayumi pitiayumi (Vieillot, 1817)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Cueto (1996); Cueto y López de Casenave (2000); Dabbene (1919b) , Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey (1992); Doiny Cabré (2006); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2004); Lucero et al. (2011); Maugeri (2002a); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Milat y Klimaitis (1993); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Soave et al. (1999)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Contreras (1987b); Vides Almonacid (1999); White (1882)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 12-03-1981)

Chaco
Citas:Bodrati y Pietrek (2000); Bodrati y Salvador (2015a); Chatellenaz (2005); Moschione y Bishels (2004)

Observaciones: De la Peña (Cerrito, dpto. Bermejo, 06-05-1988)

Chubut
Citas: Navas (1994); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Chatellenaz y Ferraro (2007); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1993); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918)

Observaciones: De la Peña (Empedrado, dpto. Empedrado, 23-11-1993)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992); Contreras (1980-81); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Roitman et al. (1997); Serié y Smyth (1923); Straneck (1990c)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Fiora (1934); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas:Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (1997); Maceda y Kin (2001)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Giacomelli (1923); Lobo Allende et al. (2014); Nores y Cerana (1990)

Mendoza
Citas: Sosa (2009)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); White (1882)

Observaciones: De la Peña (El Dorado, dpto. El Dorado, 21-09-1993)

Río Negro
Citas:Gelain y Tolosa (2011)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1988, 1990); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene (1987); Lucero (2013i)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Wilson(1926)

Santiago del Estero
Citas: Codesido y Bilenca (2000); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Alabarce (1987); Antelo y Brandán (2006); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009);
Capllonch (2007); Capllonch y Aráoz (2007); Echevarría et al. (2008a, 2011b); Lucero (1983) ; Lucero, M. M.et al. (2002); Malizia et al. (1998); Ortiz et al. (2011, 2013); Ortiz y Aráoz (2014); Soria et al. (2010)

Observaciones: De la Peña (Horco Molle, dpto. Capital, 12-05-1987)

ARAÑERO ESTRIADO *Setophaga striata* (J. R. Forster, 1772)

Otros nombres: Arañero canadense. Reinita. Reinita estriada.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13,5 cm.
Peso: Curson (2010): 9,7-20,9 g
Coloración. Pico negruzco. Patas amarillo naranja. Iris pardo.
Macho. Dorsal gris oliváceo estriado de negro. Cejas y regiones malares blanquecinas. Ventral blanca. Flancos estriados de negro. Alas negras. Dos bandas blancas en las cubiertas alares. Cola negra con mancha blanca en las láminas internas de los dos pares de plumas externas.
Hembra. Ventralmente blanca con tinte amarillento oliváceo.

HÁBITAT
Bosques, selvas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal olivácea estriada. Ventral blanca. Dos bandas alares y manchas en la cola blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Setophaga striata (J. R. Forster, 1772)migratorio de Norteamérica. Misiones, noreste de Corrientes y este de Buenos Aires.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en Alaska y Canadá donde es abundante. Es el parúlido de migración más larga, más de 8.000 km desde Alaska a Brasil. Argentina está al sur del área habitual de migración pero llega ocasionalmente.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Olrog (1967a, 1967b)

Corrientes
Citas: Erize (2008)

Misiones
Citas:Bodrati (2012); Chebez (1996a, 2009); Partridge (1961a, 1961b); Saibene et al. (1996)

ARAÑERO CORONADO GRANDE *Myiothlypis bivittata* (Lafresnaye y d´Orbigny, 1837)

Otros nombres: Arañero amarillo. Arañero cejinegro. Pula de copete canela.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14 cm.
Peso: Contreras (1983b): N=1 (?) 12 g; Salvador (1988): N= 2 (H) 12,0 y 13,0 g, N= 4 (M) X= 12,5 g (Rango 12,0 a 14,0); Salvador (1990a): N= 9 (?) X= 13,7 g (Rango 12,5 a 14,0); Auer et al. (2007): N= 20 (M) X: 14,2 g, N= 14 (H) X: 14 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 21 X= 13,1 g (Rango 11,0 a 16,0), N= 4 X= 14,0 g (Rango 13,5 a 14,6)
Coloración. Pico negruzco. Patas naranja. Iris pardo.
Centro de la corona amarillo anaranjado. Lados grises plomizos. Lorum negruzco. Cejas y párpados inferiores amarillos con tono oliva. Dorsal, alas y cola olivas. Ventral amarillo.



COMPORTAMIENTO

Alimentación
Blake y Rougés (1997). **Insectos:** Coleoptera. Formicidae. Hymenoptera. Thysanoptera. Larvas.**Arácnidos:** Arachnida. **Vegetales:**Futos.

HÁBITAT
Arbustales y matorrales en selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Redondeado con entrada lateral. Emplea fibras vegetales

Auer et al. (2007). Parque Nacional El Rey, dto. Anta, Salta, 111 nidos, entre mediados de octubre y mediados de diciembre, en el suelo, postura promedio 2,9 huevos.

Huevos
Pone 2 a 3 huevos blanco con leve tinte rosado con pintas pardas, más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Auer et al. (2007): X: 21,0 x 14,5 (N= 7); 2,3 g

Generalidades

Auer et al. (2007): La incubación estuvo a cargo de la hembra y la alimentación de los pichones a cargo de la pareja, un período de incubación promedio de 14,8 días y una permeancia de los pichones en el nido promedio de 10,9 días.



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cejas, corona semioculta y parte ventral amarillas.
Diferenciarlo del Arañero de cejas amarillas y del Arañero coronado chico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Myiothlypis bivittata argentinae Zimmer, 1949 en el sureste de Jujuy, norte de Salta y Tucumán.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Dos poblaciones bien separadas, una en Guyana y la otra en la ladera este de los Andes de Perú, Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Myiothlypis bivittata argentinae Zimmer, 1949

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Capllonch (2007); Chebez et al. (1998); Contreras (1983b); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Fanjul et al. (2008, 2009); Hartert y Venturi (1909); Hellmayr (1935); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988); Salvador y Di Giacomo (2014); Salvadori (1897); Straneck (1990f) ; Zimmer (1949)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1988, 1990); Capllonch (2007); Coconier et al. (2007); Hartert y Venturi (1909); Moschione et al. (2013); Salvador (1990a); Salvador y Di Giacomo (2014)

Tucumán
Citas:Ortiz et al. (2013c)

ARAÑERO DE PICO PÁLIDO *Myiothlypis flaveola* (S. F. Baird, 1865)

Otros nombres: Arañero amarillo. Arañero pálido. Arañero pico pálido.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14 cm.
Peso: Curson (2010): 9,0-16,0 g
Coloración. Pico negruzco. Patas naranja. Iris pardo.
Dorsal, alas y cola verdes oliváceas. Cejas amarillas. Ventralmente amarillo con tinte verdoso en el pecho.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Lópes et al. (2005).**Insectos:** Coleoptera. Diptera. Formicidae. Hemiptera. Homoptera. Hymenoptera. Isoptera. Lepidoptera. Orthoptera. **Arácnidos:** Araneae.

HÁBITAT
Bosques, selvas en galería.



NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cola redondeada. Pico claro. Patas amarillentas. Verdoso con la parte ventral amarilla.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Myiothlypis flaveola (S. F. Baird, 1865)en el noreste de Formosa.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Poblaciones separadas en Bolivia, norte de Paraguay,centro y sur deBrasil, norte de Argentina por un lado y en el norte de Sud Américaen Colombia, Venezuela y Guayanas.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Formosa
Citas: Heinonen Fortabat et al. (1995); López Lanús (1997); Mazar Barner y Pearman (2001)

ARAÑERO DE CEJAS AMARILLAS *Myiothlypis signata* Berlepsch & Stolzmann, 1906

Otros nombres: Arañero ceja amarilla. Arañero pechiamarillo. Arañero verde amarillo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13 cm.
Peso: Salvador (1988):N= 1 (H) 12,0 g, N= 1 (M)11,0 g; Auer et al. (2007): N= 9 (M) X: 12 g, N= 4 (H) X: 11,8 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 4 X 10,8 g (Rango 10,4 a 11,3)
Coloración. Pico negruzco. Patas naranja. Iris pardo.
Dorsal, alas y cola oliváceas. Cejas amarillas. Lorum negruzco. Ventral amarilla.



COMPORTAMIENTO

Alimentación
Blake y Rougés (1997). **Insectos:**Coleoptera. Formicidae. Hymenoptera. **Arácnidos:** Arachnida. **Vegatales:** Frutos.

HÁBITAT
Estrato bajo y medio en selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Auer et al. (2007). Parque nacional El Rey, dto. Anta, Salta, 38 nidos, entre mediados de octubre y mediados de diciembre, en el suelo, postura promedio 2,6 huevos.



Huevos
Pone 2 a 3 huevos blanco blancos con pintas castañas, pardas y gris violáceas más concentradas hacia el polo obtuso.

Medidas
Auer et al. (2007): X: 19,5 x 14,8 (N= 7); 2,2 g

Generalidades
Auer et al. (2007). La incubación estuvo a cargo de la hembra y la alimentación de los pichones a cargo de la pareja, período de incubación promedio de 16,6 días y permeancia de los pichones en el nido promedio de 12,5 días.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal, alas y cola oliváceas. Cejas y parte ventral amarillas.
Se diferencia del Arañero coronado grande y del Arañero coronado chico por carecer de corona amarilla anaranjada, y además de este último por tener otro color de cejas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
*Myiothlypis signata flavovirens*Todd, 1929entre los 1000 y los 2500 m de altura en el sureste de Jujuy y norte de Salta.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies.Perú, Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

*Myiothlypis signata flavovirens*Todd, 1929

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Capllonch (2007b); Chebez et al. (1998); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Moschione y Segovia (2005); Olrog (1973); Salvador (1988); Straneck (1990f)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capllonch (2007b); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Salvador y Di Giacomo (2014)

ARAÑERO SILBÓN *Myiothlypis leucoblephara* (Vieillot, 1817)

Otros nombres: Arañero. Arañero ceniciento. Arañero gris. Arañero oliváceo. Contramaestre.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14 cm.
Peso: Chatellenaz (2008): N= 9 (?) X: 14,2 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 14,5 g
Coloración. Pico negruzco. Patas naranja. Iris pardo.
Cabeza gris. Corona más oscura. Cejas y regiones perioculares blancas. Dorsal olivácea. Ventral blanquecina con tono gris en el pecho. Alas y cola pardas con las barbas externas ribeteadas de oliva.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Chatellenaz (2002, 2008). **Insectos:**Coleoptera (Curculionidae, Bruchidae, Chrysomelidae, Elateridae, no identificado). Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera. **Arácnidos:**Arachnida.
Lopes et al. (2005). **Insectos:**Coleoptera. Formicidae. Hymenoptera.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es una sucesión descendente de agudos silbos: Silidididididlidididlididedehh

HÁBITAT
Estrato bajo en bosques y selvas, capueras, selvas en galería.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones, Formosa, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Taza de fibras vegetales y hojas en la base. Internamente fibras finas.Oculto. Elaborado



Hartert y Venturi (1909). Villa Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe,18-11-1905, nido con 3 huevos.
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Guaycolec, dpto. Formosa, Formosa, 26-11-1985, nido con 3 pichones. El nido se hallaba en un área de selva en galería, en el suelo semienterrado y bien disimulado entre hojarascas, globular con entrada lateral a ras del suelo, hecho de raicilla finas y tallitos muy delgados y por encima hojitas, altura 12 cm, ancho 13 cm, boca 4 x 6 cm, diámetro del lecho 5 cm.
De la Peña (2013c). Capioví, dpto. Libertador Gral. San Martín, Misiones, 15-10-2001, 2 huevos (Localizado por Máximo Uranga)

Huevos
Pone 2 ó 3 huevos, blanquecinos con pintas y manchas grises y castañas más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 20,0 x 15,3 ; 20,0 x 15,4 y 20,5 x 15,5
De la Peña (2013c). 21,3 a 21,8 x 14,3 a 14,6 X= 215 x 14,4 (N= 2)

PICHONES
Salvador en De la Peña (2010b). De unas 48 horas de vida. Ojos cerrados, piel anaranjada, plumón dorsal grisáceo, comisuras blanco amarillentas, interior de la boca naranja.

Observaciones
Di Giacomo (2005h).Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, 11-11-2001, un pichón volantón acompañado por dos adultos que lo alimentaban.



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza gris. Regiones perioculares blancas. Dorsal olivácea. Ventral blanquecina.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Myiothlypis leucoblephara (Vieillot 1917) en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, este de Formosa y Chaco y noreste de Santa Fe y Buenos Aires. Citado en Salta.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Reducida área de distribución en este de Paraguay, sureste de Brasil, Uruguay yArgentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas:Babarskas et al. (2003); Darrieu y Camperi (2001a); Mérida y Bodrati (2004); Montaldo et al. (1987); Moschione (1989); Pugnali y Chamorro (2008)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005, 2008b)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Contreras (1980-81, 1987b); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Darrieu y Camperi (1993); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992); De la Peña (2012b); De la Peña et al. (2003b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2011a); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Straneck (1990c)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Wetmore (1926b)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); De la Peña (2013c); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Salvador y Di Giacomo (2014)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Hartert y Venturi (1909)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

ARAÑERO RIBEREÑO *Myiothlypis rivularis* (Wied-Neuwied, 1821)




Otros nombres: Arañero de río. Arañero ocráceo. Pula de garganta leonada.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12,5 cm.
Peso: Storer (1989): N= 3 (M) 15 g, N= 4 (H) X: 12,6 g (Rango 12,5 a 13); Curson (2010): 11,5-18,5 g
Coloración. Pico negruzco. Patas rosadas. Iris pardo.
Corona grisácea. Dorsal, alas y cola oliváceas. Cejas blanquecinas. Ventralmente blanco ocráceo.

Voces
Straneck (*in litt*.). Su canto es una potente estrofa: Fiéfiéfiéfiéfiéfiéhhh que comienza suavemente y se hace más potente.

HÁBITAT
Orillas de arroyos y de ríos selváticos.



NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N		

Ubica el nido en huecos poco profundos, en barrancas. Forra la cavidad con pajitas y hojas. Internamente fibras finas. Oculto. Elaborado.



De la Peña (2013c). Puerto Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 12-10-1981, nido en un hueco en una barranca a 1,20 m de altura, 1 huevo y 1 pichón. Medidas: Diámetro interno de la tacita: 6 cm. Profundidad: 3 cm. Ancho: 8 cm. Boca oval de 6 x 5 cm. de diámetro.

Huevos
Pone 2 huevos, ovoidales, blancos con puntos pardos y castaños formando una corona en el polo mayor, pocas en el resto de la superficie.



Medidas
De la Peña (2013c): 17,6 x 13,3 (N= 1)
Peso
De la Peña (2013c): cáscara 0,079 (N= 1)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cejas blanquecinas. Dorsal olivácea. Ventral ocrácea.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Myiothlypis rivularis rivularis (Wied-Neuwied, 1821) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies.Poblaciones separadas en Venezuela, Guayanas, Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Myiothlypis rivularis rivularis (Wied, 1821)

Misiones
Citas: Benstead et al. (1998); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Contreras et al. (1994a); Chebez (1996a); De la Peña (1984d); Giai (1951); Giraudo et al. (1993); Martínez Gamba (2014); Straneck (1990h)



Puerto Iguazú. Misiones. 12-10-1981

ARAÑERO CORONADO CHICO *Basileuterus culicivorus* (Deppe, 1830)

Otros nombres: Arañero. Arañero chico. Arañero común. Arañero coronado. Pula-pula. Pula-pula coronda.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 2 X= 17,5 g (Rango 17,0 a 18,0); Darrieu y Camperi (1993): N= 1 (M) 10 g, N= 1 (H) 9,0 g; Chatellenaz (2008): N= 18 (?) X: 8,5 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 9,3 g
Coloración. Pico pardo. Patas naranja pálido. Iris pardo.
Cabeza gris. Corona semioculta naranja. Cejas blancas, por arriba una línea oscura. Dorsal gris olivácea. Ventral amarillo. Alas y cola pardas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Rougés y Blake (2001).**Insectos:** Coleópteros. Dípteros. Formícidos. Hemíptero. Hymenóptero. **Vegetales:** Semillas.**Arácnidos:** Araña. Pseudoscorpionida.
Chatellenaz (2002, 2008). **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Curculionidae, Bruchidae). Diptera. Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (Noctuidae). **Arácnidos:**Arachnida.
Chatellenaz (2002).**Insectos:** Hemiptera (Pentatomidae).
Ferreira Fadini y De Marco Jr. (2004). **Vegetales:**Frutos de *Micomia tentaticulifera.*
Olson y Alvarenga (2006).**Insectos:** Isoptera (Termitas).
De la Peña (2011a). **Insectos**.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es una estrofa de silbos muy agudos: Sibísibísibíbidídíehh ....sibísibísibíbidídéhh ....

HÁBITAT
Estrato bajo y medio en bosques, selvas y selvas en galería.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N		N	

Tiene forma globular, redondeado, de fibras vegetales. Mide 18 cm. de alto, 9,5 cm. de diámetro.

Dinelli (1918b).Tafí viejo, dpto. Tafí Viejo, Tucumán, Girard halló un nido en el suelo, muy oculto. Construido con pajas y fibras de helechos, redondeado. Mide 12 x 9 cm. Tenía 4 huevos.
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, un nido el 30-09-2002, puso 3 huevos. Estaba en una depresión del terreno. Tiene forma globular con amplia entrada lateral.
De la Peña (2013c). Cayastá, dpto. Garay, Santa Fe, 22-11-1981, nido con 2 huevos.
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Nacional Chaco, Chaco, Bodrati localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*

Huevos
Pone 2 huevos, ovoidales, blancos con pintas y manchitas pardas claras y oscuras, castañas y violáceas, más concentradas en el polo mayor.



Medidas
Dinelli (1918b): X= 18,0 x 13,0

Di Giacomo (2005h): 17,5 a 17,9 x 13,6 a 14,1 X= 17,6 x 13,9 (N= 3)
De la Peña (2013c): 17,7 a 18 x 13,5 a 13,6 X= 17,8 x 13,5 (N= 2)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 1,6 a 1,8 X= 1,7 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscara 0,083 a 0,084 X = 0,083 (N= 2)



Generalidades
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos.
Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Ventral amarilla. Semioculta corona naranja. Cejas blancas y oscuras. Dorsal gris olivácea.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Basileuterus culicivorus azarae Zimmer, 1949en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y noreste de Santa Fe y de Buenos Aires y *Basileuterus culicivorus*

viridescens Todd, 1913en Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa y Chaco.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Trece subespecies. Amplia zona de distribución desde Méjico a la Argentina. Ausente en Amazonia. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Basileuterus culicivorus azarae Zimmer, 1949

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Cueto y López de Casenave (2000); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Soave et al. (1999)

Corrientes

Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1980-81, 1987b); Darrieu y Camperi (1993, 2011a); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008)

Formosa

Citas:Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Nores (1992)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Salvador y Di Giacomo (2014)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 07-02-1975)

Santa Fe

Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Hartert y Venturi (1909) Pautasso (2002b)

Basileuterus culicivorus viridescens Todd, 1913

Catamarca

Citas: Capllonch (2007); Carma (2009); Nores e Yzurieta (1982a); Nores et al. (2000)

Chaco

Citas:Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005, 2008b); Salvador y Bodrati (2014a)

Observaciones: De la Peña (Cerrito, dpto. Bermejo, 03-05-1988)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) ; Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Fiora (1934); Moschione y Segovia (2005)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1907)

Salta
Citas: Capllonch (2007); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Santiago del Estero
Citas: Ferrari et al. (2006)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán (2006); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007b); Capllonch y Aráoz (2007); Echevarría et al. (2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Malizia et al. (1998); Ortiz et al. (2011, 2013); Ortiz y Aráoz (2014); Rougés y Blake (2001); Soria et al. (2010)

Observaciones: De la Peña (Horco Molle, dpto. Capital, 11-05-1987)

ARAÑERO DE GARGANTA NEGRA *Myioborus miniatus* (Swainson, 1827)

Otros nombres: Arañero garganta negra.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13-14 cm.
Peso: Curson (2010): 6,0-15,0 g
Coloración. Pico y patas negruzcos. Iris pardo.
Garganta, capucho y dorso grises oscuros. Parte central de la corona rojiza. Pecho y vientre amarillos. Subcaudales blancas. Alas y cola grises oscuras. Rectrices externas blancas, el par próximo con puntas blancas.

HÁBITAT
Bosques y selvas montanos.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza oscura. Corona castaña. Ventralmente amarillo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Myioborus miniatus verticalis (d´Orbygny & Lafresnaye, 1837)en Jujuy y Salta.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Doce subespecies. Amplio rango de distribución desde el norte de Mejico hasta Argentina, por el oeste, en ambiente montano. Comprende: Méjico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Guyana, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Myioborus miniatus verticalis (d´Orbygny & Lafresnaye, 1837)

Jujuy
Citas:Moschione y Segovia (2005); Segovia y Moschione (2005)

Salta
Citas: Di Giacomo(1995); Di Giacomo et al. (1998); Moschione et al. (2013)

ARAÑERO DE CORONA ROJIZA *Myioborus brunniceps* (d´Orbygny & Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Arañero cabecicastaño. Arañero de cabeza castaña. Arañero corona rojiza.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 1 9,0 g; Salvador (1988): N= 4 (H) 8,8 g (Rango 8,5 a 9,3), N= 7 (?) 9,4 g (Rango 8,7 a 10,2); Salvador (1990a): N= 1 (?) 9,5 g; Auer et al. (2007): N= 3 (M) X: 8,9 g, N= 4 (H) X: 8,8 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 8 X= 8,2 g (Rango 7,6 a 9,7), N= 1 8,5 g
Coloración. Pico y patas negruzcos. Iris pardo.
Frente negra. Angostas cejas y anillos oculares blancos. Corona castaña. Dorsal gris con tono oliva en la espalda. Ventral amarilla. Alas pardas. Cola negra con las timoneras externas blancas.



COMPORTAMIENTO

Alimentación
Blake y Rougés (1997). **Insectos:**Coleópteros. Formícidos. Hymenópteros. **Arácnidos:** Arachnida.
Rogués y Blake (2001). **Insectos:**Coleópteros. Dípteros. Formícidos.Hymenópteros. **Arácnidos:**Araña.

Voces
Straneck (*in litt*.). Su canto es una serie de sílabas agudas, con ligera modulación ascendente: Síipsíisisisisisihhhh.

HÁBITAT
Bosques, selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta y Córdoba.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Auer et al. (2007). ParqueNacional El Rey, dto. Anta, Salta, 38 nidos, entre principios de octubre y principios de diciembre, en el suelo, postura promedio 2,6huevos.

Heredia y Salvador (2014). Las Vaquerías, dto. Punilla, Córdoba, 19-11-2005, 2 pichones.El nido se hallaba en una quebrada húmeda y sombría, estaba en un declive con una inclinación de 45º, con un sustrato de tierra y rocas; con sotobosque bajo de helechos, herbáceas y abundantes hojarascas, a unos 20 m de un arroyo. El nido se encontraba muy oculto y camuflado en una pequeña depresión en el suelo, en la base de una mata de helechos, era esférico con entrada lateral, elaborado con detritos vegetales, nervaduras, trozos de hojas y unas pocas gramíneas y pajitas: interiormente se componía de estos mismos materiales, pero mucho más finos. Medía 9c m de alto, 10 cm de ancho y 9 cm de profundidad, con una boca de entrada con un diámetro de 5 cm, la cámara de incubación era de unos 4,5 cm de diámetro.
Narosky e Yzurieta enHeredia y Salvador (2014). Mallín, dto. Punilla, Córdoba., 06-10-1973, nido en la base de una pared rocosa cubierta de líquenes y musgos, en un hueco de unos 8 cm de diámetro, terminado, sin postura.

Huevos
Pone 2 o 3 huevos blancos con pintas castañas, pardas y gris violáceas más concentradas hacia el polo obtuso.

Medidas
Auer et al. (2007): X: 17,3 x 13,4 (N= 6); 1,6 g


Generalidades
Auer et al. (2007). La incubación estuvo a cargo de la hembra y la alimentación de los pichones a cargo de la pareja, período de incubación promedio de 16,6 días y permeancia de los pichones en el nido promedio de 12,6 días.

Otros
Haedo Rossi y Esteban (1972). Un ejemplar con Albinismo parcial.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Corona castaña. Cejas y anillos oculares blancos. Ventral amarilla. Dorsal gris. Cola negra con las plumas externas blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Myioborus brunniceps (d´Orbygny & Lafresnaye, 1837)en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba y San Luis.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Bolivia y Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Alabarce et al. (1987, 1990); Alabarce y Antelo (1993); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Capllonch et al (2011a); Carma (2009); Nores y Cerana (1990); Vides Almonacid (1999); White (1882)

Observaciones: De la Peña (Cuesta del Clavillo, dpto. Andalgalá, 18-12-1999)

Córdoba
Citas: Baldo y Ordano (1993); Heredia (2006); Heredia y Salvador (2014); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta

(1979); Salvador y Di Giacomo (2014); Sferco y Nores (2003); Straneck (1990d); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Vaquerías, dpto. Punilla, 23-10-1976; Ascochinga, dpto. Colón, 15-09-2006; Jesús María, dpto. Colón, 23-03-2007)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Capllonch et al. (2011a); Chebez et al. (1998); Fiora (1934); Malizia et al. (2005); Mazza y Fiora (1932); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988); Salvadori (1897);

Observaciones: De la Peña (Laguna de Yala, dpto. Capital, 07-02-1983)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Salvador (1988) Olrog y Rumbill anillado en Heredia y Salvador 2014

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Salvador (1990a); Salvador y Di Giacomo (2014); Soria et al. (2010)

Observaciones: De la Peña (Camino de Cornisa, dpto. La Caldera, 30-11-1978; Yatasto, dpto. Metán, 06-02-1983)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene et al. (1995)



Ascochinga. Córdoba. 28-09-2909

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santiago del Estero
Citas: Ferrari et al. (2006)

Tucumán

Citas: Alabarce y Antelo (1996); Antelo y Brandán (2006); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch et al. (2011a); Cocimano et al. (2005); Dinelli (1918); Echevarría et al. (2008a, 2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Luceroet al. (2002); Malizia et al. (1998); Ortiz et al. (2011, 2013); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Rougés y Blake (2001); Soria et al. (2010)

Observaciones: De la Peña (Horco Molle, dpto. Capital, 11-05-1987)

BOYEROS

FAMILIA: ICTERIDAE

Aves de pico corto y fuerte o cónico, puntiagudo.

Se alimentan de frutas, semillas, hojas, flores, granos, larvas, arácnidos, insectos.

Nidifican en los árboles, arbustos, pajonales, juncales o en el suelo.

Ponen hasta 4 ó 5 huevos. Algunas especies son parásitas.

Frecuentan montes, selvas, bañados, esteros, áreas rurales, praderas, parques.

YAPÚ *Psarocolius decumanus* (Pallas, 1769)

Otros nombres: Acahé-saiyú. Acahé-rubichá. Boyero. Chorai. Conoto negro. Boyero. Boyero de cola amarilla. Boyero grande. Tojo. Yapú. Yacú-guazú. Yapú-guazú. Yapú-saiyú. Yepú.

DESCRIPCIÓN
Largo: Macho 42 cm, Hembra 32 cm.
Peso: Contreras (1983b): N=3 (H) 136,9, 145,0 y 171,0 g; Darrieu y Camperi (1994): N= 2 (H) 163,9 y 171,0 g
Coloración. Pico amarillo oliváceo.Patas negras. Iris azul.
Negro lustroso. Inferior del lomo, rabadilla, supracaudales y subcaudales castaños. Plumas centrales de la cola negras, el resto amarillos. Plumas alargadas en la cabeza, formando una cresta.
La hembra es negra opaca.



COMPORTAMIENTO

Alimentación

HÁBITAT
Bosques, selvas.
NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Corrientes.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Bolsa colgante. Emplea fibras vegetales. Hojas en la cámara.
Uranga (*in litt.*). Rincón Ombú Chico, dpto. Ituzaingó, Corrientes, 11-11-2013, colonia con 10-20 nidos; Chicoana, dpto. Salta, 04-11-2013, de 6 a 7 nidos, con huevos y con pichones.
Di Giacomo y López Lanús (2000). Serranía de las Pavas, Parque Nacional Baritú, dpto. Santa Victoria, Salta, 13-11-1992, nido con 2 huevos.

Di Giacomo y López Lanús (2000). Parque Nacional Calilegua, dptos. Ledesma y Valle Grande, Jujuy, A. Caradonna registró una colonia de cuatro nidos en 15-10-1987 y el 13-10-1988 otra con cinco nidos. Otro nido en octubre de 1990.
Di Giacomo y López Lanús (2000). Parque Nacional Calilegua, dptos. Ledesma y Valle Grande, Jujuy, noviembre de 1991, 4 nidos; 13-11-1992, dos nidos; el 16-11 colonia de 6 nidos.



Chicoana. Salta. 04-11-2013. Foto: Máximo Uranga

Huevos
Pone 1 ó 2 huevos, verdes pálidos con pintas y líneas negruzcas.



Medidas
Ihering (1900): 32 a 34 x 25 a 26

Más información:
Di Giacomo y López Lanús (2000).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico amarillo oliváceo. Iris azul. Plumas alargadas en la cabeza. Cola larga negra y amarilla.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Psarocolius decumanus maculosus (Chapman, 1920)en Misiones, Corrientes, este de Formosa, norte de Salta y Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Extenso rango de distribución en Centro América, norte y centro de Sudamérica hasta Argentina. Está presente en: Argentina; Bolivia, Brasil; Colombia; Costa Rica; Ecuador; Guayana Francesa; Panamá; Paraguay; Perú; Surinam; Trinidad y Tobago; Venezuela.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Psarocolius decumanus maculosus (Chapman, 1920)

Corrientes
Citas: Contreras (1983b, 1987b); Darrieu y Camperi (1994); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Formosa
Citas:Contreras (1987c); López Lanús (1997); Narosky y Martelli (1995); Ramírez-Llorens et al. (2003)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Di Giacomoy López Lanús (2000); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Moschione y Segovia (2005); Olrog (1958b)

Misiones
Citas: Bertoni (1913); Chebez (1992, 1996a); Dabbene (1914); Olrog (1963, 1979); Zotta (1935, 1942)

Salta
Citas: Burgos en Chebez (2008); Coconier et al. (2007); Contreras (1983b); Moschione et al. (2013)

BOYERO NEGRO *Cacicus solitarius* (Vieillot, 1816)

Otros nombres: Boyero común. Boyero grande. Boyero islero. Boyero pico blanco. Islero. Pico de hueso.
DESCRIPCIÓN
Largo: Macho 25 cm, Hembra 24 cm.
Peso: Contreras (1983c): N= 3 (M) X: 81,2 g (Rango 75,6 a 84,8), N= 1 (H) 59,8 g; Di Giacomo (2005h): N=1 86,5 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 4 X= 85,1 g (Rango 82,5 a 90,5)
Coloración. Pico verde pálido, con base celeste. Patas gris oscuro. Iris rojo.
Negro.
COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en pareja.
De la Peña (2011a). Recolecta y hurga debajo de cortezas o en el interior de flores,en la parte media y alta de los árboles (ramas y follaje) hasta los 6 m.Picotea el fruto del Tasi (*Morrenia brachystephana*) para llegar a las semillas. A las Moras las corta y tritura.

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Fruto de *Morus alba*.
Zotta (1936). **Insectos:** Coleóptero (Curculionidae). Orthóptero.
Baliño (1984). **Vegetales:** Fruto *Melia azedarach.*
Rossetti et al. (2003). **Vegetales:** Semillas de *Cissus sicyoides.* Compositae. Leguminosae, *Urera aurantiaca.* **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Curculionidae, Elateridae, Hydrophilidae). Hymenoptera (Formicida: *Pheidole* sp.). Lepidoptera (larvas y adultos). Orthoptera (Acridiidae: *Dichroplus* sp.).
Alessio et al. (2005). **Vegetales:** Semillas de *Cissus sicyoides.* Compositae. Leguminosae, *Urera aurantiaca.* **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Curculionidae, Elateridae, Hydrophilidae). Hymenoptera (Formicida: *Pheidole* sp.). Lepidoptera (larvas y adultos), Orthoptera (Acridiidae: *Dichroplus* sp.)
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:** Pulpa de *Citrus* sp*.,* Fruto *Harrisia* sp*.* Otros: Desperdicios.
Salvador y Bodrati (2013c). **Reptiles:** Lagartija.
De la Peña (2011a). **Vegetales:** Pulpa de la chaucha de *Gleditsia triacanthos.* Semilla arilada *Passiflora caerulea*. Semilla de *Araujia brachystephana*. Pulpa del fruto de *Citrus sinensis.* **Insectos:** Larvas.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.



Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es variado, compuesto por voces guturalesy silbos potentes: Tryyykioh ... Popiplüplü ... guoguoguo . fíieh. Imita el canto de otras aves (Benteveo).

HÁBITAT
Sabanas, bosques, selvas, selvas en galería.
NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Formosa, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			N	N				N	N	N	N

El nido tiene forma de saco o bolsa, alargado, colgante de ramas. La boca en la parte superior. Emplea en la construcción fibras vegetales. En la cámara a veces coloca hojas.Expuesto. Elaborado.
Pereyra (1938b). Noreste de la provincia de Buenos Aires, nidifica en el delta.
Contino (1980). Nidifica en el noroeste.
Beltzer (1986a). Río Colastiné, dpto. La Capital, Santa Fe, 18-12-1986, nido con un huevo de *Molothrus bonariensis.*
Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 6 nidos.
Chatellenaz y Ferraro (2000). San Bernardo, dpto. O´Higgins, Chaco, 3 nidos en cercanías del Puente Gral. Belgrano, río Tragadero, dpto. San Fernando, Chaco, 07-05-1999 y 04-12-1999.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 4 nidos.
Di Giacomo (2005h).Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre octubre y enero. Se estudiaron 31 nidos.
Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Di Giacomo et al. (2009). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa,nido parasitado por el Tordo de pico corto *Molothrus rufoaxillaris*.
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 22, desde el 09-10-1971 al 20-10-2909, uno en Entre Ríos, los restantes en Santa Fe.
Medida: Largo: de 45 a 70 cm. Diámetro en la parte inferior: 15 cm. Diámetro en la parte superior: de 7 a 10 cm. Boca: de 10 a 18 cm. de alto x 5 a 7 cm. de ancha.
Altura: Nido más bajo: 2,50 m. Nido más alto: 12 m.
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Nacional Chaco, Chaco, Bodrati localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*



Huevos
Pone 2 ó 3 huevos, ovoidales, blancos con pintas pequeñas, rayitas y manchitas pardas y grises, distribuidas por toda la superficie pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 26,6 a 33,7 x 19,0 a 21,6 X= 31,0 x 19,6 (N= 4)
Smyth (1928): 29,0 a 29,5 x 20,0
Pereyra (1938b): 29,0 x 20,0
Di Giacomo (2005h): 27,7 a 31,9 x 17,8 a 19,8 X= 29,8 x 18,9 (N= 26)
De la Peña (2013c): 29,5 a 31 x 19,8 a 20,7 X= 30,2 x 20,2 (N= 7)



Pesos
Di Giacomo (2005h): 3,5 a 6,4 X= 5,1 (N= 24)

De la Peña (2013c): 6,1 a 6,5 X= 6,3 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,355a 0,420 X= 0,390 (N= 7)

Generalidades
Contreras (1990b). El período de incubación es de 16 días.
El pichón permanece en el nido 18-21 días.
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de14 ó 15 días.
Los pichones permanecen en el nido entre 20 y 23 días.
De la Peña (2013c). Demoró en la construcción del nido unos 16 días.
La pareja construye. En una oportunidad trajo una fibra larga de unos 60 cm. Tardó 1 minuto y 30 segundos en tejerla.

Otros
Beltzer (1986a).Di Giacomo (2005h).Di Giacomo et al. (2009). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

Más información:
De la Peña (2013c)



Esperanza.Santa Fe.15-05-2008


Esperanza.Santa Fe.27-11-2007




Esperanza. 07-11-2015

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Negro con el pico verde pálido.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Cacicus solitarius (Vieillot, 1816)desde Misiones, Formosa, Santa y Jujuy hasta Santiago del Estero, Santa Fe y noreste de Buenos Aires
Observado además en Córdoba.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Su amplia zona de distribución abarca la Amazonia, el Pantanal, y el Chaco comprendiendo: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Darrieu y Camperi (2001a); GORA (1991); Hartert y Venturi (1909); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Chaco
Citas:Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005); Contreras (1983c); Moschione y Bishels (2004)Salvador y Bodrati (2014a).

Córdoba
Citas: Spinuzza y Villegas (2013)

Observaciones: Salvador, S. (Villa María, posiblemente escapada de cautiverio)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1980-81, 1983c, 1987c, 1990b); Darrieu y Camperi (1994); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá, 19-09-79)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Bodrati y Salvador (2015a); De la Peña (2012b, 2013c); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Straneck (1990c)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomoet al. (2010); Di Giacomo(2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Camperi (1989)Camperi et al. (2013), camperi 1989b

Misiones
Citas: Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Savigny (2010)

Salta
Citas:Alabarce y Lucero (1977); Babarskas et al. (1995); Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: Alessio et al. (2005); De la Peña (2011a, 2011b, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti et al. (2003); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero
Citas: Coria et al. (2013); Nores et al. (1991); Nores y Yzurieta (1981)

BOYERO CACIQUE *Cacicus haemorrhous* (Linnaeus, 1766)

Otros nombres: Boyero de rabadilla encarnada. Boyero de rabadilla roja. Boyero real. Cambá. Churrai. Melchor. Yacú caraguatá.

DESCRIPCIÓN

Largo: Macho 25 cm; Hembra 20 cm.

Peso: Belton (1985): N= 1 (M) 93 g, N= 4 (H) 62 a 70 g; Storer (1989): N= 2 (M) 85 y 89 g, N= 3 (H) X: 63,7 g (Rango 60 a 66); Fraga (2011c): 62-96,5 g

Coloración. Pico verde amarillento. Petas negras. Iris celeste.
Negro lustroso. Lomo y rabadilla rojos.

COMPORTAMIENTO
Anda en grupos. Entre la parte media y alta de los árboles.

Alimentación
Bodrati (2006b). **Vegetales:** Fruto de *Plinia trunciflora.*
Salvador y Bodrati (2014b).**Insectos:** Lepidoptera (orugas, polillas), Orthoptera (Tettigonidae, Acriididae, Romaleidae), Mantodea (Mantidae), Hemiptera (Cicadidae,Membracidae), Hymenoptera (Vespidae), Blattodae (Blattidae). **Vegetales:** frutos de Pindó (*Syagrus romanzoffiana*)
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.



Voces
Straneck (*in litt*.). Suele cantar y vocalizar en grupos coloniales muy bullangueros. Su voz es potente y variada, Glui . gluí .. Tshutshutshu .. tiouh . tiouh ..

HÁBITAT
Bosques, selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Corrientes, Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

El nido tiene forma de saco o bolsa, alargado, colgante de ramas u hojas. La boca en la parte superior. Emplea fibras vegetales entrelazadas. En la base de la cámara puede colocar vilanos o plumas. Expuesto. Elaborado.

Saibene et al. (1996). Parque Nacional Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, nidifica.



Fraga (1996b). Iguazú, Misiones. Se examinaron 33 nidos de Boyero *Cacicus haemorrhous* (de 5 colonias). Se hallaron huevos o pichones del Tordo gigante en 16 nidos. Tenían de 1 a 7 huevos del Tordo por nido parasitado.
Fraga (2011a). Parque Nacional Iguazú, Aeropuerto Internacional Iguazú, Ciudad de Puerto Iguazú, dpto. Iguazú, Parque Provincial Uruguaí, dpto. Gral. Belgrano y Parque Provincial Esmeralda, dpto. San Pedro, Misiones, entre octubre de 1995 y noviembre de 2004, varias colonias. Estas colonias contenían de 16 a104 nidos.
Paso de los libres, dpto. Paso de los libres, Corrientes, colonias de 9 a 30 nidos.
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 7, desde el 18-09-1971 al 15-10-2001, todos en Misiones. Un nido tenía 2 pichones y un huevo de *Molothrus oryzivorus*.
Medidas: Largo: de 33 a 70 cm. Diámetro en la parte inferior: de 11 a 13 cm. Diámetro en la parte superior: de 9 a 10 cm. Boca: de 10 a 13 cm. de alto x 5 a 7 cm. de ancha.
Salvador y Bodrati (2014b). Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, colonia con 40 nidos entre el 8 y el 13 de octubre de 2012. En Pindó (*Syagrus romanzoffiana*)

Huevos



Pone 2 huevos, ovoidales u ovoidales alargado, blanco-cremaso rosados con pintas y manchitas castañas y grises distribuidas por toda la superficie pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Fraga (2011a): 28,7 x 19.4
De la Peña (2013c): 28 a 29,5 x 19,4 a 19,6 X= 28,4 x 19,5 (N= 3)
Peso
De la Peña (2013c): cáscaras 0,350 a 0,400 X= 0,310 (N= 3)
PICHONES
Descripción
Salvador y Bodrati (2014b). Nacen con los ojos cerrados. Piel de color carne-naranja y sin plumón. Pico amarillento claro, comisuras amarillentas y el interior de la boca rojo. Empluman de color negruzco con lavado de pardo, la rabadilla es color rojo-naranja, las patas son pardas, el iris pardo oscuro y el pico blanco amarillento.

Observaciones
De la Peña (2013c). El 18-09-1971, en Cataratas del Iguazú, una Palmera tenía 120 nidos.
Otros
Fraga (2011a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

Depredación
Fraga (2011a). Los Tucanés detruyen huevos y pichones.

Más información:
Fraga (2011a). De la Peña (2013c). Salvador y Bodrati (2014b).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Iris celeste. Negro con lomo y rabadilla rojos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Cacicus haemorrhous affinis (Swainson, 1834)en Misiones, Corrientes, este de Formosa y de Chaco y noreste de Santa Fe.



Puerto Iguazú.Misiones.29-09-1995



Puerto Iguazú.Misiones.12-10-1981





Puerto Iguazú.Misiones.12-10-1981

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. Amplia área de distribución, desde las Guyanas hasta Argentina, Comprende: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES

Cacicus haemorrhous affinis (Swainson, 1834)

Corrientes

Citas: Capllonch et al. (2005); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1994); Esteban (1953); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b);

Observaciones: De la Peña (Gobernador Virasoro, dpto. Santo Tomé, 21-03-1993)

Formosa
Citas:Contreras (1987c); López Lanús (1997)

Misiones
Citas: Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); De la Peña (2013c); Fraga (2011, 2011a); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Saibene et al. (1996); Salvador y Bodrati (2013a, 2014b); Straneck (1990g)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 08-02-1973)

Santa Fe
Citas: Giraudo et al. (2008)

BOYERO DE ALAS AMARILLAS *Cacicus chrysopterus* (Vigors, 1825)

Otras nombres: Alférez. Bolsero. Boyerito. Boyero ala amarilla. Boyero de charreteras amarillas. Mundo alegre. Sargento mayor.

DESCRIPCIÓN

Largo: 20 cm.

Peso: Fiora (1934): N= 3 X= 41,2 g (Rango 36,6 a 47,0); Contreras (1983b): N=7 (M) X= 41,3 g (Rango 34,6 a 47,2 g), N= 7 (H) X= 31,7 g (Rango 30,2 a 33,0); Contreras (1983c): N=3 (M) 84, 8, 83,3 y 75,6 g, N= 1 (H) 59,8 g; Di Giacomo (2005h): N= 12 X= 36,7 g (Rango 27,5 a 45,0); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (M) 27,5 g, N= 17 X= 37,2 g (Rango 29,0 a 43,5)

Coloración. Pico gris celeste pálido en adultos, córneo negruzco o grisáceo en juveniles. Patas negras. Iris blanco grisáceo en adultos, pardo rojizo o grisáceo en juveniles.
Negro. Cubiertas alares y rabadilla amarillas.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en pareja, en la parte media y alta de los árboles.
Inquieto. Tiene un canto variado e imita el canto de otras aves.

Alimentación
Di Giacomo (2005h).**Vegetales:** Néctar *Achnea distichantha, Arrabidaea corallina, Chorisia insignis, Erythrinadominguezii, Tabebuia heptaphylla*, Frutos de *Celtis pubescens, Cereus forbesii, Citrus* sp., *Urera baccifera*. **Insectos:** Hormigas aladas (*Atta vollenweideri, Acromyrmex* sp.). Termitas aladas. **Otros:** Desperdicios.
Bodrati (2006b). **Vegetales:** Fruto*Lycium moronguii.*
De la Peña (2011a). **Vegetales:** Pulpade *Carica papaya*.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Más información
Pineschi (1990).Pizo (1997).Olson y Alvarenga (2006).

HÁBITAT
Bosques, selvas, selvas en galería.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

El nido tiene forma de saco o bolsa, alargado, colgante de ramas. La boca en la parte superior. Emplea fibras vegetales, negras o no. Emplea hebras del hongo del género *Marasmius*. En la cámara a veces coloca hojas.Expuesto. Elaborado.



Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, noviembre nido con pichones.
Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 4 nidos.
Chatellenaz y Ferraro (2000). Colonia Liebig, dpto. Ituzaingó, Corrientes, 15-01-1996; San Cayetano, dpto. Capital, Corrientes, 3 nidos el 21-12-1999.
Di Giacomo (2005h).Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre octubre y febrero. Se estudiaron 140 nidos.De 117 nidos, 63 estaban parasitados por *Molothrus bonariensis*.
Bodrati y Fraga (2010). Chaco y Corrientes, nidos parasitados por *Molothrus bonariensis*.
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 12, desde el 18-11-1971 hasta el 04-02-1997, uno en Corrientes, los restantes en Santa Fe. Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Medidas: Largo: de 50 a 70 cm. Diámetro en la parte inferior: de 9 a 12 cm. Diámetro en la parte superior: de 4 a 7 cm. Boca: de 9 a 16 cm. de alto x 2,5 a 4 cm. de ancha.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, un nido con 4 huevos.



Huevos
Pone 3 huevos, a veces 4, ovoidales, blancos con pintas castañas, pardas y grises, en mayor cantidad en el polo mayor.



Medidas
Di Giacomo (2005h): 22,0 a 27,1 x 14,8 a 19,3 X= 24,5 x 16,4 (N= 95)
De la Peña (2013c): 25,7 a 26,4 x 16,5 a 18,5 X= 26,0 x 17,5 (N= 6)
Pesos
Di Giacomo (2005h): 2,4 a 4,0 X= 3,3 (N= 84)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,225 a 0,267 X= 0,238 (N= 6)

Generalidades
Contreras (1990b). Los huevos son puestos en días corridos. El período de incubación es de 15-16 días. El pichón permanece en el nido 17-24 días.
Di Giacomo (2005h). Demora en la construcción del nido 12 a 25 días. Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 14 días. La pareja alimenta a los pichones y permanecen en el nido entre 17 y 20 días.

Otros
Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Di Giacomo (2005h).Bodrati y Fraga (2010). De la Peña (2013c).Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

Depredación
Di Giacomo (2005h). De pichones por parte de Culebra mussurana (*Boiruna maculata*)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Negro con las cubiertas alares y la rabadilla amarillas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825)desde el norte del país hasta Catamarca, Santa Fe y noreste de Buenos Aires.Observado además en Córdoba.


Cayastá.Santa Fe.07-11-1981


Lanteri. Santa Fe. 18-11-1971

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Presenta 2 poblaciones separadas, que en Argentina practicamente se juntan, una en las Yungas (nuboselva) de Bolivia y noroeste de Argentina y otra en Paraguay, sur de Brasil y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas:Babarskas et al. (2003); Darrieu y Camperi (2001a); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Narosky y Di Giacomo (1993); Pereyra (1938b)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Miatello en Nores y Yzurieta (1981); Nores e Yzurieta (1983a)

Córdoba
Observaciones: Salvador, S. (Villa María, posiblemente escapado de cautiverio)

Chaco
Citas: Bodrati y Fraga (2010); Bodrati y Salvador (2015a); Chatellenaz (2005); Contreras (1983b); Moschione y Bishels (2004); Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a)

Observaciones: De la Peña (Cerrito, dpto. Bermejo, 05-10-1972 y 26-10-1973)



Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1980-81, 1983b, 1987b, 1990b); Darrieu y Camperi (1994); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá, 19-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Ronchi Virgolini et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1983b, 1987c); Di Giacomo(2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Fiora (1934); Hellmayr (1937); Moschione y Segovia (2005); Straneck (1990f)

Misiones
Citas: Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013d); Pereyra(1927e)

Santiago del Estero
Citas: Salvador y Di Giacomo (2014)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Girard (1932); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983) ; Ortiz et al. (2011, 2013); Ortiz y Aráoz (2014)

MATICO *Icterus croconotus* (Wagler, 1829)

DESCRIPCIÓN
Largo: 22,5 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 1 X= 50,0 g; Di Giacomo (2005h): N= 1 37,5 g
Coloración. Pico negro, base de la mandíbula gris. Patas gris parduscas**.** Iris amarillo. Área azul en la piel alrededor de los ojos.
Amarillo-anaranjado con la cara, frente, garganta, pecho, manto y cola, negros. Alas negras con parte de las remeras internas blanca. Cubiertas alares menores amarillas.

DESCRIPCIÓN

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:** Fruto de *Citrus* sp., Néctar de *Tabebuia heptaphylla.*

Más información:
Ragusa-Netto (2002)

HÁBITAT
Sabanas, bosques.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

Nidifica en nidos abandonados de otras.




Maugeri y Drozd (2006). El Palmar, dpto. Rivadavia, Salta, 06-01-2004 y 04-01-2005, nidos. Construídos en nidos de Espinero (*Phacellodomus* sp.) y Espinero chico (*Phacellodomus sibilatrix*). Nido subglobular, de entrada circular, de posición lateral inferior, el interior tapizado de raíces secas de enredadera. Tenía pichones.

PICHONES
Descripción
Maugeri y Drozd (2006). Piel, interior de la boca y patas, rosadas. Pico córneo, comisuras blanco-amarillentas. Iris pardo oscuro y uñas blanco amarillantas.

Más información:
Maugeri y Drozd (2006)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Iris amarillo. Amarillo-naranja con cara, garganta, pecho, manto y cola, negros. Alas negras con manchas blancas.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Icterus croconotus strictifrons Todd, 1924en Salta, Jujuy, Formosa, Chaco. Observado en Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Guyana, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Icterus croconotus strictifrons Todd, 1924

Buenos Aires
Citas: Pugnali y Chamorro (2006)

Chaco
Citas: Bertonatti y Heinonen Fortabat (1988); Carman (1971b)Moschione y Bishels (2004)

Formosa
Citas: Bertonatti y Heinonen Fortabat (1988); Carman (1971b); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Hoy (1968b); López Lanús (1997); Nores et al. (1996); Nores y Yzurieta (1986)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009) ; Camperi et al. (2013)

Salta
Citas: Carman (1971b); Maugeri y Drozd (2006); Moschione et al. (2013); Nores e Yzurieta (1995)

BOYERITO *Icterus pyrrhopterus* (Vieillot, 1819)

Otros nombres: Boyerín. Boyerito alférez. Boyero de ala marrón. Calandria negra. Chopí. Tordo de alas canelas. Tordo de cobijas canelas.

DESCRIPCIÓN
Largo: 20 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 2 X= 28,0 g (Rango 27,0 a 29,0); Contreras (1979f): N= 1 (M) 28,5 g; Camperi (1992a): N= 1 (M) 34,5 g, N= 1 (H) 33,5 g; Di Giacomo (2005h): N= 5 X= 28,2 g (Rango 26,0 a 32,0); Salvador (2014a): N= 4 (?) X= 27,7 g (rango 26,3 a 28,5); Di Giacomo (2005h): N= 5 X= 28,2 g (Rango 26,0 a 32,0); Salvador (2014a): N= 4 (?) X= 27,7 g (rango 26,3 a 28,5); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 7 X= 29,4 g (Rango 27,5 a 32,5)
Coloración. Pico negro. Patas gris plomizo. Iris pardo rojizo.
Negro. Cubiertas alares canelas.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en pareja. Se alimenta de insectos, arácnidos, frutas.
De la Peña (2011a). Recolecta y hurga en la parte media y alta de los árboles (ramas y follaje) hasta los 7 m. Se cuelga cabeza abajo cuando busca alimentos.

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Fruto de Chili (*Lycium americanum*), Laurel de condimento (*Laurus nobilis*).
Zotta (1936). **Insectos:** Coleópteros (Carábidae, Chrysomelidae). Hemíptero (Pentatomidae). Ortóptero.
Montaldo (1993). **Vegetales:** Fruto *Ligustrum* sp.
Genise et al. (1993). **Vegetales:** Savia de *Aspidosperma quebracho-blanco, Prosopis flexuosa.*
Roitman et al. (1997). **Vegetales:** Pétalo *Myrrhinium atropurpureum*.
De la Peña y Pensiero (2003). **Vegetales:** Fruto *Celtis ehrenbergiana.*
Bodrati (2006b). **Vegetales:** Fruto *Plinia trunciflora.*
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:** Néctar *Chorisia insignis*. Néctar *Erythrina dominguezii*. Néctar *Tabebuia aurea*, *Tabebuia heptaphylla, Tabebuia nodosa*. Fruto (fibra) *Syagrus romanzoffiana*. Fruto *Urera baccifera.* Néctar *Pisonia zapallo.*
Alessio et al. (2005). **Vegetales:** Semillas *Cissus sicyoides*, *Compositae, Polygonum* sp. **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Curculionidae, Chrysomelidae, Dytiscidae, Elateridae, Hydrophilidae).

Núñez Montellano et al. (2009c). **Vegetales:** Savia.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Flor *Erythrina cristagalli*. Fruto *Melia azedarach*, *Pyracantha coccinea, Sapium haematospermum, Schinus molle*. **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae). Homoptera (Membracidae). Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas). Orthoptera (Tettigonidae).
De la Peña (2011a). **Vegetales:** Pimpollo de *Celtis ehrenbergia*. Néctar de *Geoffroea decorticans, Eucaliptos* sp. Fruto *Morus alba, Celtis ehrenbergiana, Phoradendron liga*. **Insectos:** Larvas, gusanos, insectos no identificados.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.
Fracchia y Aranda-Rickert (2015). **Vegetales:** Flor de *Ligaria cuneifolia*.



Más información:
Voss y Sander (1981). Ragusa-Netto (2002)

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es variado y suele emitir voces de otras especies. Las sílabas son emitidas algo espaciadas y de poco alcance: Tyio ... sieeh ... Tchrrrr ...

HÁBITAT
Sabanas, áreas urbanas y periurbanas, bosques, orillas de selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N



El nido tiene forma de saco o bolsita abierta, colgante, atada a ramas u hojas. También ocupa nidos abandonados por otras aves. Emplea fibras vegetales o cerdas, entrelazadas.Expuesto. Elaborado.
Hartert y Venturi (1909). Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, nido con 3 huevos.
Pereyra (1938a).Delta del Paraná, Buenos Aires, nidifica desde octubre a enero. Pone 3 huevos.
Pereyra (1938b). San Fernando, delta del Paraná, Buenos Aires, 5 de diciembre, nido con 2 pichones y un huevo.
Contino (1980). Nidifica en el noroeste argentino, en lugares húmedos próximos a lagunas y arroyos. Pone 4 huevos.
Contreras (1990b). Valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, 1987-1988, 3 nidos.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre octubre y diciembre. Se estudiaron 21 nidos.De 17 nidos, estudiados 7 estaban parasitados por*Molothrus bonariensis*.
Fraga (2011b). Puerto Iguazú, dpto. Iguazú y Parque provincial Moconá, dpto. Guaraní,



Misiones. El 13-12-2000 nidos con pichones en nidos abandonados de Boyero cacique (*Cacicus haemorrhous*)
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 20, desde el 15-11-1971 hasta el 10-11-2008, 2 en Entre Ríos, los restantes en Santa Fe. Es parasitado por*Molothrus bonariensis*.
Medidas: Diámetro total: de 8 a 11 cm. Diámetro interno: de 5 a 10 cm. Profundidad: de 6 a 10 cm. Alto: de 8 a 13 cm.
Altura: Nido más bajo: 1,60 m. Nido más alto: 10,00 m.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", un nido con 3 huevos.

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, ovoidales, blancos con pintas pardas y grises, más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 24,0 a 26,5 x 16,6 a 17,1 X= 25,1 x 16,9 (N= 3)
Pereyra (1938a): 21,0 x 16,5
Pereyra (1938b): 21,0 x 16,0
Contino (1980): 22,3 x 15,8 (N= 2)
Di Giacomo (2005h): 20,7 a 23,4 x 15,4 a 18,3 X= 22,1 x 16,3 (N= 18)
De la Peña (2013c): 22,8 a 23,6 x 15,6 a 16,6 X= 23,1 x 15,9 (N= 5)

Pesos
Contino (1980): 2,5 (N= 2)
Di Giacomo (2005h): 2,1 a 3,4 X= 2,7 (N= 18)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,185 a 0,190 X= 0,189 (N= 5)

PICHONES
Descripción.
De la Peña (2013c). 12 días. Comisura blanquecina. Pico gris. Cavidad bucal rosada. Plumaje negro. Cubiertas alares canelas.

Generalidades
Contreras (1990b). Los huevos son puestos en días corridos. El período de incubación es de 15-16 días.
El pichón permanece en el nido 12 días
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 14 días. La pareja alimenta a los pichones y permanecen en el nido entre 13 a 15 días.
De la Peña (2013c). Pone los huevos en días corridos. Permanencia de los pichones en el nido de 14 a 15 días.

Observaciones
Salvador (2012f). Misiones, Bodrati observó adultos alimentando pichones de *Molothrus bonariensis*.
De la Peña (2013c). El 10-01-1994, en Esperanza un adulto con dos juveniles.
Se observó adultos imitando el canto de *Furnarius rufus, Rupornis magnirostris* y *Guira guira.*

Otros
Di Giacomo (2005h). Salvador (2012f). De la Peña (2013c). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

Más información:
De la Peña (2013c)



La Gallareta. Santa Fe.15-11-1971



Calchaquí.Santa Fe.19-12-1998
Parasitado por *Molothrus bonariensis*



Curupaití.Santa Fe.25-01-1988



Esperanza.Santa Fe.27-11-1995



.La Gallareta.Santa Fe.15-11-1971



Esperanza.Santa Fe.15-05-2008



Esperanza.Santa Fe.19-11-2006



Calchaquí.Santa Fe.19-12-1998



Santa Rosa.Santa Fe.22-10-2808



Esperanza.Santa Fe. 22-10-2009

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Negro con los “hombros” canelas. Pico fino. Cola larga.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Icterus pyrrhopterus pyrrhopterus (Vieillot, 1819)desde el norte del país hasta Neuquén y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cuatro subespecies. Amplia área de distribución que abarca Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Chimento et al. (2012); Codesido et al. (2011); Dabbene (1919b); Darrieu y Camperi (2001a); Durnford (1878); Fiameni (2005); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Montaldo (1993); Montaldo y Claver (1986); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Piloni (2015); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Soave et al. (1999)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Bodrati y Salvador (2015a); Chatellenaz (2005); Moschione y Bishels (2004)

Observaciones: De la Peña (Cerrito, dpto. Bermejo, 06-05-1988)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Dardanelli et al. (2006b); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Balnearia, dpto. San Justo, 05-02-2006; Jesús María, dpto. Colón, 15-05-2110)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b, 1990b); Darrieu y Camperi (1994); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá, 19-09-1979; Bonpland, dpto. Paso de los Libres, 11-12-2002)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Roitman et al. (1997); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009) ; Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Fiora (1934); Malizia et al. (2005) ; Moschione y Segovia (2005); Salvadori (1897); Straneck (1990e)

La Rioja
Citas: Capurro y Bucher (1986); Fracchia y Aranda-Rickert (2015); Giacomelli (1907, 1923); Hayward (1967)

Misiones
Citas: Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi (1989); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Fraga (2011); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Neuquén
Citas: Bianchini y Arenas (2013b)

Salta
Citas: Alabarce y Lucero (1977); Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Giai (1951); Moschione et al. (2013); Núñez Montellano et al. (2009c); Rodríguez (2012b)



Observaciones: De la Peña (San Ramón de la Nueva Orán, dpto. Orán, 02-02-1979)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2013a, 2013e, 2014a); Haene (1994); Lucero y Chebez (2011); Lucero (2013i)Gelain (2013e)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993).

Santa Fe
Citas: Alessio et al. (2005); De la Peña (20111a, 2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Quiroga y Hadad (2004); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero
Citas: Camperi (1989); Codesido y Bilenca (2000); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Antelo et al. (2013); Antelo y Brandán (2006); Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Aráoz (2007); Echevarría, et al. (2011b); Lucero (1983); Luceroet al. (2002); Malizia et al. (1998); Ortiz et al. (2011, 2013); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014)

CHOPÍ *Gnorimopsar chopi* (Vieillot, 1819)

Otros nombres: Charrúa. Guira-hú. Tordo cruceña. Tordo chaqueño. Tordo chopí.

DESCRIPCIÓN
Largo: 20 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 12 X= 58,6 g (Rango 51,0 a 65,0); Contreras (1979f): N= 1 (M) 61 g; Di Giacomo (2005h): N= 1 73,0 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 7 X= 66,9 g (Rango 62,0 a 75,0)
Coloración. Pico y tarsos negros. Iris pardo oscuro.
Negro.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en pareja. A veces en grupos.
Se alimenta de insectos, orugas, arácnidos, semillas. Recorre ramas entre 4 y 8 m. de alto.




Alimentación
Liebermann (1935). **Insectos:** Langostas.

Di Giacomo (2005h). **Vegetales:** Néctar *Erythrina dominguezii*. Semillas *Zea mays.*
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:**Lepidoptera (orugas).

Voces
Straneck (*in litt*.). Tiene una vocalización muy variada, Tie . tie . chopi . chopi . kio . kio . kio . chopi . chopi ..
HÁBITAT
Sabanas, palmares, bosques, selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



Construye el nido en huecos en los árboles, en nidos abandonados de aves o caja-nido. Acolcha la base con hojas, cortezas.Oculto. Poco elaborado.
Hartert y Venturi (1909). Villa Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, 02-11-1905, nido en un Ombú a 6 m de altura con 4 huevos.
Di Giacomo (1998c). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, es parasitado por el Tordo pico corto (*Molothrus rufoaxillaris*)
Di Giacomo (2005h).Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre octubre y diciembre. Se estudiaron 77 nidos.De estos, 42 estaban parasitados por *Molothrus rufoaxillaris*.
Fraga (2008b). Misiones y Corrientes, nidificando en Hornero (*Furnarius rufus*).
Di Giacomo y Reboreda (2009a). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, es parasitado por el Tordo pico corto (*Molothrus rufoaxillaris*)
Cockle et al (2012a). Misiones, nidifica en huecos naturales.
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 5, desde el 19-11-1976 a 23-11-1995, todos en provincia de Santa fe.
Salvador (2014b). Chaco, nido en nido de Carpintero (Picidae); Corrientes, nido en nido de Hornero (*Furnarius rufus*)



Huevos

Pone 4 ó 5 huevos, ovoidales, celestes pálidos con rayitas y manchas negras en el polo mayor.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 26,0 a 27,0 x 18,0 a 20,0
Smyth (1928): 24,5 a 28,5 x 17,5 a 19,0
Di Giacomo (2005h): 23,9 a 28,7 x 17,8 a 20,3 X= 26,4 x 19,4 (N= 99)
De la Peña (2013c): 27 a 27,3 x 19,3 a 19,9 X= 27,2 x 19,5 (N= 4)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 4,0 a 6,0 X= 5,0 (N= 97)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,306 a 0,314 X= 0,309 (N= 4)

Generalidades
Di Giacomo (2005h). Demora en la construcción del nido de 10 a 22 días. El período de incubación es de 14 ó 15 días. La pareja alimenta a los pichones y permanecen en el nido entre 16 a 18 días.

Otros
Di Giacomo (2005h).Di Giacomo y Reboreda (2009a). Esparasitado por *Molothrus rufoaxillaris*.



Esperanza.Santa Fe.23-11-1995



Los Amores. Santa Fe.19-11-1976



Esperanza.Santa Fe.23-11-1995. Nido

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Negro. Eriza las plumas nucales y del cuello posterior.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Gnorimopsar chopi chopi (Vieillot, 1819)en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y centro-norte de Santa Fe y Entre Ríos. Observado en el noroeste de Buenos Aires y Córdoba y *Gnorimopsar chopi sulcirostris* (Spix, 1824)en el norte de Salta y Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Área de distribución que comprende Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Gnorimopsar chopi chopi (Vieillot, 1819)

Buenos Aires
Citas: Maugeri y Liotta (2002); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pereyra(1927d)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005)

Observaciones: De la Peña (Puerto Zapallar, dpto. Gral. San Martín, 25-11-1972)

Córdoba

Observaciones: Salvador, S. (Villa María, posiblemente escapada de cautiverio)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1980-81, 1987b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008); Pereyra(1923a); Straneck (1990e)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. 17-09-1979; Gobernador Virasoro, 12-12-2002)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas:Contreras (1987c); Di Giacomoet al. (2010); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Martelli (1995); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009) Chebez et al. (1998)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Camperi (1989); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Cockle et al (2012a); Fraga (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)



Santa Fe
Citas: De la Peña (1983e, 2011f, 2013c); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d);

Santiago del Estero
Citas:Moschione y Bishels (2004)

Gnorimopsar chopi sulcirostris (Spix, 1824)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

TORDO PATAGÓNICO *Curaeus curaeus* (Molina, 1782)

Otros nombres: Boyero chileno. Boyero de Chile. Charrúa patagónico. Tordo austral. Tordo grande. Tordo negro del sur. Tordo negro patagónico. Tordo renegrido.

DESCRIPCIÓN
Largo: 27,5 cm.
Peso: Humphrey et al. (1970): N= 2 (M) 112,1 y 104,0 g, N= 2 (H) 92,0 y 92,0 g; Contreras (1975): N= 14 (?) X= 83,7 g (Rango 76,9 a 89,9); Christie et al. (2004): N= 1 (M) 84,0 g, N= 6 (?) X= 85,3 g (Rango 82,0 a 92,0)
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Negro brillante.

COMPORTAMIENTO
Anda en bandadas.
Alimentación
Dupuy (*in llit*.). Vegetales: Semilla*Pinus ponderosa.*
Crawshay (1907).Vegetales:Semillas.
González Gómez et al. (2004).Vegetales:Néctar*Puya berteroniana,Puya coerulea.*
Christie et al. (2004). Desperdicios.



Más información
Housse (1945), Johnson y Goodall (1967)

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es variado y compuesto por ásperos chirridos y silbos agudos, Tchrrrrrr . kliehh ... Tchrrrrr . klieh
HÁBITAT
Bordes de bosques, claros y laderas arbustivas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en noroeste patagónico, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Semiesfera de fibras vegetales.
Hartert y Venturi (1909). Ushuaia, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego, 13-11-1902, 2 huevos.
Christie et al. (2004). Noroeste patagónico nidos en arbustos en noviembre y diciembre.

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos, azulados con pintas negras.
Medidas
Goodall et al. (1946): 29,5 a 33,5 x 20,2 a 22,5

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Negro. Cola larga. Pico largo, puntiagudo, negro.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Curaeus curaeus curaeus (Molina, 1782)en el oeste desde el sur de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz y *Curaeus curaeus reynoldsi* (Sclater, 1939) en Tierra del Fuego.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies.Chile y Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES

Curaeus curaeuscuraeus (Molina, 1782)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977c); Vidoz (1995)
Observaciones: De la Peña (Laguna del Rosario, dpto. Futaleufú, 03-02-1976)

Mendoza
Citas: Sosa (2007)

Neuquén
Citas: Camperi (1989); Christie et al. (1988, 1989, 2004); Contreras (1975); Giai (1942); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005); Straneck (1990a)
Observaciones: De la Peña (Villa La Angostura, dpto. Los Lagos, 30-01-1976; San Martín de los Andes, dpto. Lácar, 25-11-1998)

Río Negro
Citas: Acevedo (1992); Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (1998, 2004); Contreras et al. (1980b); Daciuk (1977c); Gelain (1984a, 2001); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubullis (1985); Grigera y Pavic (2007); Hecker y Vidoz (1998); Paz Barreto (1997b)
Observaciones: De la Peña (Arroyo La Fragua, dpto. Pilcaniyeu, 21-11-1998)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1998); Imberti (2005); Peri (2013); Zapata (1967)

Curaeus curaeus reynoldsi (Sclater, 1939)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1937); Clark (1986); Earnshaw (1973); Hartert y Venturi (1909); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948); Pereyra (1951); Reynolds (1934); Ripley (1950)

FEDERAL *Amblyramphus holosericeus* (Scopoli, 1786)

Otros nombres: Blandengue. Bombacha roja. Juan soldado. Pájaro soldado. Tordo federal.
DESCRIPCIÓN
Largo: 24 cm.
Peso: Contreras (1983c): N=1 (M) 63,3 g; Salvador (1988):N= 1 (H) 55,0 g
Coloración. Pico y patas negros.Iris pardo oscuro.
Negro. Cabeza, pecho y muslos rojo-naranjas.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en pareja.

Alimentación
Marelli (1919). **Insectos:**Orugas. **Vegetales:**Semillas.
Zotta (1936). **Insectos:**Coleópteros (Curculidae, Scarabaeidae). Orthóptero.

Voces
Straneck (*in litt*.). Su canto es muy variado y está compuesto por silbos y trinos melodiosos: Tirrrrrh .. flíflí ... siefiie . siefie ....



HÁBITAT
Esteros.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N



El nido tiene forma de tazón o semiesfera. Emplea fibras vegetales. Lo ata a juncos o a espadañas, en esteros.Expuesto. Elaborado.
Gibson (1880a). Cabo San Antonio, pdo de la Costa, Buenos Aires. Nido con 2 huevos.
Friedmann (1931). Tucumán, Norislocalizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pereyra (1934b). Escobar y San Isidro, Buenos Aires, 20-11-1929 y primavera de 1930 nidos con huevos y con pichones.
Pereyra (1938b). Noreste de la provincia de Buenos Aires, nidifica.
Mermoz y Fernández (1999b). Buenos Aires nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Fernández y Mermoz (2000). Buenos Aires nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 3 nidos entre octubre y febrero.
Di Giacomo (2005h).Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre octubre y febrero. Se hallaron 15 nidos.
Salvador (2012f). Formosa nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
De la Peña (2013c). San Vicente, pdo. San Vicente, Buenos Aires, 10-12-1972, nido con 4 huevos.
Medidas: Diámetro total: 12 cm. Diámetro interno: 8 cm. Profundidad: 7,5 cm. Alto: 15 cm.
Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 7 nidos.



Toba.Santa Fe.18-10-2007



San Vicente.Buenos Aires.10-12-1972

Huevos
Pone 4 huevos, ovoidales, verdosos con pintas y manchitas pardas en el polo mayor.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 25,0 a 26,0 x 18,0 a 18,5
Pereyra (1934b): 26,0 a 30,0 x 21,0 a 22,0 X= 28,0 x 21,5 (N= 2)
Pereyra (1938b):27,0 x 20,0
Di Giacomo (2005h): 24,7 a 28,4 x 17,6 a 19,4 X= 26,4 x 18,7 (N= 23)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 3,8 a 5,4 X= 4,6 (N= 22)

Generalidades
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 14 días. La pareja alimenta a los pichones y permanecen en el nido entre 14 días.

Otros
Friedmann (1931). Mermoz y Fernández (1999b). Fernández y Mermoz (2000). Salvador (2012f). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.


IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico largo, puntiagudo. Negro con la cabeza, pecho y muslo, rojo-naranjas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Amblyramphus holosericeus (Scopoli, 1786)desde Jujuy, Salta, Formosa y Misiones hasta Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Observado en La Pampa y Mendoza.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípico. Paraguay,Brasil, Uruguay yArgentina. Población separada en Bolivia.

CITAS Y OBSERVACIONES

Buenos Aires
Citas:Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); De la Peña (2013c); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pereyra (1923b,1934b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Straneck (1990b); Weller (1967); White (1882)



Chaco
Citas: Chatellenaz (2005)

Córdoba
Citas:Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1983c, 1987b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpro. Mburucuyá, 19-09-1979)

Entre Ríos
Citas: De la Peña (2012b); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Ronchi Virgolini et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas:Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi (1989); Camperi et al. (2013); Salvador (1988)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007)

Mendoza
Citas: Martínez et al. (2012)

Misiones
Citas: Chebez (1996a)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); López-Lanús et al. (2013d); Manassero y Luna (2009); Pautasso (2002b)

Santiago del Estero
Citas: Olrog en Nores et al. (1991); Zotta (1944)

VARILLERO NEGRO *Agelasticus cyanopus* (Vieillot, 1819)

Otros nombres: Negrucho. Tordín. Tordo lagunero. Tordo negriazul. Tordo negro. Tordo negro chico. Tordo negro de laguna. Tordo negro lagunero.
DESCRIPCIÓN
Largo: 22 cm.
Peso: Contreras (1979f): N= 1 (H) 32,2 g; Di Giacomo (2005h): N= 1 (M) 39,5 g, N= 4 (H) X= 28,8 g (Rango 27,0 a 30,5); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 30 (M) X= 34,5 g (Rango 31,0 a 38,3), N= 30 (H) X= 29,3 g (Rango 25,5 a 33,8)
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Macho. Negro.
Hembra. Cejas ocráceas. Regiones auriculares oscuras. Dorsal gris pardusca con estrías negruzcas. Lomo castaño con estrías oscuras. Ventralmente amarillenta con suaves estrías pardas. Alas pardas oscuras con las secundarias ribeteadas de castaño. Cola negruzca.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o en pequeños grupos. Camina sobre la vegetación flotante. Canto melodioso.

Alimentación
Beltzer y Paporello (1983). **Vegetales:** Semilla*Echinochloa* sp., *Paspalum* sp.*, Polygonum* sp.**Insectos:** Anisoptera.Coleópteros (Dityscidae, Noteridae,*Hydrocanthus* sp., *Suphisellus* sp.),(Hidrofilidae,*Tropistemus*

sp.). Curculionida (*Neochetina* sp.). Dípteros (Quironómidos, Estrationidae,*Eulalia* sp.).Homópteros(*Belostoma* sp.).Orthoptera.
Crustáceos:(*Trichodactylus borellianus*). **Moluscos:** (*Littoridina* sp.) (Planorbidos). **Peces:** (*Apistograma combrae*)(Loricáridos) Beltzer (1984a).**Vegetales:** Semilla *Echinochloa* sp., *Paspalum* sp*., Polygonum* sp.**Insectos:** Coleópteros (*Neochetina* sp., *Hydrocanthus* sp.,*Tropisternus* sp.).Hemípteros (*Belostoma* sp.)



Quiroga y Beltzer (2002).**Vegetales:** Semilla*Echinochloa polystachia*, *Paspalum repens, Polygonum* sp.,**Insectos:** Coleópteros (Curculionidae, Carabidae terrestre) (Dityscidae, Hydrophilidae, Noteridae). Dípteros (Stratiomidae, Chironomidae, Ephidrydae).Hemípteros (*Belostoma* sp.).Homópteros (Larvas).Orthoptera (Grillidae).Lepidópteros (Larvas)**.Arácnidos.Moluscos:** (Heleobia, Huevos).**Crustáceos:** Decápoda (*Trichodactylus* sp.).**Peces:** (*Apistograma combrae*).



Di Giacomo (2005h).**Vegetales:**Semilla *Paspalum hydrophylum, Paspalum intermedium*, *Paspalum rufum, Paspalum urvillei.*
De la Peña (20011a).**Vegetales:** Flory Semilla de *Thalia geniculata.* **Insectos:**Langostas.Gusanos.

HÁBITAT
Bañados, esteros.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos y/o pichones en Formosa, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

El nido tiene forma de tazón. Es construido con fibras vegetales, atado a juncos, espadañas u otras plantas acuáticas, en bañados.Expuesto. Elaborado Babarskas y López Lanús (1993). Ramallo, pdo. Ramallo, Buenos Aires, 09-12-1990, casi terminado. Tenía un huevo de *Molothrus bonariensis.*
Di Giacomo (2005h).Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre octubre y febrero. Se estudiaron 60 nidos.
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 6, desde el 22-12-78 hasta el 20-02-1996, todos en provincia de Santa Fe. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Medidas: Diámetro total: de 9 a 12 cm. Diámetro interno: de 6 a 9 cm. Profundidad: de 6 a 7 cm. Alto: de 8 a 11 cm.
Salvador y Bodrati (2014a). Reserva El Bagual, Formosa, A. Di Giacomo, localizó nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Nacional Chaco, Chaco, Bodrati observó una hembra alimentando un pichón de *Molothrus bonariensis.*



Huevos
Pone 3 huevos, a veces 4, ovoidales, verdes azulados con pintas y manchitas grises, rayitas negras o pardas oscuras, distribuidas por toda la superficie pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 21,7 a 26,7 x 16,1 a 17,6 X= 23,8 x 16,6 (N= 5)

Contino (1980): 23,0 x 18,0
Di Giacomo (2005h): 20,5 a 25,8 x 15,5 a 18,8 X= 23,0 x 16,6 (N= 52)
De la Peña (2013c): 21,7 a 24 x 15,6 a 17,5 X= 23,1 x 16,6 (N= 10)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 2,3 a 3,9 X= 3,1 (N= 52)
De la Peña (2013c): 2,5 a 3,6 X= 3,0 (N= 6)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,190 a 0,220 X= 0,208 (N= 10)

Generalidades
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 12 días. Los pichones permanecen en el nido entre 11 y 13 días.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 6 a 7 días. Período de incubación 12-13 días.Los huevos son puestos en días corridos. Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido 15-16 días.
Observaciones
De la Peña (2013c). Los pichones tienen el color de la hembra.
Los dos padres los alimentan, pero con mayor intensidad la hembra. Les traen langostas y gusanitos.
El macho vigila y corre a otras aves (picaflores, benteveo, varillero, músico).

Otros
De la Peña (2013c). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

Depredación
Di Giacomo (2000). Adulto como comida a pichones (*Falco rufigularis*)
Di Giacomo (2005h). Adulto por (*Gampsonyx swainsoni*)

Más información:
De la Peña (2013c)



Cayastá.Santa Fe.22-12-1978
Parasitado por *Molothrus bonariensis*



Cayastá.Santa Fe.22-12-1978

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: negro. Hembra: cejas blanquecinas. Ventralmente amarillenta. Dorso pardusco estriado de oscuro.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Agelasticus cyanopus cyanopus (Vieillot, 1819)desde Jujuy, Salta y Formosa hasta Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, noreste de Buenos Aires y noreste de Río Negro.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Se distribuye por Bolivia, Brasil (Mato Grosso), Paraguay y Argentina. Hay dos poblaciones aisladas (subespecies) en Brasil en las que las hembras difieren algo en color entre sí y con el resto.

CITAS Y OBSERVACIONES

Agelasticus cyanopus cyanopus (Vieillot, 1819)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Babarskas y López Lanús (1993); Bodrati et al. (2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Chaco
Citas:Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005)

Observaciones: De la Peña (Cerrito, dpto. Bermejo, 03-05-88)

Córdoba
Citas: Yzurieta (1995); Nores (1996)

Corrientes
Citas: Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1980-81, 1987b); Darrieu y Camperi (1994); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá, 19-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Muzzachiodi (2001, 2011a); Raffo et al. (2008)

Formosa
Citas:Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Ordano et al. (1999); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014); Wetmore (1926b)



Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi (1989); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2012b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Nores (1986a.)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Höy (1969a); Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1984a); Beltzer et al. (2003-2004); Beltzer y Paporello (1983); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011a, 2011f, 2013c,); Fandiño y Pautasso (2011); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Quiroga y Hadad (2004); Quiroga y Beltzer (2002)

Santiago del Estero
Citas: Olrog (1979b)

VARILLERO DE ALAS AMARILLAS *Agelasticus thilius* (Molina, 1782)

Otros nombres: Ala amarilla. Alférez. Codito amarillo. Chororó. Negrito. Paleta. Tordo aliamarillo. Tordo de alas amarillas. Tordo de hombreras. Tordo de laguna. Tordo de laguna de charreteras amarillas. Trile. Trilí. Trilí-trilí. Varillero ala amarilla.

DESCRIPCIÓN

Largo: 18 cm.

Peso: Contreras (1975): N= 6 (?) X= 36,9 g (Rango 35,9 a 38,1); Camperi (1992c): N= 1 (M) 34,5 g; Massoni et al. (2005): N= 20 (M) X: 35,2 g, N= 16 (H) X: 28,2 g; Camperi y Darrieu (2005): N= 1 (M) juvenil 39,0 g, N= 1 (H) 27,3 g; Salvador (2014a): N= 3 (M) X= 34,2 g (Rango 33,5 a 34,6), N= 3 (H) X= 29,1g (Rango 28,4 a 29,5)

Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.

Macho. Negro. Cubiertas alares internas y "hombros" amarillos.

Hembra. Gris pardusca estriada de pardo oscuro. Más clara ventralmente. Alas y cola pardas oscuras. "Hombros" y cubiertas alares internas amarillos. Cola blanquecina.

COMPORTAMIENTO

Anda solitario, en pareja o en grupo. Camina sobre la vegetación flotante.

Alimentación

Marelli (1919). **Insectos:** Odonata.**Moluscos.**
Zotta (1936).**Insectos:** Coleópteros (Chrysomelidae, Curculionidae). Lepidópteros.Odonata.**Arácnidos.**
Zotta (1940).**Insectos:** Coleópteros (Chrysomelidae). Hemípteros. Hymenópteros (Formicidae). Odonata. **Crustáceos:** (Isópodo).
Darrieu et al. (2001).**Insectos:** Blattaria. Hemípteros(Belastomatidae, *Belostoma elegans*). Hemípteros (Pentatomidae, *Acrosternum musiva*). Hemípteros (Lygaeidae, Hebridae, *Ligogonohus* sp.).Homópteros.Lepidópteros (*Conocephalus* sp., *Neoconocephalus* sp.). Lepidópteros (Gryllidae). Odonata. **Moluscos:(**Planorbidae, *Biomphalaria cf B. straminea*).**Crustáceos:** (Isopoda, *Porcellio scaber*). Amphípodos. **Arácnidos.**
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Arácnidos:**arañas.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semilla Gramíneas*, Scirpus californicus, Zea mays.* **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Curculionidae). Diptera (Muscidae). Hemiptera. Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas). **Crustáceos:** (Isópodois terrestres).

Voces

Straneck (*in litt*.). Canto melodioso y variado. Compuesto por agudos silbos y voces ásperas y moduladas: Tryyyyyioohhh trilii ..... Tryiiiirrrhh .. triliíhh ...

HÁBITAT

Bañados, esteros.

NIDIFICACIÓN



Se localizaron nidos en Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Chubut.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

El nido tiene forma de tazón o semiesfera. Es construido con fibras de juncos. Lo ata a juncos u otras plantas.Expuesto. Elaborado.



Smyth (1928). Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Friedmann (1929). Tucumán, Girardnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pereyra (1933a). Zelaya, Buenos Aires, 27-11-1932, nido con 4 huevos.
Pereyra (1938b). Noreste de la provincia de Buenos Aires, nidifica desde noviembre a diciembre.
Friedmann et al. (1977). Buenos Aires Naroskyy Orianslocalizaron nidos parasitados por *Molothrus bonariensis*.
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica en octubre y noviembre.Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Fraga (1983c). Estancia La Candelaria, pdo. Lobos, Buenos Aires. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando.Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Massoni y Reboreda (1995). Provincia de Buenos Aires, 316 nidos localizados en octubre-diciembre de 1994. El 27% fue parasitado por *Molothrus bonariensis*.



Massoni y Reboreda (1998). Buenos Aires nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Fraga (2002). Chubut,nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 2 nidos en noviembre. Uno parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Christie et al. (2004). Nidos en diciembre.
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 4, desde el 27-10-1977 al 21-10-1998, uno en Santa Fe y 3 en Córdoba. Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Medidas: Diámetro total: de 11 a 12 cm. Diámetro interno: de 8 a 9 cm. Profundidad: de 6 a 7 cm. Alto: de 8 a 9 cm.
Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 15 nidos. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Graña Grilli y Montalti (2014). Bernal, partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, 28 nidos activos, todos en estadio de puesta, el 4 de enero de 1982.

Huevos

Pone 3 huevos, ovoidales, ocres o blancos con pintas, manchitas y rayitas negras, castañas y grises, más concentradas en el polo mayor.

Medidas

Smyth (1928): 22,0 a 23,5 x 15,5 a 16,5
Pereyra (1933a): 25,0 x 18,0
Pereyra (1938b): 22,0 x 16,0

De la Peña (2013c):21,9 a 23,5 x 16,4 a 16,9 X= 22,4 x 16,7 (N= 6)

Peso
De la Peña (2013c): cáscaras 0,197 a 0,250 X= 0,225 (N= 6)



Campo Andino.Santa Fe.27-10-1977
Parasitado por *Molothrus bonariensis*



Campo Andino.Santa Fe.27-10-1977

Otros
Pereyra, C. B. de. (1934a). Halló un ejemplar joven con una tenia.
Bertonatti y Sutton (1986). Un ejemplar con albinismo perfecto.
Mermoz y Fernández (1999). Un ejemplar con albinismo parcial.
Urcola (2011). Un ejemplar con plumaje castaño claro (Brown)
Otros
Smyth (1928). Friedmann (1929). Friedmann et al. (1977). Contreras (1977b). Fraga (1983c).Massoni y Reboreda (1998). Fraga (2002). Darrieu et al. (1988).Massoni y Reboreda (1995).Babarskas et al. (2003). De la Peña (2013c).
Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

Más información
De la Peña (2013c).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: negro con “Hombros” amarillos. Hembra: pardusca estriada de oscuro. “Hombros”amarillos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Agelasticus thilius petersi (Laubmann, 1934)desde el norte del país hasta Santa Cruz.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Población en el Altiplano de Perú y Bolivia. Extremo sur de Brasil, Paraguay (migratorio en invierno austral), Uruguay, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES



Agelasticus thilius petersi (Laubmann, 1934)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bertonatti y Sutton (1986); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Dabbene (1919b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Darrieu et al. (2001); Fiameni (1994); Graña Grilli y Montalti (2014); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Isacch y Martínez (2001); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Lucero et al. (2011); Masón et al. (2005); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pereyra, C. B. de. (1934a); Pugnali y Chamorro (2008); Straneck (1990b); Weller (1967); White (1882); Zapata (1998)

Observaciones: De la Peña (Médanos, pdo. Villarino, 05-02-1976)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005)

Chubut
Citas: Bo (1958); Camperi (1998); Daciuk (1977c); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Fraga (2002); Sainz-Trápaga (2014); Vidoz (1995)

Córdoba
Citas: Brandolín et al. (2007); De la Peña (2013c); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b); Salvador (1983); Yzurieta (1995)
Observaciones: De la Peña (Morteros, dpto. San Justo, 02-01-1982)

Corrientes
Citas: Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Hartert y Venturi (1909); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (1001, 2011a); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Zapata (1975)

Formosa
Citas: Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Siegenthaler (1984, 2004); Sigenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Giacomelli (1907, 1923); Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Calí et al. (2008); Contreras y Fernández (1980); Darrieu y Segura (2015); Lucero (2013f); Martínez et al. (1997a); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (Llancanelo, dpto. Malargüe, 15-10-2004)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Christie et al. (2004); Contreras (1975, 1976, 1977b); Funes en Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Helmayr (1937); Heredia y Funes (1987); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas:Camperi y Darrieu (2005); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Gelain (2001, 2012); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2005, 2011); Pérezy Petracci (1998); Peters (1923b)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas:Camperi (1989); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz y Murúa (1994)

San Luis
Citas: Camperi (1989); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993).

Santa Cruz
Citas:Chebez et al. (1988, 1998); Coconier (2005); Iglesias y Pérez (1998); Imberti (2003, 2005); Imberti y Albrieu (2001); Mazart Barnett et al. (1998)

Santa Fe
Citas: Beltzer et al. (2003-2004); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Wilson(1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Antelo y Brandán (2006); Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz et al. (2013c)

VARILLERO CONGO *Chrysomus ruficapillus* (Vieillot, 1819)

Otros nombres: Cabeza marrón. Congo. Corona canela. Islero. Junquero. Tilí. Tordo. Tordo cabecicanela. Tordo de cabeza canela. Tordo de la isla. Tordo de laguna. Tordo de las represas. Tordo de pajonal. Tordo varillero. Varillero común.

DESCRIPCIÓN

Largo: 17 cm.

Peso: Di Giacomo (2005h): N= 4 (M) X= 40,2 g (Rango 35,0 a 42,0), N= 1 (H) 35,0 g; Salvador (2014a): N= 9 (M) X= 44,2 g (Rango 40,5 a 47,2), N= 6 (H) X= 33,9 g (Rango 29,7 a 36,2); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 3 (M) X= 40,5 g (Rango 38,0 a 45,0), N= 1 (M) juvenil 28,0 g, N= 11 (H) X= 29,3 g (Rango 25,5 a 32,8)

Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo oscuro.

Macho. Negro. Corona y garganta castañas.

Hembra. Dorsal gris pardusca oscura con estrías pardas oscuras. Ventralmente gris ocrácea. Alas y cola negras. Plumas de las alas ribeteadas de ocráceo.

COMPORTAMIENTO

Anda en pareja, en grupo o en bandadas, a veces muy grandes. Bullanguero.

Canta posado en postes, árboles, arbustos, juncos, espadañas, alambres. El canto es variado.

De la Peña (2011a). Recolecta insectos en la superficie y semillas entre las plantas acuáticas.

Alimentación

De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Fruto de Cipero (*Cypero pohlii*), Semillas de Meliloto (*Melilotus albus*).

Aravena (1928). **Insectos:**Coleópteros (Carábidae) (Aphodius)

Zotta (1940). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae).

Ordano et al. (1999).**Vegetales:** Semillas no determinadas.

Di Giacomo (2005h).**Vegetales:** Semilla *Echinochloa crusgalli*, *Paspalum hydrophylum, Paspalum intermedium, Paspalum urvillei, Soghum halepense, Sorghastrum pellitum.*

Del Barco et al. (2006).**Vegetales:** Semilla no determinadas. **Insectos:**Coleópteros (Curculionidae, Dytiscidae). Dípteros. Hemípteros (Belostomatidae). Hymenópteros (Apidae, Formicidae, Vespidae). Lepidópteros (larvas). Odonata.

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semilla *Chenopodium* sp., Gramíneas, no determinadas, *Scirpus californicus, Soghum halepense,* **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Curculionidae, Hydrophilidae, no identificado). Hemiptera (Belostomatidae, Corixidae). Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas).**Moluscos:** (Hydrobiidae: *Littoridina parchappei,* Planorbidae: *Biomphalaria* sp.). **Moluscos:** (Planorbidae).**Arácnidos:**arañas.



Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Fruto Solanácea.

De la Peña (2011a).**Vegetales:** Semilla Echinochloa crusgalli, *Setaria parviflora, Soghum halepense,* Gusanos

HÁBITAT

Bañados, esteros, arrozales.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Formosa, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N



El nido tiene forma de tazón. Emplea en la construcción fibras de juncos o de espadañas. Lo ata a plantas acuáticas, ramas de árboles, arbustos o yuyos.
Hartert y Venturi (1909). Tucumán, Dinelli localizó nidos parasitados por *Molothrus bonariensis*.
Smyth (1928). Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Friedmann (1929). Tucumán,nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Friedmann (1929). Tucumán, Shipton localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pereyra (1932c). Zelaya, pdo. Pilar, Buenos Aires, colonia con nidos con huevos.
Pereyra (1938b). Noreste de la provincia de Buenos Aires, nidifica.
Höy y Ottow (1964). Salta,nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Klimaitis (1973). Los Talas, pdo. Berisso, Buenos Aires,noviembre-diciembre de 1970, colonia de nidificación. Nidos parasitados por *Molothrus bonariensis*.
Friedmann et al. (1977). Buenos Aires, Naroskylocalizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Contino (1980). Nidifica en noroeste.
Fraga (1983c). Estancia La Candelaria, pdo. Lobos, Buenos Aires,nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Salvador (1983b). Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 1979 a 1983, el 22,5 % (48 de 213) de los nidos estaban parasitados por *Molothrus bonariensis*.
Fraga (1983c). Estancia La Candelaria, pdo. Lobos, Buenos Aires. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Blanco (1995). Bernal, pdo. Quilmes, Hudson, pdo. Berazategui, Gral. Lavalle, pdo. Gral. Lavalle, Buenos Aires. Varios nidos, algunos parasitados por *Molothrus bonariensis*.
Lyon (1997). Buenos Airesnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Alabarce y Antelo (1998). San Felipe, dpto. Lules, Tucumán, nidifica en diciembre.Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Di Giacomo (2005h).Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre noviembre y enero. Se hallaronmás de 100 nidos.
De la Peña (2013c). Total de colonias localizadas: 47, desde el 26-02-1970 al 19-11-2004, 2 en Córdoba, 2 en Entre Ríos y el resto en Santa Fe. Es parasitado por *Molothrus bonariensis*
Medidas: Diámetro total: de 10 a 13 cm. Diámetro interno: de 6 a 8 cm. Profundidad: de 5 a 10 cm. Alto: de 10 a 11 cm.
Salvador y Bodrati (2014a). Reserva El Bagual, Formosa, Di Giacomo, localizó nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, 4 nidos con 3 huevos cada uno.
Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Daireaux y Zelaya, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 10 nidos. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*

Huevos
Pone 3, a veces 4 huevos, ovoidales, verdes claros o celestes con pintas, manchitas y rayas negras más concentradas en el polo mayor. Algunos con manchitas grises.

Medidas
Smyth (1928): 21,0 a 25,5 x 16,0 a 17,0
Pereyra (1938b): 23,0 x 17,0
Klimaitis (1973): 19,4 a 23,6 x 15,0 a 16,9 X= 21,8 x 16,2
Di Giacomo (2005h): 20,7 a 25,5 x 15,1 a 18,0 X= 22,7 x 16,3 (N= 83)
Alabarce y Antelo (1998): 22,0 x 15,4
De la Peña (2013c): 21,3 a 25,5 x 15,5 a 17,4 X= 23,3 x 16,2 (N= 45)



Pesos
Di Giacomo (2005h): 2,3 a 3,9 X= 2,9 (N= 82)
De la Peña (2013c): 3,1 a 3,6 X= 3,4 (N= 22)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,166 a 0,216 X= 0,195 (N= 24)

Generalidades
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 11 ó 12 días. Los pichones permanecen en el nido entre 11 y 13 días.
Di Giacomo (2005h). De 21 nidos, estudiados 4 estaban parasitados por *Molothrus bonariensis*.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 6 a 7 días. Pone en días corridos. Período de incubación11 días. Permanencia de los pichones en el nido de 11 a 12 días.

PICHONES
Descripción
Klimaitis (1973). Nacen con los ojos cerrados e implumes. Segundo día crecimiento de fino plumón. Cuarto y quinto días pequeños canutos en en las alas y en los lados del cuerpo. Sexto y séptimo días abren los ojos.

De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel amarillenta. Comisura blanca. Interior de la cavidad bucal rosada.
Plumón gris.
4 día
Ojos cerrados. Piel amarillo-verdosa. Comisura blanquecina. Cavidad bucal rosada. Escaso plumón gris.
6 día
Ojos abiertos. Abriendo las láminas de las plumas ventrales.
8 **día**
Dorsalmente marrón. Ventralmente color de la hembra.
Pico oscuro. Solamente una manchita blanca en la base de la mandíbula.
9 día
Vainas dorsales y ventrales: 0,5 cm.
12 día
Emplumado. Pico y patas grises. Alas pardo oscuras.

Otros
De la Peña (1988a). Un ejemplar Albino. Aguará Grande, dpto. San Cristóbal, Santa Fe, 24-11-1983.
De la Peña y Bruno (2008). Dos ejemplares Albinos, en Villa Roda, dpto. La Capital, Santa Fe.

Observaciones
En un campo inundado había unos 200-250 nidos, con huevos y con pichones. Estaban en Cina cina o en yuyos, casi a ras del suelo.
Observaciones de la construcción de un nido.
El macho trae pajas que busca a 50 m. del lugar. La hembra viene sin materiales y acomoda el nido. También busca fibras mojadas muy cerca del nido (2-3 m.).
La hembra sacaba pajitas de un nido de *Fluvicola albiventer* que estaba a 3 m. y fue abandonado por la creciente del agua. El macho canta y entreabre las alas, se echa como para incubar.

Parasitismo
De la Peña en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Smyth (1928).Friedmann (1929). Höy y Ottow (1964). Klimaitis (1973). Friedmann et al. (1977). Fraga (1983c).Salvador (1983b). Lyon (1997). Alabarce y Antelo (1998).De la Peña (2013c).Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

Más información:
Klimaitis (1973). Salvador (1983b). De la Peña (2013c).

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,4	0,9	1,2-1,5						3,0-4,8
2	0,4-0,5	1,1-1,3	1,4-1,9						3,7-6,0
3	0,6-0,7	1,2-1,7	1,5-2,2	0,1		0,2			4,5-9,5
4	0,7	1,6-1,8	2,0-2,5	0,4-0,5		0,3			11,0-13,0
5	0,8	1,8-2,2	2,2-2,7	0,7-1,2		0,5-1,0			15,0-16,0
6	0,9-1,0	2,3-2,7	2,7-3,0	1,8-2,0	0,2	1,0-1,5	0,3	0,4	16,0-22,0
7	1,0	2,6-3,0	2,9-3,7	2,1	0,4	1,5-1,7	0,5	0,8-1,0	19,0-24,0
8	1,1	3,0-3,2	3,4-3,9	2,6	1,0	1,7	1,0	1,1	22,0-27,0
9	1,1	3,3	3,4-4,0	2,7	2,3	1,8	2,2	1,2	29,0
10	1,1	3,4	3,9-4,0	2,8	2,4	1,9	2,3	1,3	29,0
11	1,1	3,4	4,0	2,8	2,5	1,9	2,4	1,4	30,0,0
12	1,1	3,4	4,0	2,8	2,6	1,9	2,7	1,5	31,0

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: negro con la corona y la garganta castañas. Hembra: jaspeada dorsal y ventralmente.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Chrysomus ruficapillus ruficapillus (Vieillot, 1819)desde el norte del país hasta La Rioja, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, La Pampa y oeste de Río Negro.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Extensa área de distribución que abarca, Guayana Francesa, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, y Argentina.


Esperanza.Santa Fe.22-12-2004


Ejemplar Albino taxidermizado




Esperanza.Santa Fe.17-12-2004



Esperanza.Santa Fe.20-02-2007
Un ejemplar con plumaje normal y otro blanco.



Esperanza.Santa Fe.24-12-2004



Esperanza.Santa Fe.27-09-2007



Esperanza.Santa Fe.28-12-2007



Villa Roda. Santa Fe. 04-12-1212



Ruta 13.Santa Fe.15-11-2010. Juveniles tomando agua



Esperanza.Santa Fe.17-12-2004




Esperanza.Santa Fe.24-12-2004



Esperanza.Santa Fe.31-01-2005
Parasitado por *Molothrus bonariensis*

CITAS Y OBSERVACIONES



Chrysomusruficapillus ruficapillus (Vieillot, 1819)

Buenos Aires
Citas: Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); De la Peña (2013c); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1932c,1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Straneck (1990e)

Observaciones: De la Peña (Casbas, pdo. Guaminí, 01-12-2000)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Córdoba
Citas: De la Peña (2013c); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b); Salvador (1983); Yzurieta (1995)
Observaciones: De la Peña (Isla Verde, dpto. Marcos Juárez,21-10-1998; Arias, dpto. Marcos Juárez,21-10-1998; Jesús María, dpto. Colón, 24-03-2006)
Chaco
Citas:Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005); Moschione y Bishels (2004)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (987b); Darrieu y Camperi (1994); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá, 19-09-1979; Paso de los Libres, dpto. Paso de los Libres, 11-12-2002)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008)

Formosa
Citas:Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Ordano et al. (1999); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi (1989); Camperi et al. (2013); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); De la Peña y Tittarelli (2011); Serracín y Romero (1998); Siegenthaler (1984, 2004)

Observaciones: De la Peña (General Pico, dpto. Mara Co, 01-12-2000)

La Rioja
Citas: Nores y Salvador (1985)

Mendoza
Citas: Chebez et al. (1993)

Misiones
Citas: Camperi (1989); Chebez (1996a);

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Esteban (1953); Moschione et al. (2013)
White (1882)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero, F. (2009); Lucero (2013i)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Del Barco et al. (2006); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Pergolani de Costa (1950); Quiroga y Hadad (2004); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996, 1998); Brandán y Navarro (2009); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983) ; Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz et al. (2013c)

TORDO AMARILLO *Xanthopsar flavus* (Gmelin, 1788)



Otros nombres: Cabeza amarilla. Dragón. Tordo de cabeza amarilla. Varillero amarillo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 21 cm.
Peso: Fraga (2011c): (M) 42,5 g; (H) 39,3 g
Coloración. Pico y patas negros. Iris naranja.
Macho. Cabeza, "Hombros", rabadilla, cubiertas alares internas y parte ventral amarillos. Lorum, dorsal, alas y cola negros.
Hembra. Dorsal parda estriada de oscuro. Cejas, rabadilla, "Hombros",cubiertas internas de las alas y parte ventral amarillo. Alas y cola pardas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Burmeister en Collar et al. (1992). **Insectos:**Larvas.Pupas.
Hudson en Collar et al. (1992).**Insectos:**Gusanos, Insectos no identificados.
Klimaitis (1986). **Insectos:**Langostas.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:**Lepidoptera (orugas).

HÁBITAT
Pastizales, pajonales en praderas.
NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Córdoba-San Luis, Entre Ríos, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N

Semiesfera de fibras vegetales entrelazadas.

Goodall (1923). Córdoba-San Luisnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Smyth (1928). Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pereyra (1932c). Zelaya, pdo. Luján, Buenos Aires, pichones voladores.
Pereyra (1933a). Zelaya, pdo. Luján, Buenos Aires, 27-11-1932, nido con 5 huevos.
Fraga et al. (1998). Entre Ríosnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Fraga (2002). Entre Ríosnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.



Huevos
Pone 4 ó 5 huevos blancos con pintas y manchitas rojizas.

Medidas
Smyth (1928): 22,5 x 17,5
Pereyra (1933a): 25,0 x 18,0

Otros
Goodall (1923).Smyth (1928).Fraga et al. (1998).Fraga (2002)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Amarillo. Dorso, alas y cola negros.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Xanthopsar flavus (Gmelin, 1788) en el sur de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.Observado además en Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Reducida área de distribución en extremo sur de Brasil, este de Paraguay, este de Uruguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES

Buenos Aires
Citas: Barbetti et al. (1985); Chebez (1994); Durnford (1878); Holland (1923); Pereyra (1932c, 1938b)

Corrientes
Citas:Contreras (1987a, 1987b); Darrieu y Camperi (1994); Esteban (1953); Fraga (2001b); Fraga et al. (1998); Giraudo et al. (2003b, 2006); López-Lanús et al. (2013b);

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); Codesido y Fraga (2009); De la Peña (2012b); Fraga et al. (1998); Fraga (2005b); Jordán et al. (2015); Klimaitis (1984, 1986); Raffo et al. (2008); Zapata (2002)

Misiones
Citas: Chebez y Casañas (2000); Chebez (1992a, 1996a); Zotta (1935, 1942)

PECHO AMARILLO GRANDE *Pseudoleistes guirahuro* (Vieillot, 1819)

Otros nombres: Chopí de bañado. Chororó. Chororó grande. Guirahuró. Pecho amarillo con rabadilla amarilla. Tordo treinta.

DESCRIPCIÓN

Largo: 24 cm.
Peso: Storer (1989): N= 5 (M) X: 83,6 g (Rango 74 a 93), N= 1 (H) 75 g; Fraga (2011c): (M) 91,2 g; (H) 81,9 g
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Cabeza y pecho pardos negruzcos. Dorsal parda olivácea. Rabadilla, cubiertas externas e internas de las alas y el resto de la parte ventral amarillos. Alas y cola pardas.



Alimentación
Marelli (1919).Insectos.
Liebermann (1935).Langostas.

HÁBITAT
Pajonales cerca del agua, bañados.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Formosa y Chaco.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Semiesfera de fibras vegetales.
Fraga y Di Giacomo (2004).Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidificando.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre noviembre y enero. Se estudiaron 4 nidos. Uno con 4 huevos, otro con 6, uno con 3 pichones y un huevo y el restante un pichón.
Uranga (in litt.). Eva Perón. Dpto. Bermejo. Chaco. (01-12-2008). Nido solitario en un matorral, a 1,30 m. del suelo, en la orilla de un monte y en un pajonal encharcado.
Tazón de fibras vegetales y pastos. La base de barro e internamente fibras finas.
Alto: 15 cm. Diámetro interno: 10 cm. Total: 14 cm. Profundidad: 7 cm. Tenía 4 huevos.



Huevos
Pone 3 ó 4 huevos. Base blanquecina rosada con pintas y manchitas grises y castañas, más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 27,0 x 19,0
Di Giacomo (2005h): 24,2 a 26,1 x 18,8 a 20,0 X=25,6 x 19,3 (N= 8)
Uranga (in litt.): 24,3 a 25,0 x 18,8 a 19,2 X= 24,6 x 18,7 (N= 4)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 4,5 a 5,2 X= 4,9 (N= 8)

Más información:
Fraga y Di Giacomo (2004).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pardo con la rabadilla, cubiertas alares y parte ventral amarillas.
Se diferencia del Pecho amarillo chico por tener la rabadilla amarilla.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819)en Misiones, Corrientes, este de Formosa y de Chaco y norte de Santa Fe.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Argentina, sureste de Brasil, este de Paraguay, Uruguay y noreste de Argentina.


CITAS Y OBSERVACIONES

Chaco
Observaciones: De la Peña (Cerrito, dpto. Bermejo, 26-09-1972)


Mercedes. Corrientes. 15-04-2007. Foto: José Pensiero

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Camperi (1989); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Fraga (2001b); Fraga et al (2004); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008)Straneck (1990e)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979; Ituzaingó, dpto. Ituzaingó, 24-09-1993; Gobernador Virasoro, dpto. Santo Tomé, 24-09-1993)



Entre Ríos
Citas: Se
rié y Smyth (1923)

Formosa
Citas:Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Fraga y Di Giacomo (2004); López Lanús (1997); Narosky y Martelli (1995)

Observaciones: De la Peña (Colonia Cano, dpto. Laishi, 10-11-1993)

Misiones
Citas: Camperi (1989); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909)

PECHO AMARILLO COMÚN *Pseudoleistes virescens* (Vieillot, 1819)

Otros nombres : Boquence. Chororó. Cuarentitrés. Dragón. Mirlo. Pecho amarillo chico. Tordo treinta.
DESCRIPCIÓN
Largo: 22 cm.
Peso: Contreras (1983c): N= 1 (H) 72,5 g; Darrieu y Camperi (1998): N= 62 (M) X: 79,6 g, N= 56 (H) X: 72,9 g; Salvador (2014a):N= 5 (?) X= 78,5 g (Rango 73,9 a 81,2)
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Cabeza, dorsal, garganta, parte superior del pecho, subcaudales y flancos pardos con tono oliva. Pecho inferior, abdomen, "Hombros" y tapadas internas de las alas amarillos. Alas y cola pardas.



COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o en grupo, a veces de hasta 25-30 ejemplares. Se posa en ramas, arbustos, alambres. En el suelo, hurga debajo de materias fecales y de otros objetos en busca de alimentos.
Alimentación
Liebermann (1935). **Insectos:**Langostas.
Zotta (1940).**Insectos:**Coleópteros (Carabidaeo, Curculiónido). Hemípteros (Petatomidae). **Vegetales:** semillas no determinadas. **Otros:**Minerales.
Martínez et al. (1975).**Insectos:**Coleoptera (Curculionidae). Hemiptera. Orthoptera (Acridiidae).
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010).**Insectos:**Coleoptera (Curculionidae, Sacarabaeidae). Diptera. Lepidoptera (orugas).**Vegetales:** semillade Gramíneas, *Avena sativa, Panicum mileaceum, Scirpus californicus.*Semillasno determinas.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010).**Vegetales:** Semilla *Zea mays.*
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.): El canto es áspero y trinado: Tritrutrithiehh ... chie . chi .. Tritritriutritriehh ..

HÁBITAT
Pajonales en orillas de bañados, esteros, orillas de lagunas.


NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Corrientes, Córdoba, San Luis, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	



El nido tiene forma de tazón. Es construido con fibras vegetales, tallos y barro en la base. Internamente fibras finas. Lo ubica generalmente en Pajas bravas (*Panicum prionitis*).Expuesto. Elaborado.



Hudson (1870 y 1874). Buenos Aires, nidifica.Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Gibson (1880a). Cabo San Antonio, pdo de la Costa, Buenos Aires. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Goodall (1923). Córdoba-San Luis, nidifica.Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Smyth (1928). Entre Ríos, nidifica.Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Pereyra (1932c). Zelaya, pdo. Pilar, Buenos Aires, diciembre de 1931, nidos con 3 huevos.
Pereyra (1938b). Noreste de la provincia de Buenos Aires, nidifica desde octubre a diciembre.
Zapata y Cabrera (1969). Chasicó, pdo. Villarino, Buenos Aires, 03-12-1967 nido con 4 huevos.
Friedmann et al. (1977). Buenos Aires, Orians localizó nidos. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Wilson (1979). Corrientes, nidifica.
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando.Nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Mermoz y Reboreda (1993). Gral. Lavalle, pdo. Gral. Lavalle, Buenos Aires, octubre a diciembre de 1992, se encontraron 101nidos. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Mermoz y Reboreda (1994). Buenos Aires, es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Mermoz y Reboreda (1995b). Provincia de Buenos Aires, 1992 a 1994, nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*
Fraga (2002). Entre Ríos, nido. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Mermoz y Reboreda (2003). Buenos Aires, es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 18 nidos entre setiembre y diciembre.Nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Cozzani y Zalba (2009). Buenos Aires, nidifica. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Codesido et al. (2013). Rincón de Ajó, pdo. Gral. Lavalle, Buenos Aires, nido con huevos.
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 9, desde el 09-10-1971 hasta el 12-11-1991, todos en Santa Fe. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Medidas: Diámetro total: de 13 a 16 cm. Diámetro interno: de 7 a 9 cm. Profundidad: de 6,5 a 7,5 cm. Alto: de 14 a 16 cm.
Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 9 nidos. Es parasitado por *Molothrus bonariensis* y *Molothrus rufoaxillaris.*

Huevos

Pone 4 huevos, ovoidales, blancos o rosados con pintas y manchitas castañas distribuidas por toda la superficie pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 23,0 a 26,0 x 17,0
Smyth (1928): 24,0 a 29,0 x 18,0 a 20,5
Pereyra (1938b): 26,0 x 19,0
Zapata y Cabrera (1969): 27,5 a 28,0 x 18,8 a 19,6 X= 27,7 x 19,2 (N= 2)
De la Peña (2013c): 24,8 a 27,5 x 18,4 a 20 X= 26,4 x 18,8 (N= 14)

Peso
Zapata y Cabrera (1969): X= 5 (N= 2)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,317 a 0,405 X= 0,375 (N= 14)

Observaciones
De la Peña (2013c). El 27-11-91, en Gdor. Mancilla, dpto. Tala, Entre Ríos, un ejemplar alimentaba dos pichones de *Molothrus bonariensis.*

Otros
Pretelli (2012). Un ejemplar Albino.
Hudson (1870 y 1874). Gibson (1880a). Goodall (1923). Smyth (1928). Friedmann et al. (1977). Darrieu et al. (1988).Mermoz y Reboreda (1993).Mermoz y Reboreda (1994). Mermoz y Reboreda (1995b).Fraga (2002). Mermoz y Reboreda (2003). Babarskas et al. (2003). Cozzani y Zalba (2009). De la Peña (2013c). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*


Cayastá.Santa Fe.22-11-1981
Parasitado por *Molothrus bonariensis*


Aromos.Santa Fe.11-12-2007


Campo Andino.Santa Fe.25-09-1977


Aguará Grande.Santa Fe.24-11-1983



Aromos.Santa Fe.11-12-2007



Aromos.Santa Fe.11-12-2007

Más información:
Mermoz y Reboreda (2003). Haupt et al. (2005). Haupt y Mermoz (2009).De la Peña (2013c).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Amarillo en el pecho inferior y en el abdomen. Dorsal, cabeza, pecho superior, alas y cola, pardos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Pseudoleistes virescens (Vieillot, 1819)en el sur de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. Observado en Mendoza y Salta.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípioca.Sur de Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Codesido et al. (2011, 2013); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Darrieu et al. (1996); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Durnford (1878); Fiameni (1994); Hartert y Venturi (1909); Isacch y Martínez (2001); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2011b); Marelli (1933); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Narosky (1983); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1932c, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Soave et al. (1999); Straneck (1990b) ; Weller (1967); White (1882); Zapata (1998); Zapata y Cabrera (1969)



Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 08-02-1976; 9 de Julio, pdo. 9 de julio, 26-11-2000)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b); Salvador (1983); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1983c, 1987b); Giraudo et al. (2006); Fraga(2001b); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013c); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975)

Formosa
Citas: Contreras (1987c, 1993b)

La Pampa
Citas: Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Siegenthaler (2004); Wrede y Albarracín (1991)

Observaciones: De la Peña (Catriló, dpto. Catriló, 28-11-1998)

Mendoza
Citas: Contreras y Fernández (1980)

Misiones
Citas: Capmourteres et al. (2015)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Luis
Citas: Chebez en Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson(1926)

Santiago del Estero
Citas: Olrog y Short (1975); Zotta (1944)

Tucumán
Citas: Lucero (1983)

TORDO MÚSICO *Agelaioides badius* (Vieillot, 1819)

Otros nombres: Catalina. Chinita. Flautita. Guitarrera. Mulata. Morajú. Murayú. Músico. Taracchi. Torda café. Tordo. Tordo bayo. Tordo canela. Tordo cordobés. Tordo de las ciénagas. Tordo marrón. Tordo mulato. Tordo mulato guitarrero. Tordo zaino. Urraquita.

DESCRIPCIÓN
Largo: 20 cm.

Peso: Fiora (1934): N= 12 X= 53,3 g (Rango 43,0 a 62,0); Contreras (1979f): N= 1 (M) 50,0 g, N= 1 (H) 43,5 g; Salvador (1988): N= 1 (M) 43,5 g; Camperi (1992c): N= 1 (M) 43,5 g; Di Giacomo (2005h): N= 19 X= 36,2 g (Rango 31,0 a 39,5); Salvador (2014a): N= 21 (?) X= 43,6 g (Rango 40,7 a 45,1); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 3 X= 40,2 g (Rango 32,3 a 46,0), N= 6 X= 36,3 g (Rango 33,5 a 39,5)
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Lorum negruzco. Dorsal gris pardusca. Ventral gris pardusca clara. Alas pardas con las barbas externas y las cobijas alares castañas. Cola negruzca.

COMPORTAMIENTO
Anda en bandaditas, hasta de 20 ejemplares, a veces se ve entremezclado con *Molothrus rufoaxillaris*.
De la Peña (2011a). Recolecta en el suelo, vegetación herbácea y ramas. Se posa en panojas de Sorgo. Sostiene las inflorescencias, saca las espiguillas y come semillas de *Setaria lachnea*. A las moras las sostiene con una pata. También las corta y lleva a otra rama y la deglute con la misma técnica. Caza al vuelo hormigas voladoras.

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Semillas de Cebadilla criolla (*Bromus catharticus*), Brachiaria (*Oruchloa plantaginea*), Urocloa (*Urochloa panicoides*)
Marelli (1919). **Vegetales:**semillas no determinadas.
Aravena (1928). **Vegetales:**Semillasno determinadas. **Insectos:**Coleóptero (Curculiónido). Lepidópteros (larvas). (*Colias lesbia*).
Martínez et al. (1975). **Vegetales:***Panicum* sp. **Insectos:**Coleoptera. Homoptera (Aphididae). Lepidoptera (Larva).
Baliño (1984). **Vegetales:**Fruto de *Melia azedarach*.
Mason (1985). **Insectos:** Acridiidae. **Arácnidos:** Araneae.
Beltzer (1988c). **Vegetales:**Semillas*Echinochloa* sp., *Muehlenbeckia* sp., *Polygonum* sp.*Paspalum* sp., *Urera aurentiaca.***Insectos:**Coleoptera (Carabidae), (Elateridae, Carabidae) (Curculionidae, Hydrophilidae). Lepidoptera (Larva). Hemiptera (Reduviidae, *Nezara viridula*). **Moluscos:** (*Littoridina parchappei*). **Arácnidos.**
Klimaitis (1993). **Vegetales:**Semillasno determinadaso, restos vegetales.**Otros:** Conchilla.
Roitman et al. (1997). **Vegetales:**Pétalode *Myrrhinium atropurpureum*.
Haro (1998). **Insectos:**Hemiptera (Coreidae). Hymenoptera. Orthoptera (Acridiidae, Tettigonidae).
De la Peña y Pensiero (2003). **Vegetales:**Semilla *Melica macra,* Fruto*Morus alba*.
Del Barco y Beltzer (2005). **Vegetales:**Semilla*Echinochloa* sp.,*Polygonum* sp.,*Paspalum repens,Paspalum* sp., Frutos de*Muehlenbeckia* sp.,*Urera aurentiaca*. **Insectos:**Coleópteros (Carabidae, Elateridae) (Curculionidae, Hydrophilidae). Hemiptera (*Nezara viridula*).**Moluscos:** (*Littoridina parchappei*).
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:** semillas *Paspalum intermedium, Paspalum rufum, Paspalum urvillei.* Fruto *Achatocarpus praecox.***Insectos:**Termitas aladas.Hormigas aladas (*Atta vollenweideri, Acromyrmex* sp.)
Laguna et al. (2005). **Aves:** huevos.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semilla *Amaranthus* sp.*, Panicum mileaceum,* Gramíneas, hojas no determinadas*, Sorghum* sp., **Insectos:** Hemiptera (Pentatomidae). Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas).

Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:**Lepidoptera (Pieridae: *Colias lesbia*: orugas). Coleoptera (Chrysomelidae, Curculionidae, Scarabaeidae, no identificado).
De la Peña (2011a).**Vegetales:**Flor*Grevillea robusta*. Frutos de *Lycium cestroides, Morus alba.*Semillas *Melica macra, Setaria lachnea, Sorghum halepense, Sorghum* sp.*Zea mays*. **Insectos:**Hormigas aladas.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Más información:
Voss y Sander (1981)

Voces
Straneck (*in litt*.). Suele cantar en grupos. El canto está compuesto por silbos agudos y melodiosos: Tsiu . suií . sie . sivihí .. tivi . sie . sie . suhií ..

HÁBITAT
Praderas, áreas rurales, sabanas, bosques.

NIDIFICACIÓN

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N								N	N

Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Formosa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires.

El nido tiene forma de tacita. Es construido con pajitas y raicillas. Lo ubica en nidos abandonados, de aves. Raramente sostenido en plantas.Expuesto. Elaborado.



Miller (1917). Saltanido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Gibson (1918). Buenos Aires, nido en nido de Benteveo (*Pitangus sulphuratus*).
Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, nidos.
Daguerre (1924d). Las Rosas, Buenos Aires, nido en uno de *Anumbius annumi* el 24 de noviembre con 4 huevos propios y 2 de *Molothrus rufoaxillaris*.
Friedmann (1929). Tucumány Entre Ríos nidos parasitados por *Molothrus bonariensis*.
Friedmann (1929). Tucumán, Girardlocalizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pereyra (1937). La Pampa, nidifica.
Höy y Otto (1964). Salta, nido en nido de Canastero chaqueño (*Asthenes baeri*) y de Hornero (*Furnarius rufus*)
Salvador (1983b). Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 1979 a 1983, el 12,5 % (1 de 8) de los nidos estaban parasitados por *Molothrus bonariensis*.
Fraga (1983c). Estancia La Candelaria, pdo. Lobos, Buenos Aires. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Salvador (1984). Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 09-01-1981, 2 huevos y un pichón propios, 3 huevos de Molothrus rufoaxillaris y 1 pichón de *Molothrus bonariensis.*

Mason (1986). Buenos Airesnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Fraga (1988). Córdoba, nido en nido de Cacholote castaño (*Pseudoseisura gutturalis*), Buenos Aires nido en nido de Benteveo (*Pitangus sulphuratus*).



Haro y Gutierres (1992). Córdoba, nido en nido de Cacholote castaño (*Pseudoseisura gutturalis*).
Nores y Nores (1994). Córdoba, nido en uno de Cacholote castaño (*Pseudoseisura lophotes*).
Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nidifica.
De Mársico et al. (2010a). Buenos Aires nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Gantchoff et al. (2011). Buenos Aires nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pautasso (2002b).Reserva Urbana de la Ciudad Universitaria UNL "El Pozo", dpto. La Capital, Santa Fe, 17-11-1999, nido en uno de *Phacellodomus ruber*.
Di Giacomo (2005h).Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre noviembre y marzo. Se observaron70 nidos. De 54 nidos estudiados, 41 estaban parasitados por *Molothrus rufoaxillaris*.
Salvador (2012c).Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, entre 1979 y 2005se localizaron 198 nidos en nidos abandonados de otras aves.
Leiva et al. (2004). Arroyo Potrero, dpto. La Capital,Santa Fe, 15-02-2002, nido en uno de Boyero negro (*Cacicus solitarius*).
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 101, desde el 26-02-1971 al 20-12-2004, uno en Salta y los restantes en provincia de santa Fe. Es parasitado por *Molothrus rufoaxillaris* y *Molothrus bonariensis*.
Medidas: Diámetro interno: de 7 a 8 cm. Profundidad: de 2,5 a 3 cm.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", 3 nidos con 4 huevos cada uno.
Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 6 nidos. Es parasitado por *Molothrus bonariensis* y *Molothrus rufoaxillaris.*

Ubicación y número de nidos

Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº
En *Phacellodomus sibilatrix*	70	En nidos de palitos	3	En Caja nido	1
En *Phacellodomus ruber*	10	En *Coryphistera alaudina*	2	En *Phacellodomus striaticollis*	1
En *Pitangus sulphuratus*	6	En *Phacellodomus rufifrons*	1	En *Asthenes baeri*	1
En *Anumbius annumbi*	4	En *Agelaius ruficapillus*	1	En *Zonotrichia capensis*	1

Huevos
Pone 4 huevos, ovoidales, de base blanquecina, cremas o crema-verdosos con pintas y manchitas castañas y grises.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 21,5 a 25,5 x 16,5 a 18,5
Serié y Smyth (1923): 25,0 x 19,0
Smyth (1928): 22,5 a 27,5 x 16,5 a 19,5
Pereyra (1938b): 24,0 x 18,0
Di Giacomo (2005h): 20,2 a 26,9 x 15,7 a 18,6 X= 23,3 x 17,3 (N= 99)
De la Peña (2013c):22 a 25,9 x 16,3 a 19,3 X= 23,3 x 17,42 (N= 33)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 2,5 a 4,4 X= 3,5 (N= 98)
De la Peña (2013c):3,3 a 4,9 X= 4,1 (N= 14)
De la Peña (2013c):cáscaras 0,216 a 0,388 X= 0,281 (N= 33)

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c).Nacen con los ojos cerrados. Comisura blanca. Pico y patas grises. Cavidad bucal rosado claro.

Piel naranja. Escaso plumón gris en cabeza, dorsal y dorsal de las alas.

2 días

Apenas se ven las vainas alares.

3 días

Abren los ojos, marrones.

4-5 días

Aparecen las vainas en las zonas ptéridas. Ventralmente en extremo de las vainas es blanquecino en todos.

7 días

Abriendo las láminas. Escaso plumón. Vainas dorsales gris claro. Láminas ventrales pardas.

8 días

Emplumando color del adulto.

9 días

Emplumados. Si son molestados se van del nido.

Generalidades

Di Giacomo (2005h). El período de incubación es de 12 ó 13 días. Los pichones permanecen en el nido entre 10 y 13 días.

De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 10 a 12 días. Período de incubación 13 días. Los huevos son puestos en días corridos. Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido 13-14 días.

Observaciones

De la Peña (2013c).Los nidos a veces tienen muchos huevos, porque ponen más de una hembra. Pueden estar fuera de la cámara o en el suelo.

El 06-12-2002, en Esperanza un ejemplar rompió y comió un huevo de *Tyrannus savana.*

Alimentación.

Se observó llevando a los pichones Mamboretá (*Stagmatotera hyaloptera*).

MEDIDAS Y PESOS DE PICHONES

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1	0,4	1,0-1,3	1,3-1,9						4,9-9,7
2	0,4-0,5	1,3-1,5	1,6-2,4						7,2-14,0
3	0,6-0,7	1,2-1,7	1,5-2,2	0,1		0,2			10,4-18,0
4	0,7	1,6-1,8	2,0-2,5	0,4-1,3		0,3			20,0-22,5
5	0,8	1,9-2,2	2,4-3,0	0,5-1,5		0,5-1,0			24,0-26,0
6	0,9-1,0	2,3-2,7	2,7-3,0	1,3-1,8	0,2	1,0-1,5	0,3	0,4	28,0-30,0
7	1,0	2,4-2,9	3,0-3,7	1,2-2,0	0,5-1,0	1,5-1,7	0,5	0,8-1,0	30,0-31,0
8	1,1	2,7-2,9	3,4-3,8	2,0	1,2	1,7	1,0	0,6-1,1	31,0-32,0
9	1,1	3,0	3,8-4,0	2,0	1,5	2,0	1,1	1,4-1,9	32,0-33,5

Otros
Fraga (1984a). Antoniazzi et al. (2011). De la Peña et al. (2003a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Daguerre (1924d).Di Giacomo (2005h).De la Peña (2013c). Anfitrión de *Molothrus rufoaxillaris***.**
Miller (1917). Friedmann (1929). Salvador (1983b). Fraga (1983c).Salvador y Salvador (1984).Mason (1986). Di Giacomo (2005h).De Mársico et al. (2010a). Gantchoff et al. (2011). De la Peña (2013c). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

Depredación
De adultos: *Tyto alba* (Morici 1990b)

Más información: Salvador (1972, 1983b, 1984a, 1988, 1991, 2014b)**.** De la Peña (2013c).



Esperanza.Santa Fe.15-12-2004
Parasitado por *Molothrus bonariensis*



Esperanza.Santa Fe.23-02-2008



Esperanza.Santa Fe.28-12-2004



Esperanza.Santa Fe.15-12-2004
Parasitado por *Molothrus rufoaxisllaris*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pardusco con lorum y cola negruzcos. Alas pardas con castaño.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Agelaioides badius badius (Vieillot, 1819)desde el norte del país hasta Neuquén, Río Negro y Chubut.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Comprende un área extensa que abarca Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES

Agelaioides badius badius (Vieillot, 1819)

Buenos Aires
Citas: Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bianchini y Arenas (2014b); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Codesido et al. (2011); Dabbene (1919b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Fraga (1972, 1979c, 1984a, 1991); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1977c., 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987) Leveau y Leveau (2004, 2004b, 2006, 2011b); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Montaldo y Claver (1986); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012, 2014); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Salvador y Di Giacomo (2014); Soave et al. (1999); Zapata (1998); Zuberbhüler (1971)

Catamarca
Citas: Camperi (1989); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Hartert y Venturi (1909)


Observaciones: De la Peña (El Alto, dpto. El Alto, 29-01-1977; Santa María, dpto. Santa María, 08-02-1977)

Chaco
Citas:Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005); Moschione y Bishels (2004)
Observaciones: De la Peña (Basail, dpto. San Fernando, 26-08-1987)

Chubut
Citas: Daciuuk (1979); Harris (2008); Narosky (1983); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Castellanos (1934); Haro (1998); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador(1983, 1988, 2012c); Sferco y Nores (2003); Straneck (1990b) ; Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Vaquerías, dpto. Punilla, 26-05-2001, Chancani, dpto. Pocho, 30-03-2002, Jesús María, dpto. Colón, 01-05-2008)



Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1994); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008); Wilson(1977)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 18-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Hartert y Venturi (1909); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001, 2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982);

Raffo et al. (2008); Roitman et al. (1997); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975)

Chubut
Citas: Daciuk (1979); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Narosky (1983)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Fiora (1934); Moschione y Segovia (2005)
Observaciones: De la Peña (San Salvador de Jujuy, dpto. Capital, 01-02-1977)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Pereyra (1937); Siegenthaler (1984); Sigenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Koslowsky (1895)

Mendoza
Citas: Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu y Segura (2015); Gómez (2006); López de Casenave (2001); Lucero (2013f); Martínez et al. (1997a); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d); Wetmore (1926b)


Esperanza. 24-11-2015


Esperanza. 29-10-2015

Misiones
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Krauczuk (2005)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Acerbo, Partridge en Veiga et al. (2005); Babarskas et al. (1996); Funes y Sheridan en Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Nores e Yzurieta (1982b.); Veiga et al. (2005)


Río Negro
Citas:Bettinelli y Chebez (1986); Camperi y Darrieu (2005); Christie et al. (2004); Daciuuk (1979); Gelain (2001); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2005, 2011); Narosky (1983); Navas (1970b); Pérezy Petracci (1998)
Observaciones: De la Peña (General Roca, dpto. Gral. Roca, 28-11-1998)

Salta
Citas: Alabarce y Lucero (1977); Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); De la Peña (2013c); Echevarría et al. (2014); Höy y Ottow (1964); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

San Juan
Citas: Camperi (1989); Camperi y Darrieu (2004); Gelain (2008a); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Lucero (2013f, 2013i)

San Luis
Citas: Casares (1944); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)
Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c, 1988b); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2001, 2002, 2011f, 2013c); De la Peña et al. (2003a); Del Barco y Beltzer (2005); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Quiroga y Hadad (2004); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson (1926)



Santiago del Estero
Citas: Camperi (1989); Codesido y Bilenca (2000); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Antelo et al. (2013); Antelo y Brandán (2006); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007); Capllonch y Aráoz (2007); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983) ; Lucero, M. M.et al. (2002); Malizia et al. (1998); Marigliano et al. (2010); Ortiz et al. (2011, 2013); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Soria et al. (2010)

Observaciones: De la Peña (San Miguel de Tucumán, dpto. Capital, 30-01-1977)

TORDO DE PICO CORTO *Molothrus rufoaxillaris* Cassin, 1866

Otros nombres: Negrucho. Tordo pico corto. Violinista.
DESCRIPCIÓN
Largo: 17 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 1 X= 41,0 g; Salvador (1988):N= 1 (?) 47,5 g; Di Giacomo (2005h): N= 12 (M) X= 54,4 g (Rango 49,0 a 63,0), N= 5 (H) X= 44,1 g (Rango 41,0 a 49,0); Salvador (2014a):N= 7 (M) X= 55,9 g (Rango 52,9 a 59,6), N= 6 (H) X= 48,1 g (Rango 46,7 a 49,6), N= 4 (?)X= 50,9 g (Rango 46,5 a 56,5)
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo rojizo.
Negro. Axilares castañas.
El **juvenil** es parecido al Tordo músico.

COMPORTAMIENTO
En general anda en bandadas con el Tordo músico.
De la Peña (2011a). Recolecta los alimentos en el suelo, vegetación herbácea y ramas, hasta los 5 m.

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Semillas de Barabal (*Setaria parviflora*), Brachiaria (*Urochloa plantaginea*)
Marelli (1919). **Vegetales:**Semillas no determinadas.
Aravena (1928). **Insectos:** Coleópteros (Curculiónido). Hemíptero (Edessa). Lepidópteros (*Colias lesbia*) (larvas).
Zotta (1936).**Vegetales:**Semillas. Vegetales. **Insectos:** Coleópteros (Scarabaeidae, Chrysomelidae). Hemíptero (Formicidae, Pheidole). **Otros:** Piedritas.
Baliño (1984). **Vegetales:** Fruto *Melia azedarach.*
Alessio et al. (2005). **Vegetales:**Semilla *Paspalum repens, Polygonum* sp.**Arácnidos:** Arácnida.
Laguna et al. (2005).**Aves:** Huevos.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:**Semilla*Amaranthus* sp.*,Chenopodium* sp.*,* Gramíneas, *Panicum mileaceum, Sorghum halepense, Sorghum* sp.**Insectos:** Coleoptera (Elateridae, Scarabaeidae, no identificado). Hemiptera. Homoptera (Cercopidae). Lepidoptera (orugas). Orthoptera (Acridiidae).
De la Peña (2011a). **Vegetales:**Semilla de Zea mays.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.



Voces
Straneck (*in litt*.). La vocalización es muy variada, una de ellas está compuesta por gorjeos y trinos: Kurkurkurkur . clicliclicliclih ..

HÁBITAT
Praderas, sabanas, bosques.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos parasitados en Tucumán, Formosa, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Parasita al Tordo músico, principalmente. También a otras aves.

Mermoz y Reboreda (1996). Buenos Aires, parasita al Pecho amarillo común (*Pseudoleistes virescens*)
Di Giacomo (2005h).Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre octubre y marzo. Parasita al Tordo músico (*Agelaioides badius*) y al Chopi (*Gnorimopsar chopi*)
Di Giacomo et al. (2009). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, parasita al Boyero negro (*Cacicus solitarius*) y al Picabuey (*Machetornis rixosa*)
De la Peña (2013c). Total de nidos parasitados: 14, desde el 25-11-1976 al 01-12-2004, todos en provincia de Santa Fe y en nidos de *Agelaioides badius, excepto uno en Pitangus sulphuratus*.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, 3 nidos parasitados.



Huevos
Se observaron de 1 a 6 huevos por nido parasitado. Ovoidales, color de base crema rosado con pintas castañas y grises.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 21,0 a 24,0 x 17,0
Smyth (1928): 22,0 a 24,0 x 16,5 a 17,5
Pereyra (1938b): 22,0 x 18,0
Di Giacomo (2005h): 22,2 a 25,7 x 16,2 a 19,8 X= 22,9 x 17,8 (N= 166)
De la Peña (2013c): 21,5 a 24,6 x 16,3 a 18,9 X= 23,0 x 17,8 (N= 23)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 2,5 a 4,8 X= 3,7 (N= 158)
De la Peña (2013c): 3,3 a 4,4 X=3,8
(N= 8)
De la Peña (2013c): cáscara 0,321 a 0,385 X= 0,353
(N= 20)

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Cavidad bucal rosada. Comisura blanca. Plumón fino, gris oscuro, en cabeza, dorso y dorsal de las alas. Piel verdosa.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas			
	Pico	Tarso	Tibia	Peso
1	0,7	0,7	1,2	4,0
2	0,7	0,7	1,2	4,1
3	0,7	0,8	1,3	4,3

Generalidades
Di Giacomo (2005h). El período de incubación es de 12 días. Los pichones permanecen en el nido entre 12 y 14 días.
De la Peña (2013c). Período de incubación 13 días. Permanencia de los pichones en el nido de 13 a 14 días.

Otros
Urcola (2011). Un ejemplar con plumaje pardo grisáceo (Dilución pastel).
Otros
De la Peña en Salvador y Bodrati (2013a). Fraga (1984).Antoniazzi et al. (2011). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Mermoz y Reboreda (1996). Parasita al Pecho amarillo común (*Pseudoleistes virescens*)
Di Giacomo (2005h). Parasita al Tordo músico (*Agelaioides badius*) y al Chopi (*Gnorimopsar chopi*)
Di Giacomo et al. (2009). Parasita al Boyero negro (*Cacicus solitarius*) y al Picabuey (*Machetornis rixosa*)
De la Peña (2013c). Parasita al Tordo músico (*Agelaioides*badius) y al Benreveo común (*Pitangus sulphuratus*)

Depredación
De adultos: *Tyto alba* (Morici 1990b)

Más información:

Mermoz y Reboreda(1995a, 1996).Fraga (1998b).Mermoz y Fernandez (2003).Mahler et al. (2009).Di Giacomo et al. (2009).Di Giacomo y Reboreda (2009a).De la Peña (2013c).



Esperanza.Santa Fe.14-04-2007



Esperanza.Santa Fe.31-03-2007



Esperanza.Santa Fe.26-04-07

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Negro. Pico corto.

Se diferencia del Tordo renegrido por tener menor tamaño, pico más corto y carecer de brillo violáceo.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Molothrus rufoaxillaris Cassin, 1866desde el norte del país hasta Chubut.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Extremo sur de Brasil (Rio Grande do Sul), sureste de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES

Buenos Aires

Citas: Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b);Codesido et al. (2011); Dabbene (1919b); Daguerre (1922); Darrieu

y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Fraga (1979c, 1984a); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012, 2014); Montaldo y Claver (1986); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Salvador y Di Giacomo (2014); Soave et al. (1999); Zapata (1998)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); White (1882)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 13-03-1981)

Chaco
Citas:Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005); Moschione y Bishels (2004)

Chubut
Citas: Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Castellanos (1934); De la Peña (2013c); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador(1983, 1988); Sferco y Nores (2003); Straneck (1990b); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Jesús María, dpto. Colón, 30-04-2808; 01-05-2008)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Wilson(1977)

Observaciones: De la Peña (Mercedes, dpto. Mercedes, 19-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2002); Raffo et al. (2008)

Formosa
Citas:Contreras (1987c); Di Giacomoet al. (2010); Di Giacomo(2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Martelli (1995); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas:Brandán y Antelo (2001); Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Cory y Hellmayr (1925); Di Giacomo et al. (2007); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Fiora (1934); Lönnberg (1903); Monteleone y Roesler (2005); Moschione y Segovia (2005); Narosy e Yzurieta (1987); Salvadori (1897)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Sigenthaler (2004); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Camperi (1989); Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Fraga (1996a); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Mendoza
Citas: Darrieu y Segura (2015); Navas (1970)

Neuquén
Citas:Acerbo (2000); Contreras (1976, 1977b); Matarasso (2007); Sympson en Veiga et al. (2005); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas:Camperi y Darrieu (2005); Contreras (1977b); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Navas (1970b)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Höy y Ottow (1964); Miller (1917); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i); Nores e Yzurieta (1982b)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993); Nores y Yzurieta (1981)

Santa Fe
Citas: Alessio et al. (2005); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Quiroga y Hadad (2004); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Camperi (1989); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán (2006); Brandán y Navarro (2009); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011, 2013); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014)

TORDO GIGANTE *Molothrus oryzivorus* (Gmelin, 1788)

Otros nombres: Boyero grande. Boyero negro grande. Chopí grande. Garrapatero. Tordo negro gigante. Tordo pirata.

DESCRIPCIÓN
Largo: Macho 35 cm, Hembra 28 cm.
Peso: Contreras (1983c): N=2 (M) 205,0 y 213,0 g; Darrieu y Camperi (1994): N= 2 (M) 205,0 y 213,5 g
Coloración. Pico y patas negros. Iris amarillo.
Macho. Negro brillante. Alas y cola negros azulados.
Hembra. Negra opaca.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en grupo. Tiene un canto fuerte.

Alimentación
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Selvas, capueras, plantaciones.

NIDIFICACIÓN

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N		



Especie parásita. Deposita los huevos en nidos de otras aves (*Cacicus* sp.)
Fraga (1996b). Iguazú, Misiones. Se examinaron 33 nidos de Boyero *Cacicus haemorrhous* (de 5 colonias). Se hallaron huevos o pichones del Tordo gigante en 16 nidos. Tenían de 1 a 7 huevos del Tordo por nido parasitado.
Fraga (2011a). Selva atlántica del noreste de Argentina, parasita al Boyero cacique *Cacicus haemorrhous*.
De la Peña (2013c). Puerto Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 12-10-1981, un huevo en nido de *Cacicus haemorrhous.*
Salvador y Bodrati (2014b). Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, 8 a 13 de octubre de 2012, un huevo en nido de Boyero cacique *Cacicus haemorrhous*.

Huevos
Pone 1, ovoidal, blanco. Se puede encontrar más de un huevo por nido parasitado.
Medidas
De la Peña (2013c):33,9 x 24,3 (N= 1)
Salvador y Bodrati (2014b): 32,3 x 23,3 (N= 1)

Peso
De la Peña (2013c): cáscara 0,845 (N= 1)

Otros
Fraga (2011a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

Más información:
Fraga (2011a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Negro. Plumas de los lados del cuello alargadas. Macho con iris anaranjado. Hembra con iris pardo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Molothrus oryzivorus oryzivorus (Gmelin, 1788)en Misiones, norte de Corrientes, Formosa, este de Chaco y Salta.Observado en NE de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Muy extenso rango de distribución desde Méjico hasta Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES

Molothrus oryzivorus oryzivorus (Gmelin, 1788)

Buenos Aires
Citas: Schindler y Reinaudo (2002)

Chaco
Citas: Chebez et al. (1999)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1983c, 1987b); Darrieu y Camperi (1994); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Formosa
Citas: Chebez y Heinonen Fortabat (1987a); Contreras (1987c, 1993b); López Lanús (1997); Ramírez-Llorens et al. (2003); Salvador y Narosky (1987)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Bodrati y Salvador (2015a); Chebez (1996a); De la Peña (1984, 2013c); Fraga (2011a); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Nores e Yzurieta, 1983

TORDO RENEGRIDO *Molothrus bonariensis* (Gmelin, 1788)

Otros nombres: Burrero. Chopín. Güira-hú. Mirlo. Morajú. Morayú. Mulato. Negrillo. Negrito. Negrucho. Renegrido. Tordo. Tordo argentino. Tordo azul. Tordo común. Tordo negro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 20 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 13 X= 61,7 g (Rango 59,0 a 62,0); Contreras (1975): N= 3 (?) X= 59,2 g (Rango 54,0 a 64,0); Contreras (1979f): N= 1(M) 58,3 g; Fraga (1985): N= 27 X= 49,4 g; Contino (1980): 50 g; Mason (1987): N= 69 (M) X= 55,5 g; N= 78 (H) X= 44,9 g; Salvador (1990a): N= 5 (M) X= 57,1 (Rango 53,5 a 59,4) g; Mermoz y Reboreda (1994): N= 21 (M) 55, g; N= 31 (H) 45,6 g; Christie et al. (2004): N= 1 (?) 43,0 g**;** Di Giacomo (2005h): N= 20 (M) X= 50,5 g (Rango 40,0 a 60,0), N= 23 (H) X= 41,9 g (Rango 37,0 a 51,0); Camperi y Darrieu (2005): N= 4 (M) X= 47,4 g (Rango 44,5 a 52,5), N= 5 (H) X= 40,8 g (Rango 37,2 a 46,6)**;** Salvador (2014a): N= 32 (M) X= 57,9 g (Rango 53,5 a 63,6) N= 21 (H) X = 53,6 g (Rango 49,3 a 59,5); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 5 (M) X= 53,8 g (Rango 50,0 a 59,0), N= 3 (H) X= 50,6 (Rango 48,5 a 52,5), N= 18 (M) X= 50,9 g (Rango 44,0 a 57,0), N= 22 (H) X= 39,2 g (Rango 34,5 a 43,0)
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo oscuro.
Macho. Negro con brillo violáceo.
Hembra. Gris pardusca.

COMPORTAMIENTO
Anda en grupos o en bandadas.
Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Semillas de Barabal (*Setaria parviflora*), Brachiaria (*Urochloa plantaginea*), Urocloa (*Urochloa panicoides*), Gramilla (*Cynodon dactylon*), Pasto cuaresma (*Digitaria sanguinalis*)
Marelli (1919). **Vegetales:** Semilla no determinadas.
Aravena (1928).**Vegetales:** Semilla*Hordeum vulgare, Medicago sativa*. **Insectos:**Coleópteros (Elatéridos, Tenebriónidos).
Liebermann (1935). **Insectos:** Langostas.
Zotta (1936g)**Vegetales:** Semilla no determinadas. **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae*).* Lepidópteros. Ortópteros.**Arácnidos:** Arácnidos.**Otros:** Piedritas.
Zotta (1940).**Vegetales:** Semilla no determinadas.
Martínez et al. (1975).**Vegetales:***Erodium* sp., *Medicago lupulina*. **Insectos:**Homoptera (Cicadellidae, Fulgoridae).Lepidoptera.
Dahlem (1994).**Vegetales:**Semilla*Zea mays*.
Haro (1998).**Insectos:** Coleoptera (Curculionidae).
Isacch (2002). **Vegetales:** Néctar *Phormium tenax.*
De la Peña y Pensiero (2003).**Vegetales:** Fruto*Morus alba*.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semilla Avena sativa, *Gramíneas, Panicum mileaceum, Sorghum halepense, Sorghum* sp.*Triticum aestivum*. **Insectos:**Coleoptera (Curculionidae, Elateridae, Scarabaeidae). Hemiptera. Lepidoptera (orugas). Orthoptera (Acridiidae, Gryllidae, Tettigonidae).**Aves:**Huevos.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semilla *Panicum maximum.*
De la Peña (2010). **Vegetales:** Semilla *Helianthus annuus*, *Setaria itálica, Sorghum halepense, Sorghum* sp., *Zea mays.* Fruto*Morus alba.***Insectos:**Grillo (*Grillus argentinus*), Langostas. **Otros:** Pan.
Salvador (2013e). **Insectos:** ormigas Isaú (*Atta vollenweideri*).
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.



Voces
Straneck (*in litt*.). La vocalización es muy variada, una voz está compuesta por agudos silbos y gorjeos, Tsietsietyio . glüpipih ...
HÁBITAT
Praderas, sabanas, bosques, bañados, parques, poblaciones.
NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos parasitados en Mendoza, Formosa, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Los huevos son ovoidales o redondeados. El color de base es variable: blanquecino, blanco, celeste, verdoso, rosado u ocre, con pintas y manchitas castañas, grises, pardas, distribuidas por toda la superficie, a veces más concentradas en el polo mayor. Algunos huevos son enteramente blancos.

Wilson (1979). Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes, parasita a *Empidonomus aurantiatrocristatus, Tyrannus savana, Pitangus sulphuratus, Tyrannus melancholicus, Mimus saturninus, Pseudoleistes virescens, Troglodytes aedon, Paroaria coronata, Furnarius rufus y Pitangus sulphuratus.*
Contreras (1980o). Río Papagayo, dpto. Capital, Mendoza, 03-11-1974, parasitando a *Pseudoseisura gutturalis*.
Contreras (1980o). Gustavo André, dpto. Lavalle, Mendoza, diciembre de 1975, parasitando a *Coryphistera alaudina*.
Salvador (1984c). Villa maría, dpto. Gral. San Martín, Córdoba, parasitando a *Mimus saturninus*.
Beltzer (1986a). Río Colastiné, dpto. La Capital, Santa Fe, 18-12-1986, nido de Boyero negro (*Cacicus solitarius*)
con un huevo de *Molothrus bonariensis.*
Di Giacomo y Aguilar (1987). Hudson, pdo. Verazategui, Buenos Aires, pareja de adultos de *Donacospiza albifrons* seguida por un pichón de *Molothrus bonariensis*.
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando.
Babarskas y López Lanús (1993). Ramallo, pdo. Ramallo, Buenos Aires, 09-12-1989, huevo en nido de *Certhiaxis cinnamomeus*; 09-12-1990, huevo en un nido de *Agelasticus cyanopus.*
Alabarce y Antelo (1998). Tucumán, parasitando a *Chrysomus ruficapillus.*
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, parasita en la zona.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, parasita a: *Synallaxis spixi, Limnoctites rectirostris, Zonotrichia capensis, Agelaius thilius y Pseudoleistes virescens.*
Christie et al. (2004). Huevos en noviembre-diciembre.
Di Giacomo (2005h).Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre setiembre y enero.
Fiorini et al. (2005a). Departamento Guaymayén, Mendoza, parasitando a *Turdus amaurochalinus*.
Fiorini et al. (2005a). Reserva Privada de Flora y Fauna Autóctona "El Destino", pdo. Magdalena, Buenos Aires, parasitando a *Troglodytes aedon* y a *Mimus suturninus*.
Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, Córdoba, se localizaron 22 nidos parasitados.
De la Peña (2013c). Total de nidos parasitados: 197, 4 en Córdoba, 1 en Corrientes, 1 en Entre Ríos, 1 en Catamarca, el resto en provincia de Santa Fe.

Especie hospedante y número de nidos parasitados

Especie hospedante	Nº	Especie hospedante	Nº	Especie hospedante	Nº
Mimus saturninus	32	*Coryphospingus cucullatus*	3	*Turdus rufiventris*	1
Agelaius ruficapillus	13	*Agelaius cyanopus*	3	*Anthus correndera*	1
Polioptila dumicola	12	*Molothrus badius*	3	*Geothlypis aequinoctialis*	1
Furnarius rufus	12	*Pitangus sulphuratus*	3	*Thraupis sayaca*	1
Taraba major	10	*Machetornis rixosus*	3	*Saltator aurantiirostris*	1
Turdus amaurochalinus	10	*Troglodytes aedon*	2	*Saltator coerulescens*	1
Fluvicola albiventer	8	*Embernagra platensis*	2	*Poospiza torquata*	1
Icterus pyrrhopterus	7	*Vireo olivaceus*	2	*Poospiza whitii*	1
Saltatricula multicolor	4	*Paroaria coronata*	2	*Sporophila caerulescens*	1
Griseotyrannus aurantioatrocristatus	4	*Guira guira*	1	*Donacospiza albifrons*	1
Cacicus chrysopterus	4	*Colaptes melanochloros*	1	*Sicalis luteola*	1
Zonotrichia capensis	4	*Phacellodomus ruber*	1	*Sicalis flaveola*	1
Poospiza melanoleuca	4	*Asthenes baeri*	1	*Paroaria capitata*	1
Phacellodomus striaticollis	3	*Fluvicola leucocephala*	1	*Catamenia analis*	1
Poospiza nigrorufa	3	*Pachyramphus polychopterus*	1	*Ammodramus humeralis*	1
Pseudoleistes virescens	3	*Pseudocolopteryx flaviventris*	1	*Agelaius thilius*	1
Satrapa icterophrys	3	*Myiarchus ferox*	1	*Sturnella superciliaris*	1
Turdus chiguanco	3	*Xolmis irupero*	1	*Sturnella loyca*	1
Tyrannus melancholicus	3	*Myiodynastes maculatus*	1		
Tyrannus savana	3	*Progne tapera*	1		

Total de especies hospedantes: 58

Huevos
Ovoidales o redondeados. Color de base variable: blanquecino, blanco, celeste, verdoso, rosado u ocre, con pintas y manchitas muy variables, castañas, grises, pardas, distribuidas por toda la superficie, a veces más concentradas en el polo mayor. Algunos huevos son enteramente blancos.




Medidas
Zapata y Cabrera (1969): 24,0 a 26,7 x 19,1 a 20,0 X= 24,8 x 19,5 (N= 4)
Beltzer (1986a): 27,0 x 21,0
Babarskas y López Lanús (1993): 22,2 x 18,3, 22,3 x 18,0, 22,3 x 18,3, 24,1 x 19,0
Salvador y Salvador (2012):22,7 a 25,8 x 18,3 a 20,2 X= 23,9 x 18, (N= 26)
Di Giacomo (2005h): 20,3 a 26,5 x 17,1 a 21,3 X= 23,8 x 19,5 (N= 226)
De la Peña (2013c): 21,5 a 27,8 x 18 a 22,6 X= 24,0 x 20,7 (N= 166)

Peso
Zapata y Cabrera (1969): 3 (N= 1)
Di Giacomo (2005h): 3,3 a 5,8 X= 4,7 (N= 204)
Salvador y Salvador (2012):3,8 a 5,2 X= 4, 2 (N= 18)
De la Peña (2013c): 3,7 a 6,6 X= 4,8 (N=48)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,220 a 0,520 X= 0,388 (N= 138)

Medidas
Hartert y Venturi (1909):
Smyth (1928): 20,5 a 27,0 x 17,0 a 20,5
Pereyra (1938b):23,0 x 18,0

PICHONES

Descripción.
Nacen con los ojos cerrados. Pico amarillento o verdoso amarillento. Piel verdosa. Comisura amarilla. Interior de la cavidad bucal rojo pálido. Anterior del paladar amarillento. Escaso plumón gris.
2 días
Ojos cerrados. Escaso plumón fino gris.Grita.
Piel clara, verdosa. Comisura amarilla. Pico verdoso-amarillento. Cavidad bucal rojiza. Anterior del paladar amarillento.
3 días
Ojos cerrados. Aparecen las vainas en las zonas ptéridas.
4 días
Ojos abiertos. Marrones. Piel casi desnuda. Escaso plumón grisáceo
5 días
Lados del pecho y abdomen, con vainas grises. Plumón en la cabeza gris oscuro. Vainas de las alas, grises. Apenas se ven las vainas de las plumas de la cola, el resto del cuerpo con piel desnuda.
6 días
Escaso plumón en la cabeza.. Abriendo las láminas en las zonas ptéridas.

8 días
Dorsal pardo jaspeado de ocráceo. Pecho blanquecino jaspeado de pardo.Abdomen blanquecino.
Láminas de las plumas alares, pardas. Secundarias y cubiertas alares, con las barbas externas ocráceas.
Cola con cañones cortos, las láminas chicas pardas y ocráceas.
12 días
Color de adulto.
Grita. Se escapa del nido.

Generalidades

Di Giacomo (2005h). El período de incubación es de 12 a 13 días. Los pichones permanecen en el nido entre 12 y 15 días.
De la Peña (2013c). Período de incubación de 12 a 13 días. Permanencia de los pichones en el nido de 14 a 15 días.


Jesús María.Córdoba.23-03-2012


Esperanza.Santa Fe.11-05-2007


.Esperanza.Santa Fe.12-07-2008


Esperanza.Santa Fe.27-09-2009



Esperanza.Santa Fe.30-04-2008



Esperanza.Santa Fe.03-12-2008



Esperanza.Santa Fe. 20-03-2015



Esperanza.Santa Fe.20-09-2007

Otros
Pereyra (1937c)**.**Un ejemplar con Albinismo parcial.

Urcola (2011). Un ejemplar Albino.
Fraga (1984).Couri et al (2005) Rabuffetti y Reboreda (2007) Pautasso en Mastropaolo (2007). Turienzo y Di Iorio (2010). Antoniazzi et al. (2011); De la Peña y Salvador en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

Más información:
Fraga (1978, 1979d, 1982, 1983c, 1995).Salvador (1984c). Mermoz y Reboreda (1993, 1995b, 1996).Sackmann y Rebored (1996).Mermoz y Fernández (2000, 2003).Reboreda et al. (2003). Fiorini et al. (2005a, 2005b). Tuero et al. (2012).
Éxito reproductivo del Tordo renegrido (*Molothrus bonariensis*) en hospedadores de distinto tamaño corporal. Hornero 20 (2): 173-182.

ESPECIES PARASITADAS
(157 especies parasitadas)

Familia Columbidae
Torcaza (*Zenaida auriculata*)
Friedmann et al. (1977); Contreras (1980o)

Torcacita común (*Columbina picui*)
Contreras (1980o)

Familia Cuculidae
Cuclillo canela (*Coccyzus melacoryphus*)
Salvador y Bodrati (2011)

Pirincho (*Guira guira*)
De la Peña (2013c)

Familia Picidae
Carpintero real (*Colaptes melanochloros*)
De la Peña (2013c)

Carpintero campestre (*Colaptes campestris*)
Salvador y Bodrati (2014a)

Familia Thamnophilidae
Chororó (*Taraba major*)
Friedmann (1929); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Choca listada (*Thamnophilus doliatus*)
Di Giacomo (1998b)

Choca de corona rojiza (*Thamnophilus ruficapillus*)
Pereyra (1933b); Fraga y Narosky (1985)

Choca común (*Thamnophilus caerulescens*)
Friedmann et al. (1977); Salvador y Salvador (1984); Fraga y Narosky (1985); Salvador y Bodrati (2014a).

Rhinocryptidae
Gallito copetón (*Rhinocrypta lanceolata*)
Wetmore (1926b); Salvador y Bodrati (2014a)

Familia Furnariidae

Chinchero grande (*Drymornis bridgesii*)
Salvador y Bodrati (2014a)

Bandurrita chaqueña (*Tarphonomus certhioides*)
Salvador y Bodrati (2014a)

Hornero (*Furnarius rufus*)
Gibson (1880a); Miller (1917); Wetmore (1926b); Smyth (1928); Friedmann (1929); Höy y Ottow (1964); Herman y Meise (1965); Salvador (1983b); Salvador y Salvador (1984); Mason (1986); Di Giacomo (2005h); De Mársico et al. (2010b); Turienzo y Di Iorio (2010); Salvador (2012f); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Hornerito copetón (*Furnarius cristatus*)
Friedmann (1929); Salvador y Bodrati (2014a)

Junquero (*Phleocryptes melanops*)
Friedmann et al. (1977)

Pajonalera de pico curvo (*Limnornis curvirostris*)
Narosky et al. (1983)

Remolinera chocolate (*Cinclodes olrogi*)
Miatello et al. (1999); Salvador y Bodrati (2014a)

Remolinera castaña (*Cinclodes atacamensis*)
Miatello et al. (1999)

Coludito copetón (*Leptasthenura platensis*)
Salvador (2011c)

Coludito de cola negra (*Leptasthenura aegithaloides*)
Gibson (1880a); Salvador y Bodrati (2011)

Espinero de frente rojiza (*Phacellodomus rufifrons*)
Friedmann et al. (1977)

Espinero chico (*Phacellodomus sibilatrix*)
Friedmann et al. (1977); Narosky et al. (1983); Salvador (2012f); Salvador y Bodrati (2014a); Salvador y Bodrati (2014a)

Espinero andino (*Phacellodomus striaticeps*)
Friedmann et al. (1977)

Espinero de pecho manchado (*Phacellodomus striaticollis*)
Pereyra (MACN); Mason (1986); Salvador (2011c); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Espinero grande (*Phacellodomus ruber*)
De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Leñatero (*Anumbius annumbi*)
Castellanos (1934); Delhey et al. (2010); Salvador y Bodrati (2014a)

Crestudo (*Coryphistera alaudina*)
Contreras (1980o); Salvador y Bodrati (2014a); Salvador y Bodrati (2014a)

Canastero rojizo (*Asthenes dorbignyi*)
Narosky et al. (1983); Salvador (2012f)

Canastero chaqueño (*Asthenes baeri*)
Höy y Ottow (1964); Narosky et al. (1983); Salvador y Salvador (1984); Salvador (2011c); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Canastero pampeano (*Asthenes hudsoni*)
Grant (1911c)

Espartillero serrano (*Asthenes sclateri*)
Narosky et al. (1983); Salvador y Salvador (2012)

Espartillero coludo (*Asthenes pyrrholeuca*)
Salvador y Salvador (1984); Salvador (2012f)

Pajonalera de pico recto (*Limnoctites rectirostris*)
López Lanús et al. (1999); Babarskas et a. (2003)

Curutié ocráceo (*Cranioleuca sulphurifera*)
Darrieu et al. (1988)

Curutié blanco (*Cranioleuca pyrrhophia*)
Höy y Ottow (1964); Höy (1971); Narosky et al. (1983); Salvador (2011c)

Canastero patagónico (*Pseudasthenes patagonica*)
Narosky et al. (1983)

Cacholote pardo (*Pseudoseisura gutturalis*)
Contreras (1980o)

Chotoy (*Schoeniophylax phryganophius*)
Salvador y Bodrati (2014a)

Curutié colorado (*Certhiaxis cinnamomeus*)
Babarskas y López Lanús (1993)
Pijuí plomizo (*Synallaxis spixi*)
Pereyra (1927c); Fraga y Narosky (1985); Darrieu et al. (1988); Babarskas et a. (2003)

Pijuí de cola parda (*Synallaxis albescens*)
Goodall (1923); Salvador y Salvador (1984); Salvador y Bodrati (2014a)

Pijuí de frente gris (*Synallaxis frontalis*)
Salvador y Bodrati (2014a)

Familia Tyrannidae

Fiofío silbón (*Elaenia albiceps*)
Reed (1913); Friedmann (1931)

Fiofío de pico corto (*Elaenia parvirostris*)
Narosky y Salvador (1998); Salvador (2011c); Salvador y Bodrati (2014a)

Fiofío grande (*Elaenia spectabilis*)
Salvador y Bodrati (2014a)

Suiriri común (*Suiriri suiriri*)

Friedmann (1927); Friedmann et al. (1977); Narosky y Salvador (1998); Babarskas et al. (2003); Salvador y Bodrati (2014a); Salvador y Bodrati (2014a)

Piojito común (*Serpophaga subcristata*)
Hudson (1974); Salvador (2012f)

Doradito común (*Pseudocolopteryx flaviventris*)
Darrieu et al. (1988); De la Peña (2013c)

Calandrita (*Stigmatura budytoides*)
Salvador y Bodrati (2014a)

Suiriri de pico corto (*Sublegatus modestus*)
Salvador y Bodrati (2014a)

Tachurí sietecolores (*Tachuris rubrigastra*)
Contreras (1977b)

Picochato grande (*Tolmomyias sulphurescens*)
Salvador y Bodrati (2014a)

Mosqueta estriada (*Myiophobus fasciatus*)
Friedmann (1927); Friedmann (1931); Darrieu et al. (1988)

Churrinche (*Pyrocephalus rubinus*)
Goodall (1923)

Viudita plomiza (*Knipolegus cabanisi*)
Friedman (1929)

Pico de Plata (*Hymenops perspicillatus*)
Gibson (1880a); Narosky y Salvador (1998); Pretelli e Isacch (2013); Salvador y Salvador (2012)

Suiriri amarillo (*Satrapa icterophrys*)
Smyth (1928); Friedmann (1929); Salvador y Salvador (1984); Mason (1986); Narosky y Salvador (1998); Babarskas et al. (2003); Salvador (2011c); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Dormilona gris (*Muscisaxixola rufivertex*)
Salvado y Narosky (1983)

Gaucho común (*Agriornis micropterus*)
Narosky y Salvador (1998)

Monjita blanca (*Xolmis irupero*)
Smyth (1928); Friedmann (1929), Höy y Ottow (1964); Narosky y Salvador (1998); Salvador (2011c); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Viudita bllanca (*Fluvicola albiventer*)
Miller (1917); Friedman (1929); Salvador y Salvador (1984); Salvador (2012f); De la Peña (2013c)

Lavandera (*Arundinicola leucocephala*)

De la Peña (2013c)

Picabuey (*Machetornis rixosus*)
Goodall (1923); Friedmann (1929); Fraga (1983c); Salvador (1983b); Salvador y Salvador (1984); Mason (1986); Narosky y Salvador (1998); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a); Salvador y Bodrati (2014a)

Benteveo común (*Pitangus sulphuratus*)
Redd (1913); Friedmann (1927); Castellanos (1933); Wilson (1979); Contreras (1980o); Salvador (1983b); Salvador y Salvador (1984); Narosky y Salvador (1998); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Benteveo rayado (*Myiodynastes maculatus*)
Friedmann (1927); Friedmann (1929); Di Giacomo (2005h); Salvador (2011c); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Pitanguá (*Megarhynchus pitangua*)
Salvador y Bodrati (2014a)

Tuquito rayado (*Empidonomus varius*)
Salvador y Bodrati (2014a)

Tuquito gris (*Empidonomus aurantioatrocristatus*)
Barrows (1883); Friedmann (1927); Wilson (1979); Salvador y Salvador (1984); Narosky y Salvador (1998); Salvador (2011c); Salvador (2012f); De la Peña (2013c)

Suiriri real (*Tyrannus melancholicus*)
Holland (1890); Smyth (1928); Friedmann (1927); Friedmann (1929); Friedmann et al. (1977); Wilson (1977); Fraga (1983c); Narosky y Salvador (1998); Pautasso (2002b); Salvador (2011c); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Tijereta (*Tyrannus savana*)
Hudson (1870, 1874); Gibson (1880a); Holland (1890); Goodall (1923); Smyth (1928); Friedmann (1927); Castellanos (1934); Wilson (1979); Fraga (1983c); Salvador y Salvador (1984); Salvador (1983b); Mason (1986); Narosky y Salvador (1998); Pautasso (2002b); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Burlisto de pico canela (*Myiarchus swainsoni*)
Salvador (2012f)

Burlisto de pico negro (*Myiarchus ferox*)
De la Peña (2013c)

Burlisto de cola castaña (*Myiarchus tyrannulus*)
Lanyon (1978); Salvador y Bodrati (2014a)

Familia Cotingidae
Cortarramas (*Phytotoma rutila*)
Friedmann et al. (1977)

Familia Tityridae
Tijerilla (*Xenopsaris albinucha*)
Friedman (1929)

Anambé común (*Pachyramphus polychopterus*)
Pereyra (1938b); Fraga y Narosky (1985); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Familia Vireonidae
Juan Chiviro (*Cyclarhis gujanensis*)
Friedmann (1929); Narosky (1975); Salvador y Bodrati (2014a)

Chiví común (*Vireo olivaceus*)
Hartert y Venturi (1909); Pereyra (1933b); Salvador (2011c); Salvador (2012f); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Familia Hirundinidae
Golodrina parda (*Progne tapera.*)
Gibson (1880a); Castellanos (1934); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Golobdrina de cejas blancas (*Tachycineta leucorrhoa*)
Friedmann (1929); Fraga y Narosky (1985); Massoni et al. (2006)

Golondrina tijerita (*Hirundo rustica*)
Idoeta et al. (2011); Sánchez y Solis Fieg (2012)

Familia Troglodytidae
Ratona común (*Troglodytes aedon*)
Gibson (1880a); Hudson (1874); Smyth (1928); Wilson (1979); Fraga (1983c); Mason (1986); Darrieu et al. (1988); Tuero et al. (2007); Fiorini et al. (2011); Castellanos (1934); Salvador (2011c); Salvador (2012f); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Familia Polioptilidae

Tacuarita azul **(***Polioptila dumicola***)**
Hudson (1874); Salvador (1983b); Salvador y Salvador (1984); Fraga (2002); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Familia Turdidae

Zorzal patagónico (*Turdus flacklandii*)
Salvador (2012f)

Zorzal sabiá (*Turdus leucomelas.*)
Fraga (2002); Salvador y Bodrati (2011); Salvador (2012f)

Zorzal colorado (*Turdus rufiventris*)
Gibson (1880a); Wetmore (1926); Smyth (1928); Friedmann (1929); Fraga (1983c); Friedmann et al. (1977); Mason (1986); Darrieu et al. (1988); Lichtenstein (1998); Sackmann y Reboreda (2003); Giacomo (2005h); Salvador y Bodrati (2011); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Zorzal chalchalero (*Turdus amaurochalinus*)
Barrows (1883); Smyth (1928); Friedmann (1929); Friedmann et al. (1977); Salvador y Salvador (1984); Mason (1986); Fiorini et al. (2005a); Astié y Reboreda (2005, 2006); Salvador (2011c); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Zorzal plomizo (*Turdus nigriceps*)
Friedmann (1929)

Zorzal chiguanco (*Turdus chiguanco*)
Castellanos (1934); Salvador y Salvador (1984); Salvador 2012f); Tabares y Peluc (2013); De la Peña (2013c)

Familia Mimidae

Tenca (*Mimus thenca*)
Matarasso y Seró López (2008)

Calandria mora (*Mimus patagonicus*)
Reed (1913); Friedmann (1929); Renard (1933); Nores e Yzurieta(1975); Friedmann et al. (1977); Friedmann et al. (1977); Salvador y Salvador (1984); Salvador y Bodrati (2011)

Calandria grande (*Mimus saturninus*)
Hudson (1874); Barrows (1883); Miller (1917); Dinelli (1918b); Smyth (1928); Friedmann (1929); Friedmann et al. (1977); Wilson (1979); Fraga (1983c); Salvador y Salvador (1984); Mason (1986); Darrieu et al. (1988); Maceda et al. (2001); Di Giacomo (2005h); FioriniyReboreda (2006); Rabuffetti y Reboreda (2007); Salvador (2012f); Salvador y Bodrati (2011); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Calandria real (*Mimus triurus*)
Reed (1913); Goodal (1923); Wetmore (1916a); Pereyra (1937b)

Calandria castaña (*Mimus dorsalis*)
Dinelli (1918b); Fraga (2005c); Salvador y Bodrati (2011)

Familia Motacillidae
Cachilra chica (*Anthuslutescens*)
Friedmann (1929)

Cachirla de uña corta (*Anthus furcatus*)
Salvador (2012f)

Cachirla común (*Anthus correndera*)
Hudson (1870); Reed (1913); Smyth (1928); Darrieu et al. (1988); Salvador (2011c); De la Peña (2013c)

Familia Thraupidae
Cardenal común (*Paroaria coronata*)
Smyth (1928); Friedmann (1929); Wilson (1979); De la Peña (2013c)

Cardenilla (*Paroaria capitata*)
Di Giacomo (2005h); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Tangará gris (*Thlypopsis sordida*)
Friedmann (1929)

Frutero negro (*Tachyphonus rufus*)
Salvador y Bodrati (2014a)

Saíra de antifaz (*Pipraeidea melanonota*)
Castelino (1985)

Naranjero (*Pipraeidea bonariensis*)
Miller (1917); Höy y Ottow (1964); Salvador (2012f)

Celestino común (*Thraupis sayaca*)
Friedmann (1929); Friedmann et al. (1977); De la Peña (2013c)

Celestino oliváceo (*Thraupis palmarum*)
Chebez (2009)

Comesebo de cabeza negra (*Phrygilus atriceps*)
Salvador y Bodrati (2011)

Yal plomizo (*Phrygilus unicolor*)
Salvador y Salvador (2012)

Yal chico (*Phrygilus plebejus*)
Salvador y Bodrati (2011)

Diuca común (*Diuca diuca*)
Reed (1913); Mendoza. (1923); Wetmore (1926a); Friedmann et al. (1977); Salvador y Salvador (1984); Fraga (2002); Mezquida (2003); Salvador (2012f)

Cachilo canela (*Donacospiza albifrons*)
Di Giacomo y Aguilar (1987); Darrieu et al. (1988); De la Peña (2013c)

Sietevestidos (*Poospiza nigrorufa*)
Gibson (1918); Pereyra (1937b); Friedmann et al. (1977); Darrieu et al. (1988); Pautasso (2002b); De la Peña (2013c)

Siete vestidos serrano (*Poospiza whitii*)
Miller (1917); De la Peña (2013c)

Monterita litoraleña (*Poospiza cabanisi*)
Pereyra (1933b)

Monterita de collar (*Poospiza torquata*)
Masramón (1962); Friedmann et al. (1977); De la Peña (2013c)

Monterita de cabeza negra (*Poospiza melanoleuca*)
Miller (1917); Friedmann (1929); Höy y Ottow (1964); Masramón (1980); Salvador y Salvador (1984); Di Giacomo(2005h); Salvador (2011c); De la Peña (2013c)

Jilguero grande (*Sicalis auriventris*)
Reed (1913)

Jilguero dorado (*Sicalis flaveola*)
Smyth (1928); Friedmann (1929); Höy y Ottow (1964); Friemann et al. (1977); Contreras (1980o); Mason (1986); Salvador y Bodrati (2011); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Misto (*Sicalis luteola*)
Smyth (1928); Friedmann et al. (1977); Salvador (1983); Salvador y Salvador (1984); Darrieu et al. (1988); Cozzani y Zalba (2009); De la Peña (2013c)

Coludo grande (*Emberizoides herbicola*)
Salvador y Bodrati (2014a)

Verdón (*Embernagra platensis*)
Goodall (1923); Smyth (1928); Friedmann (1931, 1977); Höy y Ottow (1964); Di Giacomo (2005h); Salvador (2011c); Salvador (2012f); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Volatinero (*Volatinia jacarina*)
Salvador y Bodrati (2014a)

Corbatita overo (*Sporophila lineola*)
Friedmann et al. (1977).

Corbatita comúnro (*Sporophila caerulescens*)
Hudson (1874); Friedmann (1929); Salvador (2011c); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Piquitodeoro común (*Catamenia analis*)
De la Peña (2013c)

Brasita de fuego (*Coryphospingus cucullatus*)
Höy y Ottow (1964); Fraga (2002); Salvador y Bodrati (2011); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*)
Domínguez et al. (2013)

Familia Emberizidae
Chingolo (*Zonotrichia capensis*)
Hudson (1870); Barrows (1883); Gibson (1880a); Reed (1913); Miller (1917); Goodall (1923); Dinelli (1924); Renard (1933); Castellanos (1934); King (1973); Fraga (1978, 1983); Contreras (1980o); Salvador (1983b); Salvador y Salvador (1984); Mason (1986); Darrieu et al. (1988; Maceda et al. (2001); Pautasso (2002); Babarskas et al. (2003); Fernández y Duré Ruiz (2007); Cozzani y Zalba (2009); Salvador y Bodrati (2011); Salvador (2012f); De la Peña (2013c)

Cachilo de cejas amarillas (*Ammodramus humeralis*)
Goodall (1923); Dinelli (1924); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2014a)

Cachilo de corona castaña (*Rhynchospiza strigiceps*)
Friedmann (1963)

Cerquero de collar (*Arremon flavirostris*)
Friedmann et al. (1977)

Cerquero amarillo (*Atlapetescitrinellus*)
Friedmann (1929); Capllonch et al. (2014b)

Familia Cardinalidae
Fueguero común (*Piranga flava*)
Di Giacomo (2005h)

Rey del bosque (*Pheucticus aureoventris*)
Friedmann (1929)

Reinamora grande (*Cyanocompsa brissonii*)
Friedmann (1929); Friedmann et al. (1977)

Pepitero gris (*Saltator coerulescens*)
Dinelli (1924); Smyth (1928); Friedmann (1929); Di Giacomo (2005h); Salvador (2012f); De la Peña (2013c)

Pepitero verdoso (*Saltator similis*)
Salvador y Bodrati (2014a)

Pepitero de collar (*Saltator aurantiirostris*)
Reed (1913); Smyth (1928); Friedmann (1929); Friedmann (1929); Dinelli (1937); Salvador y Bodrati (2014a); De la Peña (2013c)

Pepitero chico (*Saltatricula multicolor*)
Smyth (1928); Höy y Ottow (1964); Salvador y Salvador (1984); Salvador (2012f); De la Peña (2013c)

Familia Parulidae

Arañero de cara negra (*Geothlypis aequinoctialis*)
Miller (1917); Friedmann (1929); Salvador y Salvador (1984); Darrieu et al. (1988); De la Peña (2013c)

Arañero coronado chico (*Basileuterus culicivorus*)
Salvador y Bodrati (2014a)

Familia Icteridae
Boyero negro (*Cacicus solitarius*)
Beltzer (1986a); Di Giacomo (2005h)

Boyero de alas amarillas (*Cacicus chrysopterus*)
Di Giacomo (2005h); Bodrati y Fraga (2010); De la Peña (2013c)

Boyereito (*Icterus pyrrhopterus*)
Di Giacomo (2005h); Salvador (2012f); De la Peña (2013c)

Federal (*Amblyramphus holosericeus*)
Friedmann (1931); Mermoz y Fernández (1999b); Fernández y Mermoz (2000); Salvador (2012f)

Varillero negro (*Chrysomus cyanopus*)
De la Peña (2013c)

Varillero de alas amarillas (*Agelasticus thilius*)
Smyth (1928); Friedmann (1929); Friedmann et al. (1977); Fraga (1983c, 2002); Darrieu et al. (1988); Massoni y Reboreda (1998); Babarskas et al. (2003); De la Peña (2013c)



Varillero congo (*Chrysomus ruficapillus*)
Smyth (1928); Friedmann (1929); Höy y Ottow (1964); Klimaitis (1973); Friedmann et al. (1977); Fraga (1983c); Salvador (1983b); Blanco (1995); Lyon (1997); Alabarce y Antelo (1998); Di Giacomo (2005h); De la Peña (2013c)

Tordo amarillo (*Xanthopsar flavus*)
Goodall (1923) ; Smyth (1928) ; Fraga et al. (1998); Fraga (2002)

Pecho amarillo común (*Pseudoleistes virescens.*)
Hudson (1870 y 1874); Gibson (1880a); Goodall (1923); Smyth (1928); Friedmann et al. (1977); Wilson (1979); Mermoz y Reboreda (1994); Darrieu et al. (1988); Fraga (2002); Mermoz y Reboreda (2003); Babarskas et al. (2003); Cozzani y Zalba (2009); De la Peña (2013c)

Tordo músico (*Agelaioides badius*)
Miller (1917); Friedmann (1929); Mason (1986); Salvador (1983b); Salvador y Salvador (1984); De Mársico et al. (2010a); Gantchoff et al (2011); De la Peña (2013c)

Pecho colorado (*Sturnella superciliaris*)
Pereyra (1933b); Fraga (1983c, 2002); De Márdico et al. (2010b); Salvador (2011c); De la Peña (2013c)

Loica pampeana (*Sturnella defilippii*)
Withington (1888); Smyth (1928)

Loica común(*Sturnella loyca*)
Reed (1913); Friedmann et al. 1977); Gochfeld (1979a); Salvador y Salvador (1984); Salvador y Salvador (1988); Miatello et al. (1999); Fraga (2002); Cozzani y Zalba (2009); Salvador (2012f); Salvador y Salvador (2012); De la Peña (2013c); Salvador y Bodrati (2011, 2014)

Familia Fringillidae
Cabecitanegra común (*Sporagra magellanica*)
Hudson (1870); Gibson (1880a); Friedmann (1977); Contreras (1980o); Salvador y Bodrati (2014a)

Cabecitanegra austral (*Sporagra barbata*)
Astié (2003)

Familia Passeridae

Gorrión (*Passer domesticus*)
Salvador (1983b); Salvador y Salvador (1984); Salvador y Bodrati (2014a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: negro violáceo. Hembra: gris pardusca.
Diferenciar el macho del Tordo pico corto.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Molothrus bonariensis bonariensis desde el norte del país hasta Santa Cruz. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Siete subespecies. Extensa área de distribución que abarca Islas del Caribe y toda Sud América. Comprende: Cuba, Barbados, Puerto Rico, Grenada, Antigua y Barbuda, Haití, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES

Molothrus bonariensis bonariensis (Gmelin, 1788)

Buenos Aires
Citas: Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Codesido et al. (2011); Dabbene (1919b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Fraga (1978, 1986); Isacch et al. (2006); Isacch y Martínez (2001); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2004, 2004b, 2006, 2011b); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012, 2014); Montaldo y Claver (1986); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Salvador y Di Giacomo (2014); Soave et al. (1999); Weller (1967); White (1882); Zapata (1998); Zuberbhüler (1971)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, dpto. Tres Arroyos, 07-02-1976)

Catamarca
Citas: Camperi (1989); Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 13-03-1981)

Chaco
Citas: Bodrati y Fraga (2010); Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005); Moschione y Bishels (2004)
Observaciones: De la Peña (Cerrito, dpto. Bermejo, 27-08-1987)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977c); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Gaiman, dpto. Gaiman, 30-11-2000)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Castellanos (1934); De la Peña (2013c); Haro (1998); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Lucero, M. M (1982); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Ordano (1996); Partridge (1953c); Salvador, S. A. (1983, 1990a, 2013e); Salvador y Bodrati (2013a); Salvador y Salvador (2012); Straneck (1990b); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)
Observaciones: De la Peña (Ascochinga, dpto. Colón, 29-11-2909; Jesús María, dpto. Colón, 19-01-2010)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1994); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918); Wilson (1977)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Bodrati y Salvador (2015a); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2005, 2012); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002, 2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Salvador y Bodrati (2013a); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009) ; Brandán y Antelo (2001); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Fraga (2005c); Fiora (1934); Moschione y Segovia (2005)
Observaciones: De la Peña (San Salvador de Jujuy, dpto. Capital, 01-02-1977)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler (1984); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)
Observaciones: De la Peña (Puelches, dpto. Curá Co, 28-11-1998)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895)

Mendoza
Citas: Astié (2003); Astié y Reboreda (2005, 2006, 2009a, 2009b); lendinger y Alvarez (2002); Contreras (1979g, 1980o); Contreras y Fernández (1980); Darrieu y Segura (2015); Gómez (2006); López de Casenave (2001); López de Casenave y Marone (1996); Lucero (2013f); Marone (1992a); Mezquida (2001a, 2002, 2003); Milesi et al. (2002); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d); Wetmore (1926b)
Observaciones: De la Peña (San Rafael, dpto. San Rafael, 13-10-04 ; Malargüe, dpto. Malargüe, 14-10-2004)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Chebez (1996a); Fraga (2002); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 12-10-1981)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Christie et al. (1988); Christie et al. (2004); Contreras (1975, 1976, 1977b); Funes y Sheridan en Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b)
Observaciones: De la Peña (Neuquén, dpto. Confluencia, 20-11-1998)

Río Negro
Citas:Camperi (1998); Camperi y Darrieu (2005); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (1998, 2004); Daciuk (1977c); Gelain (2001, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Hecker y Vidoz (1998); Llanos et al. (2005, 2011); Lucero(1982); Pérezy Petracci (1998); Peters (1923b)
Observaciones: De la Peña (Viedma, dpto. Adolfo Alsina, 03-11-1979; Sierra Grande, dpto. San Antonio, 26-11-2000)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Höy y Ottow (1964); Miller (1917); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (Salta, dpto. La Capital, 30-01-1977)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Camperi y Darrieu (2004); Gelain (2008a, 2014a); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz y Murúa (1994)

San Luis
Citas: Casares (1944); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)
Observaciones: De la Peña (Mercedes, dpto. Gral. Pedernera, 10-01-1982; Bearley, dpto. La Capital, 16-10-2004)

Santa Cruz
Citas: Burmeister (1890); Chebez et al. (1998); Falcone en Darrieu et al. (2009); Imberti (2003, 2005); Roesler et al. (2014)

Santa Fe
Citas: Antoniazzi et al. (2011); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2001, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Quiroga y Hadad (2004); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Selva, dpto. Rivadavia, 29-01-1977)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Antelo y Brandán (2006); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007); Capllonch y Aráoz (2007); Echevarría et al. (2008c, 2011b); Handford (1983); Lucero (1983) ; Luceroet al. (2002); Malizia et al. (1998); Ortiz et al. (2011, 2013); Ortiz y Aráoz (2014)
Soria et al. (2010)

Observaciones: De la Peña (San Miguel de Tucumán, dpto. Capital, 30-01-1977)

Islas Malvinas
Citas:Woods (2006)

PECHO COLORADO *Sturnella superciliaris* (Bonaparte, 1850)

Otros nombres: Carpecho. Güirá-yurú. Juan soldado. Loica argentina. Pechito colorado. Pecho. Pecho colorado alfalfero. Pecho colorado chico. Pecho colorado de la alfalfa. Pecho colorado de pico corto. Tordo alfalfero. Tordo militar. Tordo pecho colorado de la alfalfa. Tuí.

DESCRIPCIÓN

Largo: 18 cm.

Peso: Fiora (1934): N= 2 X= 50,5 g (Rango 49,0 a 52,0); Contreras (1983c): N=1 (M) 50,0 g; Salvador (1988): N= 2 (M) 52,5 y 53,00 g; Di Giacomo (2005h): N= 1 (M) 56,0 g, N= 1 (H) 43,0 g; Salvador (2014a): N= 11 (M)

X= 51,8 g (Rango 49,5 a 53,2), N= 7 (H) X= 43,7 g (Rango 42,6 a 44,8); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (M) 50,0 g, N= 14 X= 43,6 g (Rango 36,5 a 50,0)
Coloración. Pico negro con base de la mandíbula grisácea. Patas negruzcas. Iris pardo oscuro.
Macho. Negro. Cejas blancas. Garganta, cuello anterior, pecho y "hombros" rojos.
En el período de reposo sexual las plumas negras están orilladas de gris pardusco.
Hembra. Dorsal parda estriada de ocráceo. Cejas y garganta ocráceas. Pecho ocráceo con tinte rosado. Pecho, abdomen y flancos jaspeados de oscuro. Alas pardas con las plumas orilladas de ocráceo. Cola con barras pardas oscuras y claras.

COMPORTAMIENTO
En bandadas, a veces de muchos ejemplares. Terrícola. Se posa sobre postes, yuyos altos o alambres.
Alimentación
Marelli (1919). Orugas.
Aravena (1928). **Vegetales:** Semillas y vegetales no determinados.**Insectos:** Coleópteros (Carábidae). Lepidópteros.
Zotta (1936g). **Vegetales:** Semillas y vegetales no determinados. **Insectos:** Coleópteros (Chrysomelidae, Cerambicidae). Hemípteros. Lepidópteros (orugas).**Arácnidos.**
Zotta (1940). **Vegetales:** Semillas no determinadas.
Williamson (1975).**Insectos**. **Vegetales:**Brotes no determinados.
Klimaitis (1993). **Vegetales:**Semillas no determinadas. **Insectos:** Coleópteros. **Otros:** Conchilla.
Haro (1998).**Insectos:** Coleoptera.
Camperi et al. (2004). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae: Brachyderinae y Calendrinae, Dynastidae:larvas, *Dyscinetus* sp. y *Lygirus* sp.*,* Chrysomelidae: Eumolphidae y Cassidinae, Carabidae: *Scarites anthracinus*).Diptera(Tipulidae). Hemiptera (Lygaeidae: *Geocoris* sp., Pentatomidae).Homoptera (Cicadellidae, Cercopidae, Gyponidae, Fulgoroidea).Lepidoptera (Geometridae: larvas, Heterocera: pupas, larvas). Mantodea (Mantidae). Orthoptera (Acridiidae, Gryllidae: Gryllinae, Conocephalidae: *Conocephalus* sp. y *Neoconocephalus* sp.). **Vegetales:**Semilla *Ambrosia tenuifolia, Carex* sp*., Cirsium vulgare, Hordeum* sp*. Lolium multiflorum, Panicum* sp*. Piptochaetium stipoides,* Poaceae, *Polypogon elongatus, Setaria* sp*., Stipa* sp.**Arácnidos:**Arachnida (Araneidae, Thomisidae, Lycocidae)
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semillas no determinadas.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:**Semilla Gamíneas, *Medicago sativa,* no determinadas.**Insectos:**Coleoptera (Tenebrionidae). Lepidoptera (orugas).
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.



Voces
Straneck (*in litt*.). En el período de reproducción el macho canta posado en yuyos altos, postes, alambres o en vuelo. Se eleva y se deja caer con un planeo mientras continúa trinando. Emite una aguda vocalización: Tyiiiiii tli . tli . tili. La hembra permanece oculta y los machos se corren.

HÁBITAT
Áreas rurales, praderas, pastizales, sembrados.
NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	M



El nido es construido en el suelo, entre yuyos, pasturas o cultivos. Tacita o semiesfera forrada con pastos.Oculto. Elaborado.


Dabbene (1918f.). Quilmes, pdo. Quilmes, Buenos Aires. Rodríguez localizó un nido con 2 huevos propios y 2 de *Molothrus bonariensis.*
Pereyra (1933b). Buenos Aires,nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pereyra (1938b). Noreste de la provincia de Buenos Aires, nidifica desde octubre a diciembre.
Fraga (1983c). Estancia La Candelaria, pdo. Lobos, Buenos Aires. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Fraga (2002). Buenos Aires,nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
De Mársico et al. (2010b). Buenos Aires, Tuero localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Salvador (2011c). Villa María, Córdobanido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 16, desde el 17-12-1970 al 15-11-2004, todos en provincia de Santa Fe. Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Medidas: Diámetro total: de 6 a 10 cm. Profundidad: de 2,5 a 5 cm.
Salvador y Bodrati (2014a). Salto, Buenos Aires, Di Giacomo, localizó nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Bodrati (2014a). Villa María, Córdoba, S. Salvador, el 04-01-2013, localizó un nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 6 nidos. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*

Huevos
Pone de 3 a 5 huevos, ovoidales, blancos verdosos con pintitas ocres, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Pereyra (1938b): 25,0 x 19,0
De la Peña (2013c): 21,2 a 26 x 16,9 a 18,2 X= 22,4 x 17,6 (N= 15)

Peso
De la Peña (2013c): 3,1 a 3,8 X= 3,45 (N= 2)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,188 a 0,246 X= 0,219 (N= 13)

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel ventral amarillenta, dorsal gris.
1 día
Plumón gris en la cabeza, parte dorsal y superior de las alas.
3 días
Ojos abiertos, marrones. Pico gris. Cavidad bucal rosada.
Parte anterior del paladar, oscura.
Alrededor de la fosa palatina, puntillado de blanquecino.Comisura blanquecina.
Plumón fino, gris en la corona, parte dorsal y alas. Vainas alares grises.
Aparecen las vainas en las zonas ptéridas.



Generalidades
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 4 a 5 días. Período de incubación 12-13 días. Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido 11-12 días.


Esperanza.Santa Fe.15-09-2007


Cululú.Santa Fe.18-11-1987
Parasitado por *Molothrus bonariensis.*


Esperanza.Santa Fe.18-11-1995


Esperanza.06-10-2015

Otros
Dabbene (1918f). Pereyra (1933b). Fraga (1983c).Fraga (2002). De Márgico et al. (2010b). Salvador (2011c). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

Depredación
De adultos: *Tyto alba* (Morici 1990a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: negro. Garganta y pecho, rojos. Cejas blancas. Hembra: parda y ocrácea, jaspeada. Cejas ocráceas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850)desde el norte del país hasta San Juan, La Pampa y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica.Sureste de Peru, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES

Buenos Aires
Citas: Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi et al. 2004 ; Codesido et al. (201, 2013); Dabbene (1919b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Fraga (2002); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1977c, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2011b); López-Lanús et al. (2013c); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Mérida y Bodrati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Salvador y Di Giacomo (2014); Straneck (1990b) ; White (1882); Zapata (1998)

Observaciones: De la Peña (Pergamino, pdo. Pergamino, 02-11-1979)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005); Moschione y Bishels (2004)

Observaciones: De la Peña (Coronel Du Graty, dpto. Mayor Luís Fontana, 03-05-1988)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Castellanos (1934); Haro (1998); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador(1983, 1988); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Cuchi Corral, dpto. Punilla, 20-01-2000, General Deheza, dpto. Juárez Celman,13-10-2004; Chaján, dpto. Río Cuarto, 13-10-2004)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Contreras (1983c, 1987b); Chatellenaz et al. (2010); Darrieu y Camperi (1994); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008)



Observaciones: De la Peña (Bonpland, dpto. Paso de los Libres, 11-12-2002)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas:Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)
Jujuy

Citas:Burgos et al. (2009) ; Camperi et al. (2013), Chebez et al. (1998); Fiora (1934); Moschione y Segovia (2005

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler (1984, 2004); Tejerina et al. (2006); Williamson (1975)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1907, 1923); Lucero e Izasa (2015)

Mendoza
Citas: Contreras (1979g); Marone (1991, 1992a, 1992b); Sosa (1995d)

Misiones
Citas: Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Krauczuk (2005); Martínez Gamba (2014)

Río Negro
Observaciones: De la Peña (Río Colorado, dpto. Pichi Mahuida,26-11-2000)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Moschione et al. (2013)White (1882)

San Juan
Citas: Gelain (2015f)

San Luis
Citas: Camperi (1989); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993).

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Nores et al. (1991); Pautasso (2002b); Wilson (1926)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Marigliano et al. (2010); Ortiz et al. (2013c)

LOICA PAMPEANA *Sturnella defilippii* (Bonaparte, 1850)


Otros nombres: Degollado segundo. Pecho colorado. Pecho colorado mediano**.** Pecho colorado pampeano. Pecho colorado pampeano. Pecho colorado triguero. Tordo de pecho colorado.
DESCRIPCIÓN
Largo: 20 cm.
Peso: Short (1968): N= 1 (M) 67,5 g; Fraga (2011c): (M) 73,6 g; (H) 67,5 g
Coloración. Pico gris plata, culmen y punta negros.Patas pardas. Iris pardo.
Macho. Dorsal, alas, flancos y vientre negruzcos con las plumas orilladas de gris pardusco. Garganta, pecho y "hombros" rojos. Cejas blancas. Cola con barras pardas oscuras y claras. Cubiertas internas de las alas negras.
Hembra. Dorsal estriada de pardo grisáceo y negruzco. Ventral blanquecina estriada de negro en el pecho. Pecho y abdomen con tono rosado. Vientre negro. Cubiertas internas de las alas negras.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Aravena (1928). **Vegetales:**Semillas. **Insectos:**Coleópteros (Escarabeido, Curculiónido).
Marelli (1919).Vegetales. Insectos.Orugas.
Short (1968).Vegetales.
Cozzani et al. (2004). **Vegetales:** semillas de soja, trigo, cebada, girasol, avena, sorgo.

HÁBITAT
Pastizales en praderas.
NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Buenos Aires.




MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	

Nidifica en el suelo. El nido tiene forma de taza. Emplea pajitas y raicillas.
Withington (1888). Buenos Airesnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Smyth (1928). Es parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pereyra (1938b). Noreste de la provincia de Buenos Aires, nidifica desde octubre a diciembre.
Cozzani et al. (2004). Bahía Blanca, pdo. Bahía Blanca, Buenos Aires, 18 de noviembre de 2003, se localizaron 16 nidos. Nido con forma de taza, diámetro de 8,9 a 9,5 cm y una profundidad de 5,2 cm.
Sánchez et al. (2005). Suroeste de Buenos Aires, nidifica.
Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 3 nidos.

Huevos
Pone 4 huevos, blancos con pintas castañas y manchas y finas líneas púrpura o marrón oscuro en el polo mayor.

Medidas
Smyth (1928):25 a 25,5 x 17,5 a 18
Pereyra (1938b): 22,0 x 19,0
Cozzani et al. (2004): 25,8 x 18,3



Generalidades
Cozzani et al. (2004). El período de permanencia de los pichones en el nido es de 10-11 días.

Otros
Urcola (2011). Un ejemplar con Leucismo parcial.
Withington (1888). Smyth (1928). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.

Más información:
Gochfeld (1978b, 1979a, 1979b)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Macho: negruzco, con cejas blancas. Garganta y pecho rojos. Cubiertas internas de las alas negras, visibles en vuelo. Hembra: estriada de negruzco y pardo grisáceo.
Tiene el pico y la cola más cortos que los de la Loica común.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sturnella defilippii (Bonaparte, 1850)en el este de La Pampa y oeste de Buenos Aires. Se desplaza a San Luis, Entre Ríos y Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Su área de distribución se ha restringido a pastizales altos naturales en centro-este de Argentina, Uruguay (invierno), sureste de Brasil (algunos registros en invierno), en forma fragmentaria.

CITAS Y OBSERVACIONES

Buenos Aires
Citas: Aravena (1928); Bodrati et al. (2001, 2006b); Coconier (2005); Cozzani et al. (2004); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doering (1881); Durnford (1877); Gabelli et al. (2004); Hartert y Venturi (1909); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Narosky et al. (1990); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Petracci et al. (2004); Rabuffeti (2005); Sclater y Hudson (1888); Tubaro y Gabelli (1999); Zapata (1998)

Corrientes
Citas: Antoniazzi (2006); Contreras (1987b); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918)

Entre Ríos
Citas: Serié y Smyth (1923); Zapata (1975)

La Pampa
Citas: Bruno en Chebez (2008); Camperi (1989); Chebez (2008); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Gabelli et al. (2004); Sigenthaler (2004); Tubaro y Gabelli (1999)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: Wilson, A. S. (1926)

LOICACOMÚN *Sturnella loyca* (Molina, 1782)

Otros nombres: Carpecho. Chate. Cué. Degollado. Gran pecho colorado. Lloica. Loyca. Milico. Pecho colorado grande. Pecho rojo. Toche ajicero. Tordo pecho colorado. Wanchaco.
DESCRIPCIÓN
Largo: 25 cm.
Peso: Humphrey et al. (1970): N= 2 (M) 129,0 y 116,0 g; Contreras (1975): N= 6 (?) X= 98,9 g (Rango 78,0 a 131,5); Salvador (1988): N= 3 (M) X= 101,0 g (Rango 98,0 a 104,0); Salvador (1990a): N= 1 (?) 93,5 g; Camperi (1992c): N= 7 (M) X= 93,1 g (Rango 86,0 a 96,0); N= 2 (H) 77,0 y 82,5 g; Christie et al. (2004): N= 1 (M) 105,0 g, N= 1 (H) 94,0 g; Camperi y Darrieu (2005): N= 2 (M) 103,0 y 108,6 g, N= 1 (H) 89,8 g; Salvador (2014a): N 1 (M) 97,0 g; Navas y Bó (1990): N= 1 (M) 103,0 g
Coloración. Pico color córneo. Patas grises. Iris pardo.

Macho. Dorsal, alas, flancos y vientre negruzcos con las plumas orilladas de gris. Cejas blanquecinas con parte anterior roja. Garganta, pecho y "Hombros" rojos. Cola con barras pardas oscuras y claras. Cubiertas internas de las alas blancas.
Hembra. Dorsal estriada de pardo oscuro y ocráceo. Cejas ocráceas. Garganta blanca bordeada de negro. Ventral blanquecina estriada de negruzco. Vientre negruzco. Alas pardas con las plumas orilladas de grisáceo. Cubiertas internas de las alas blancas. Cola con barras pardas oscuras y claras.



COMPORTAMIENTO
Anda solitario, en pareja o en grupo. Canta posado en yuyos altos, postes, alambres, rocas. Terrícola. Se alimenta de insectos, orugas, semillas.
Alimentación
Crawshay (1907). Insectos.
Johnson and Goodall (1967). Insectos. Semillas.
Haene et al. (2007). **Vegetales:***Berberis buxifolia*(Fruto).
De la Peña (2010). Gusanos.
Bianchini (2014b). **Reptiles:**Lagartija de las arenas (*Liolaemus multimaculatus*)



Voces
Straneck (*in litt*.). El canto está compuesto con voces agudas y ásperas: Sipie . tie . tyyyyieehh ..
HÁBITAT
Pastizales, estepas andinas y patagónicas, serranías.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

El nido es una semiesfera hueca o tazón de gramillas, en el suelo, entre pastos. Oculto. Elaborado.
Reed (1913). Mendoza nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Friedmann et al. (1977). Río Negro, Nelson nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre octubre y enero.
Gochfeld (1979a). Buenos Aires nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Salvador y Salvador (1984). Pampa de Achala, dpto. Punilla, Córdoba, 17-12-1983, 3 huevos propios y 1 de *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Salvador (1988). Pampa de Achala, Córdoba, 17-12-1983, nido con 3 huevos y de *Molothrus bonariensis*; 21-12-1986, nido con 2 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*; 24-01-1988, nido con 3 huevos.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica. Nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nidifica.
Fraga (2002). Neuquén nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Christie et al. (2004). Nidos con huevos en enero.
Albrieu et al. (2004). Estuario del río Gallegos, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, nidifica entre octubre y diciembre.
Cozzani y Zalba (2009). Buenos Aires nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.

Salvador (2012f). Río Negro nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Salvador y Bodrati (2011). Córdoba nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, Córdoba, se localizaron 13 nidos, entre noviembre y enero.
De la Peña (2013c). Puerto Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz, 07-11-1979, 5 huevos; Ascochinga, dpto. Colón, Córdoba, 17-12-1981, 3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*
Medidas: Diámetro total: de 14 a 18 cm. Diámetro interno: de 8 a 11 cm. Profundidad: de 4,5 a 5 cm. Alto: de 5,5 a 9 cm.
Salvador y Bodrati (2014a). Bordenave, Buenos Aires A. Di Giacomo, localizó nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*

Huevos
Pone de 3 a 5 huevos, ovoidales, grises o crema con pintas y manchitas grises, pardas y castañas, distribuidas por toda la superficie.




Medidas
Salvador y Salvador (1988): 27,5 a 29,2 x 19,8 a 21,2 X= 28,6 x 20,3 (N= 8)
Salvador y Salvador (2012): 27,5 a 30,7 x 19,8 a 21,2 X= 29,1 x 20,3 (N= 20)
De la Peña (2013c): 30,9 a 33 x 19,4 a 20 X= 31,9 x 19,8 (N= 5) *Sturnella l.loyca*
De la Peña (2013c): 28,8 a 29,8 x 20,3 a 20,8 X= 29,3 x 20,4 (N= 3) *Sturnella l. obscura*
Peso
Salvador y Salvador (1988): 6,1
Salvador y Salvador (2012):5,7 a 6,4 X= 6,1 (N= 16)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,359 a 0,413 X= 0,378 (N= 5) *Sturnella l.loyca*
De la Peña (2013c): cáscaras 0,339 a 0,359 X= 0,350 (N= 3) *Sturnella l. obscura*

Observaciones
Salvador y Salvador (2012). La incubación estuvo a cargo de la hembra y la alimentación de los pichones por la pareja.
Salvador y Salvador (1984). Pampa de Achala, dpto. Punilla, Córdoba, 10 y 12-01-983, 2 parejas alimentando cada una a un pichón volador de *Molothrus bonariensis.*

PICHONES
Descripción
Salvador y Salvador (2012). Los pichones nacen con los ojos cerrados. Piel color carne naranja, con escaso plumón dorsal gris claro. Pico pardo muy claro, comisuras blancas, interior de la boca rojo.

Otros
Morici (2009b). Leucismo en un ejemplar.
Reed (1913). Friedmann et al. 1977). Gochfeld (1979a). Fraga (2002). Cozzani y Zalba (2009). Salvador (2012f). Salvador y Salvador (1984).Salvador y Salvador (1988).Miatello et al. (1999).Salvador y Salvador (2012). De la Peña (2013c). Salvador y Bodrati (2011, 2014). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*



Ascochinga.Córdoba.17-11-2005



Ascochinga.Córdoba.17-12-1981Parasitado por *Molothrus bonariensis*



Ascochinga.Córdoba.09-06-2007



Ascochinga.Córdoba.17-12-1981. Ubicación nido



Puerto Deseado.Santa Cruz.07-11-1979

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: cejas rojas y blancas. Garganta y pecho rojos. Hembra: estriada de negruzco y ocráceo. Garganta blanca.
Tienen el pico y la cola más largos que los de la Loica pampeana.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sturnella loyca loyca (Molina, 1782)en Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén, hasta Tierra del Fuego (migra al sur de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos); *Sturnella loyca falklandica* (Leverkuhn, 1889)en las islas Malvinas y Georgias del Sur ; *Sturnella loyca catamarcanus* (Zotta, 1937)hasta los 2.500 metros de altura desde Jujuy y oeste de Salta por Catamarca y oeste de Tucumán y La Rioja hasta San Juan y Mendoza y *Sturnella loyca obscura* Nores e Yzurieta, (1979) 1983, en Córdoba.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies.Sur de Sud Américaen Chile y Argentina, incluyendo Islas Malvinas.

CITAS Y OBSERVACIONES

Sturnella loycaloyca (Molina, 1782)


Buenos Aires
Citas: Camperi (1992c); Codesido et al. (2011); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Isacch y Martínez (2001); Leveau y Leveau (2011b); Marelli (1933); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2009a, 2014); Narosky y Di Giacomo (1993); Short (1967); Zapata (1998); Zotta (1937c)

Observaciones: De la Peña (Médanos, pdo. Villarino, 05-02-1976)

Chubut
Citas: Bó (1958); Camperi (1998); Daciuk (1977c); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Sainz-Trápaga (2014); Vidoz (1995); Zotta (1937c)

Observaciones: De la Peña (Península Valdés, dpto. Biedma, 04-02-1972; Esquel, dpto. Futaleufú, 01-02-1976)

Córdoba
Citas: Miatello et al. (1993); Nores et al. (1983); Nores (1996); Ordano (1996); Salvador y Salvador (2012); Yzurieta (1995); Zotta (1937c)



Jujuy
Citas:Camperi et al. (2013), Lillo 1909, Olrog, 1949, Budin1931, Fiora 1934, Zotta (1937c)

La Pampa
Citas:Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Güller (2008); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Pereyra(1923a., 1927e); Siegenthaler (1984); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b); Zotta (1937c); Straneck (1990a)

Observaciones: De la Peña (La Adela, dpto. Caleucaleu, 05-02-1976)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Bosisio (2003); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu y Segura (2015); Gómez (2006); Martínez et al. (1997a); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d); Wetmore (1926b); Zotta (1937c)

Observaciones: De la Peña (Llancanelo, dpto. Malargüe, 15-10-2004)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Acerbo en Fiori y Zalba (1999); Cheherbar et al. (1992); Christie et al. (2004); Contreras (1975, 1976, 1977b); Fraga (2002); Gorgoglione (2005); Helmayr (1937); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b); Zotta (1937c.)

Observaciones: De la Peña (La Rinconada, dpto. Huiliches, 27-01-1976)

Río Negro
Citas:Acevedo (1992); Bettinelli y Chebez (1986); Bianchini (2014b); Camperi (1998); Camperi y Darrieu (2005); Casas (1992a); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras (1975); Contreras et al. (1980b); Daciuk (1977c); Gelain (1984a, 2001, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubullis (1985); Hecker y Vidoz (1998); Llanos et al. (2005, 2011); Navas y Bó (1990); Paz Barreto (1997b); Paz, D. (1991); Pérezy Petracci (1998); Peters (1923b)

Observaciones: De la Peña (San Carlos de Bariloche, dpto. Bariloche, 30-01-1976; 27-11-1998; General Conesa, dpto. Conesa, 26-11-2000)

San Luis
Citas: Casares (1944); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993); Zotta (1937c)
Observaciones: De la Peña (Bearley, dpto. La Capital, 16-10-2004)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Burmeister (1890); Chebez et al. (1998) , Darrieu et al. (2009); De la Peña (1987, 2005); De Lucca y Saggese (1992); Humphrey et al. (1985); Imberti (2005); Imberti y Albrieu (2001); Olrog (1948); Oustalet (1891); Peri (2013); Salvadori (1900); Stone (1928); Travaini et al. (2004); Wetmore (1926a); Zapata (1967, 1969); Zotta (1937c)

Observaciones: De la Peña (Río Gallegos, dpto. Güer Aike,30-01-1974)

Santa Fe
Citas: Wilson, A. S. (1926)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1937); Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948, 1950); Pereyra (1951); Ripley (1950)

Sturnella loyca falklandica (Leverkuhn, 1889)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

Georgias del Sur
Citas: Curtis (1988); Princey Croxall (1996)

Sturnella loyca catamarcanus (Zotta, 1937)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Nores (1995); Salvador (1990a); Zotta (1937)

Observaciones: De la Peña (Santa María, dpto. Santa María, 08-02-1977)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009)

La Rioja
Citas: Hayward (1967)

Mendoza
Citas:Calí et al. (2008)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain (2008a, 2014a); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i); Ortiz y Murúa (1994)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Ortiz et al. (2013c)

Sturnella loyca obscura Nores e Yzurieta, (1979) 1983

Córdoba
Citas: Castellanos (1934); De la Peña (2013c); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1995, 1996); Partridge (1953c); Salvadory Salvador (1988); Salvadory Bodrati (2011); Yzurieta (1995)
Observaciones: De la Peña (La Falda, dpto. Punilla, 19-01-2000; La Cumbrecita, dpto. Calamuchita, 30-04-2000)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993); Nores (1995); Salvador (1988)
Observaciones: De la Peña (Bearley, dpto. La Capital, 16-10-2004**)**

CHARLATÁN *Dolichonyx oryzivorus* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Chambergo. Tordo charlatán.
DESCRIPCIÓN
Largo: 14 cm.
Peso: Contreras (1983c): N=3 (M) 33,4, 34,7 y 34,9 g; Darrieu y Camperi (1994): N= 3 (M) 33,4, 34,7 y 34,9 g
Coloración. Pico negro, base de la mandíbula gris. Patas gris parduscas. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual. Dorsal estriada de negruzco y ocráceo. Cejas y parte ventral ocráceas. Flancos jaspeados de negruzco. Franja en la corona negruzca.
Plumaje nupcial. Negro. Posterior del cuello ocre amarillento. Espalda estriada. Rabadilla blanquecina.

COMPORTAMIENTO



Alimentación
Pereyra (1938). **Vegetales:**Semilla*Schoenoplectus californicus.*
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:**Semilla*Deyeuxia viridiflavescens, Paspalum intermedium, Paspalum rufum, Paspalum urvillei, Sorghum halepense.*
De la Peña (2010c). **Vegetales:***Helianthus annus,Oryza sativa.*
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:**Inflorescencia masculina*Zea mays.*

HÁBITAT
Pastizales, bañados, esteros.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cejas y ventral ocráceas. Dorso estriado.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Dolichonyx oryzivorus(Linnaeus, 1758) migratorio de Norteamérica. Llega hasta Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Migratorio de Estados Unidos, donde nidifica. Llega en su migración hasta Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina

CITAS Y OBSERVACIONES

Buenos Aires
Citas: Bodrati (2001); Bodrati et al. (2006b); Carrizo y Pizá (2004); Jaramillo (2000); Narosky y Di Giacomo (1993); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Corrientes
Citas: Contreras (1983c, 1987b); Darrieu y Camperi (1994); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006)

Córdoba
Observaciones: Salvador, S. (Villa María, posiblemente escapado de cautiverio)

Entre Ríos
Citas: López-Lanús et al. (2013c)

Formosa
Citas:Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); López Lanús (1997)

Jujuy
Citas:Brandán y Antelo (2001); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Camperi (1989a).

Misiones
Citas: Chebez (1996a)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Esteban (1953); Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Hartert y Venturi (1909); López Lanúset al. (2007); Manassero y Luna (2009**)**

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Blendinger (1998); Brandán y Navarro (2009); Dinelli (1918a); Lucero (1983)

CABECITANEGRAS Y TANGARÁES

FAMILIA: FRINGILLIDAE

Aves de pico corto, fuerte.

Se alimentan de granos y de semillas.

Construyen el nido en arbustos o en árboles. Ponen hasta 4 huevos.

Frecuentan estepas, praderas, bosques, parques.

Subfamilia: Fringillinae

VERDERÓN *Carduelis chloris* (Linnaeus, 1758)

DESCRIPCIÓN
Largo: 14,5 cm.
Peso: Collar y Newton (2010): 17,0-34,0 g
Coloración. Pico rosado. Patas pardas. Iris pardo oscuro.
Macho. Verde oliváceo. Rabadilla verde amarillenta. Alas pardas oscuras con amarillo en las remeras. Cola amarilla y negra.
Hembra. Más grisácea y de colores más apagados.



COMPORTAMIENTO

Voces
Straneck (*in litt*.). Desde lugares expuestos emite un canto que puede variar: Tyiiiiiiiiihh o pluplüplüplü ..

HÁBITAT
Pinares, parques.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Taza de materiales vegetales, musgos, líquenes.

Maugeri (2006a). Campo Experimental Cahué, pdo. Adolfo Alsina, Buenos Aires, 26-12-2002, nido en un Ciprés a 9 m de altura. Taza de 11,5 cm de diámetro externo, 9 cm de diámetro interno, 4,5 cm de profundidad. Elaborado con pecíoles de Acacia negra (*Gleditsia triacanthos*), finas ramas de ciprés, tallos de gramíneas, raíces, líquenes e internamentetapizado con pocas plumas de *Columba* sp. y de Inambú chico *Nothura maculosa*.

Huevos
Pone de 4 a 6 huevos.



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico blanquecino. Verde con amarillo en las alas y en la cola.
Se diferencia de la hembra del Cabecitanegra común por ser de mayor tamaño y tener el pico más grande.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Carduelis chloris aurantiiventris(Cabanis, 1851) por el este e interior de Buenos Aires hasta el norte de Chubut.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Diez subespecies. Por el este e interior de Buenos Aires, este de Río Negro,noreste de Chubut. Introducido de Europa.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Carduelis chlorisaurantiiventris (Cabanis, 1851) (*)

Buenos Aires
Citas: Armani (1983); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Leveauy Leveau (2004, 2006); Maugeri (2006); Montaldo (1980); Narosky y Di Giacomo (1993); Navas (1987a, 2002); Pugnali y Chamorro (2008); Roitman y Moltaldo (1989)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011) Llanos et al. (2011)

(*) Posible subespecie.

CARDELINO *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)

DESCRIPCIÓN
Largo: 12 cm
Peso: Collar y Newton (2010): 9,5-24,0 g
Coloración. Pico blanquecino rosado. Patas pardas. Iris pardo oscuro.
Frente, cara y garganta rojas. Corona negra. Regiones auriculares y lados del cuello blancos. Dorsal parda. Rabadilla y parte ventral blanquecinas. Lados del pecho y flancos parduscos. Alas negras con mancha amarilla en las remeras y puntas blancas. Cola negra con puntas blancas.
El **juvenil** es pardusco estriado de oscuro.

HÁBITAT
Praderas arboladas, bosques.

NIDIFICACIÓN

Pereyra (1938b). Noreste de la provincia de Buenos Aires, nidifica.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Tiene forma de copa. Es construido con materiales vegetales, musgos, líquenes.



Huevos
Pone de 4 a 6 huevos.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza roja, blanca y negra. Mancha amarilla en las alas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Carduelis cardueliscarduelis (Linnaeus, 1758)en el este de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Catorce subespecies. Introducido desde Europa a Buenos Aires y Uruguay. Bosques de pinos

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Buenos Aires
Citas: Darrieu y Camperi (2001a); Delius (1986); Fiameni (2005); Hartert y Venturi (1909); Ianiro (1999); Narosky y Di Giacomo (1993); Olrog (1963); Pagano et al. (2012); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Ramos (2002)

Entre Ríos
Citas: Raffo et al. (2008)

CABECITANEGRA PICUDO *Sporagra crassirostris* (Landbeck, 1877)

Otro nombre: Cabecita negra picuda.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13,5 cm.
Peso: Collar y Newton (2010): 19,0 g
Coloración. Pico negro. Patas pardo grisáceo. Iris pardo.
Macho. Cabeza y garganta negros. Dorsal olivácea. Rabadilla y ventral amarillas. Alas y cola pardas oscuras. La base de las primarias y de las rectrices amarilla.
Hembra. Cabeza y garganta grises. Dorsal gris olivácea. Rabadilla amarillenta olivácea. Resto de la parte ventral grisáceo. Alas y cola como el macho.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o en grupo.

HÁBITAT
Estepas altoandinas, terrenos rocosos arbustivos.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N										

El nido tiene forma de tacita o semiesfera hueca. Emplea en la construcción fibras vegetales y raicillas. Internamente lanas y algunas plumitas. Lo ubica en arbustos.Expuesto. Elaborado



Salvador y Narosky (1983). Iturbe, dpto. Humahuaca, Jujuy, 26-02-1983, nido con 3 huevos.
Salvador y Salvador en De la Peña (2011b). Coraya, dpto. Humahuaca, Jujuy, 21-02-1995, nido con 4 huevos. El nido se hallaba en una amplia quebrada sobre un cause seco, a 2,8 m de altura en la rama lateral de un *Prosopis ferox*, semiesfera prolija de tallitos, raicillas y gramíneas, por dentro forrado de lana y cerdas, de 10 cm de diámetro externo, 5 cm de diámetro interno, 6 cm de altura y 3 cm de profundidad.
De la Peña (2013c). Azul Pampa, Humahuaca, Jujuy, 09-02-2001, nido en arbusto a 2,50 m del suelo, 3 huevos.
Medidas: Diámetro total: 7 x 9 cm. Diámetro interno: 5 cm. Profundidad: 1,8 cm. Alto: 6 cm.

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, blancos con finas pintas castañas en el polo mayor y escasas en el resto de la superficie.



Medidas
Salvador y Narosky (1983): 16,8 a 17,8 x 13,4 a 13,6 X= 17,2 x 13,5 (N= 3)
Salvador y Salvador en De la Peña (2011b): 18,8 a 18,1 x 12,7 a 13,2 X= 17,2 x 13,0 (N= 4)
De la Peña (2013c): 17,3 a 18,3 x 12,5 a 13,2 X= 17,8 x 12,9 (N= 3)

Pesos
Salvador y Narosky (1983): 1,7, 1,7 y 1,6
Salvador y Salvador en De la Peña (2011b): 1,5 a 1,8 X= 1,7 (N= 4)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,070 X= 0,070 (N= 3)

Más información:
Salvador y Narosky (1983).



Azul Pampa.Jujuy.09-02-2001



Azul Pampa.Jujuy.09-02-2001

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Macho: cabeza negra. Rabadilla, base de la cola y parte ventral amarillas. Hembra: dorsal gris olivácea, poco jaspeada. Ventral grisácea.

El macho se diferencia del macho del Cabecitanegra común por tener el pico más grueso y ser más oscuro en la dorsal.

La hembra, de la hembra de la misma especie por ser dorsalmente gris pardusca.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Sporagra crassirostris crassirostris(Landbeck, 1877)entre los 3.000 y los 4.000 metros de altura desde Jujuy hasta Neuquén.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Andes de Perú, Bolivia, Chile y Argentina (por el oeste). Bosques de Queñoa (*Polylepis*).

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sporagra crassirostris crassirostris (Landbeck, 1877)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Hellmayr (1938)

Jujuy

Citas:Burgos et al. (2009*)* ; Camperi et al. (2013); De la Peña, (2013c); Di Giacomo et al. (2007); Moschione et al. (2011); Salvadory Narosky (1983); Salvador (2015)



La Rioja

Citas: Camperi et al. (2008); Esteban (1953); Nores (1955)

Mendoza

Citas: Ferrer et al. (2011); Olivera et al. (2009); Roig (1965)

Neuquén

Citas:López Lanús en Veiga et al. (2005); Matarasso (2007)

Salta

Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i)

Tucumán
Citas: Capllonch (2007); Capllonch y Moyano Wagner (2010); Capllonch et al. (2011b)

CABECITANEGRA COMÚN *Sporagra magellanica* (Vieillot, 1805)

Otros nombres: Cabecita negra. Cabecita negra común. Cabeza negra. Jilguero. Jilguero cabecita negra. Jilguero de cabeza negra.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12 cm.
Peso: Fiora (1934): N= 4 X= 7, 7 g (Rango 7,0 a 8,0); Contreras (1979f): N= 1 (M) 11,0 g; Camperi (1992c): N= 4 (M) 14,5 , 14,5 , 15,0 y 15,5 g; N= 1 (H) 15,0 g; Di Giacomo (2005h): N= 1 (M) 12,0 g; Salvador (2014a): N= 5 (M) X=14 g (Rango 13,3 a 14,8), N= 5 (H) X= 13,2 g (Rango 12,8 a 13,9); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 3 X= 10,3 g (Rango 10,0 a 10,5) (*alleni*)
Coloración. Pico y pastas negruzcos. Iris pardo oscuro.
Macho. Cabeza y garganta negras. Dorsal olivácea. Rabadilla y parte ventral amarillas. Alas y cola negras con la base de las primarias y de las rectrices, amarillas. Cubiertas alares orilladas de verde amarillento.
Hembra. Dorsal olivácea. Rabadilla amarillenta. Ventral amarillo verdosa. Alas y cola como el macho.

COMPORTAMIENTO
Anda solitaria, en pareja o en grupo. Es inquieto.
De la Peña (2011a). Recolecta en el estrato herbáceo, ramas y follaje, entre 1 y 10 m de altura..

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Fruto Mora (*Morus alba*).Semillas de Cedrón del monte (*Aloyssia gratissima*), Cerraja (*Sonchus oleraceus*). For de cardo negro (*Cirsum vulgare*)
Comparatore et al. (1996). **Vegetales:** Semilla *Carduus acanthoides.*
Haro (1998). **Insectos:** Diptera. Homoptera (Aphidae). **Arácnidos:** Arachnida (Araneae).
Montaldo y Roitman (2000). **Vegetales:** *Dipsacus fullonum, Fraxinus excelsior. Fraxinus pennsylvanica, Brassica napus* var. *oleifera, Casuarina cunninghamiana, Criptomeria japónica, Cupresus sempervirens, Liquidambar styraciflua, Oenothera mollissima, Ulmus procera.*
Di Giacomo (2005h).**Vegetales:** Inflorescencia y semilla de *Aloysia gratissima*, semillas de *Bidens pilosa*, *Cirsium vulgare*, *Mikania variifolia.*
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Semillas de *Carduus* sp., *Casuarina cunninghamiana*, *Chenopodium* sp., *Cupresus* sp., *Fraxinus pennsylvanica*, *Ulmus procera*, Gramíneas. Inflorescencia masculina de *Zea mays*. **Otros:** Arena.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Fruto de *Cotoneaster* sp.
De la Peña (2011a). **Vegetales:** Semillas de *Amaranthus quitensis, Bidens pilosa*, *Lippia turbinata, Sorghum halepense, Taraxacum oficinale,Ulmus procera.*Flor de *Anredera cordifolia.*
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Canto variado, posado o en vuelo. Suele cantar en coro. El canto es un parloteo agudo, rápido y uniforme.

HÁBITAT
Praderas arboladas, parques, plantaciones, áreas urbanas.

NIDIFICACIÓN

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, Chaco, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires.



El nido tiene forma de tacita o semiesfera hueca. Emplea en la base de la construcción fibras vegetales, palitos muy finos o tallos de yuyos. Internamente raicillas, lanas y cerdas. A veces plumitas o nervaduras. Liado con telas de arañas. Sostenido o asentado en ramas. Pueden estar apenas atados.Oculto. Elaborado.



Hudson (1870). Buenos Airesnido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Pereyra (1938b). Noreste de la provincia de Buenos Aires, nidifica desde noviembre a enero.
Friedmann (1977). Tucumán, King nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Gibson (1880a). Cabo San Antonio, pdo de la Costa, Buenos Aires. Posturas setiembre a diciembre. Es parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Masramón (1980). Nidifica en San Luis.
Contreras (1980o). Gustavo Andrés, dpto. Lavalle, Mendoza, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Mezquida y Marone (2001). Reserva Ñacuñán, Mendoza.Nidifica.
Mezquida (2003). Reserva de Ñacuñán, dpto. Santa Rosa, Mendoza, observaciones en el período reproductivo desde 1995 a 1999, se localizaron nidos entre octubre y diciembre.
Di Giacomo (2005h).Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, noviembre de 1999, nido en construcción.
De la Peña (2013c). Total de nidos localizados: 6, desde el 18-10-1978 hasta el 06-12-1991, 1 en Córdoba, 1 en Entre Ríos, el resto en Santa Fe.
Medidas: Diámetro total: de 7 a 7,5 cm. Diámetro interno: 4 cm. Profundidad: de 2 a 3 cm. Alto: de 4 a 7 cm.
Salvador y Bodrati (2014a). Parque Nacional Chaco, Chaco, Bodrati observó adultos alimentando pichones de *Molothrus bonariensis.*
Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 3 nidos.

Huevos
Pne 3 ó 4 huevos, ovoidales, blancos sin manchas o celestes claros sin manchas o con pintas finas y líneas castañas.





Medidas
Hartert y Venturi (1909): 15,5 a 16,5 x 12,5 a 13,5

Smyth (1928): 16,0 a 18,5 x 12,0 a 13,5
Pereyra (1938b): 17,0 x 12,0
Mezquida (2003): X= 16,5 x 12,4 (N= 6)
De la Peña (2013c): 16 a 17,3 x 11,9 a 12,9 X= 16,8 x 12,4 (N= 9)

Peso
Mezquida (2003): X= 1,5 (N= 6)
De la Peña (2013c): 1,3 a 1,5 X= 1,4 (N= 4)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,055 a 0,080 X= 0,068 (N= 9)

Generalidades
Mezquida (2003). Los pichones permanecen en el nido 16 días.

Otros
Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Hudson (1870). Gibson (1880a). Pereyra (1938b). Friedmann (1977). Contreras (1980o). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*


Cayastá.Santa Fe.23-10-1979


Jesús María.Córdoba.09-06-2007


Jesús María.Córdoba.22-10-2007


Yeso Oeste.Entre Ríos.06-12-1991



Yeso Oeste.Entre Ríos.06-12-1991



Jesús María.Córdoba.09-06-2007

Depredación
De adultos: *Tyto alba* (Morici 1990a, 1990b)

Más información:
Mezquida (2003).De la Peña (2013c)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: cabeza negra. Dorsal olivácea. Rabadilla y ventral amarillas. Hembra: dorsal olivácea.
Diferenciarlo del Cabecitanegra picudo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sporagra magellanica magellanica (Vieillot, 1805)desde Corrientes, hasta Buenos Aires, sur de Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut ; *Sporagra magellanica icterica* (Lichtenstein, 1823)en el norte de Corrientes y Misiones ; *Sporagra magellanica alleni* (Ridgeway, 1899)desde Salta, Jujuy y Formosa hasta Santa Fe, Córdoba y San Luis y *Sporagra magellanica tucumana* (Todd, 1926)hasta los 2500 m de altura desde el oeste de Salta, Tucumán y Catamarca hasta Mendoza y Neuquén y *Sporagra magellanica hoyi* König 1981en la puna de Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Doce subespecies. Amplia área de distribución en Sud América en Los Andes de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. En el llano en Venezuela, Guayanas, Brasil, Uruguay, centro y sur de Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sporagra magellanica magellanica (Vieillot, 1805)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Codesido et al. (2011); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1977c); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2004, 2004b, 2005, 2011b); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Mérida y

Bodrati (2006); Morici (2012, 2014); Montaldo y Roitman (1998); Montaldo y Claver (1986); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a); Soave et al. (1999); Zapata (1998); Zuberbhüler (1971)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, 07-02-1976)

Chaco
Citas:Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005); Moschione y Bishels (2004)

Observaciones: De la Peña (Margarita Belén, dpto. 1º de Mayo, 26-09-1972)

Chubut
Citas: Kovacs, C. et al. (2005)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Castellanos (1934); De la Peña (2013c); Haro (1998); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Ordano (1996); Salvador (1983); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Cañada del río Pinto, 19-09-2002; Jesús María, 29-08-2008; Ascochinga, 29-09-2009**)**

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz et al. (2010); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (1999)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b, 2013c); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Straneck (1990c)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Güller (2008); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler (1984); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Colonia 25 de Mayo, dpto. Puelén, 19-11-1998)

Mendoza
Citas: Blendinger y Ojeda (2001); Calí et al. (2008); Contreras (1979g 1980o); Contreras y Fernández (1980); Darrieu y Segura (2015); Gómez (2006, 2013); López de Casenave (2001); Marone (1991, 1992a, 1992b); Martínez et al. (1997a); Mezquida (2003); Mezquida y Marone (2001); Navas y Bó (2000); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d); Wetmore (1926b)

Neuquén
Citas: Chebez et al. (1993); Contreras (1977b)

Río Negro
Citas:Bettinelli y Chebez (1986); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Pérezy Petracci (1998)

Observaciones: De la Peña (General Roca, dpto. Gral. Roca, 28-11-1998)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2002, 2011f); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Wilson(1926)

Sporagra magellanica icterica (Lichtenstein, 1823)

Corrientes
Citas: Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1996); White (1882)

Observaciones: De la Peña (Paso de los Libres, dpto. Paso de los Libres, 11-12-2002)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Bodrati y Salvador (2015a); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); White (1882)

Sporagra magellanica alleni (Ridgeway, 1899)

Catamarca

Observaciones: De la Peña (Belén, 08-02-1977 ; El Alamito, 16-12-1999)

Córdoba
Citas:Nores et al. (1983); Nores (1996)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014)


Esperanza. 22-05-2015


Esperanza. 24-05-2015. Comiendo Cedrón del monte (Aloysia gratissima)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Capurro y Bucher (1986); Chebez et al. (1998); Earnshaw y Earnshaw (2000a); Fiora (1934); Hayward (1967); Koning (1981); Koslowsky (1895); Moschione y Segovia (2005);

Observaciones: De la Peña (Tilcara, dpto. Tilcara, 07-02-1983)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (Cachi, dpto. Cachi, 06-12-77)

San Luis
Citas: Casares (1944); Masramón (1979, 1983); Nellar Romanella (1993).

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Sporagra magellanica tucumana (Todd, 1926)

Catamarca
Citas: Alabarce et al. (1990); Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Vides Almonacid (1999); White (1882)

Córdoba
Citas: Partridge (1953c)

La Rioja
Citas: Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Calí et al. (2008); Contreras (1979); Navas y Bó (2000); Sanzín (1918); Sosa (1995d)

Observaciones: De la Peña (Castillos de Pincheira, 14-10-2004)

Neuquén
Citas:Contreras (1977b); Chebez et al. (1993); Fiori y Zalba (1999); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Gelain (2008a, 2014a); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Navas y Bó (2000); Ortiz y Murúa (1994)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán

Citas: Alabarce y Antelo (1996); Antelo y Brandán (2006); Antelo et al. (2013); Capllonch (2007); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch et al. (2011b); Echevarría et al. (2008c, 2011b); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Luceroet al. (2002); Ortiz et al. (2011, 2013); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014)

Observaciones: De la Peña (Horco Molle, dpto. Capital, 12-05-1987)

Sporagra magellanica hoyi König 1981

Jujuy
Citas: König (1981)

NEGRILLO *Sporagra atrata (*d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)



Otros nombres: Cabecita negra chilena. Cabecita negra oscuro. Cabecita negra plomiza. Cabecita negra serrana. Jilguero.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12,5 cm.
Peso: Collar y Newton (2010): 15,0-16,8 g
Coloración. Pico y patas pardos. Iris pardo oscuro.
Macho. Negro. Abdomen, subcaudales, base de las remeras y timoneras amarillos.
Hembra. Más pálida.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o en grupo. Tiene un canto melodioso.


Alimentación

HÁBITAT
Estepas altoandinas y terrenos rocosos arbustivos.

NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en Jujuy, San Juan.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										

El nido tiene forma de tacita o semiesfera hueca. Es construido con pajitas y tallos. Internamente lanas y raicillas. Lo ubica en arbustos o en tirantes de construcciones.Expuesto. Elaborado.



De la Peña (2013c). Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 09-02-2001, nido en tirante de construcción, a 2,80 m con 3 huevos. Medidas: Diámetro total: 10 x 13 cm. Diámetro interno: 5 cm. Profundidad: 1,5 cm. Alto: 6 cm.
El nido tiene muchas materias fecales distribuidas en el reborde superior (blancas y negras).

Huevos
Pone 3 huevos, ovoidales, blancos con finas pintas castañas en el polo mayor y pocasen el resto de la superficie.


Medidas
De la Peña (2013c): 17,3 a 18,3 x 12,8 a 14 X= 17,7 x 13,2 (N= 3)



Azul Pampa.Jujuy.09-02-2001

Peso
De la Peña (2013c): cáscaras 0,070 X= 0,070 (N= 3)

Observaciones
Salvador (2015). Sierra Pie de Palo, dptos. Angaco y Caucete, San Juan, 14-02-1991, dos parejas alimentando uno y dos pichones respecticamente.
Navas y Bó (1991c). Ejemplares de San Juan y Mendoza por el desarrollo de las gónadas parecería que están comenzando su período de reproducción.



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Negro con amarillo en la base de la cola, de las remeras, el abdomen y las subcaudales.
Se diferencia del Cabecitanegra andino por tener más extendido el negro en la parte ventral.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sporagra atrata (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837) entre los 2500 y los 4000 m de altura desde Jujuy, Salta y Tucumán hasta Mendoza.
Observado en el noreste de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Andes de Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Maugeri y Liotta (2002)

Catamarca

Citas: Carma (2009); Navas y Bó (1991c); Nores (1995); Vides Almonacid (1999)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Hartert y Venturi (1909); Hellmayr (1938); Monteleone y Roesler (2005); Navas y Bó (1991c)

Observaciones: De la Peña (Tres Cruces, 09-02-1983)

La Rioja
Citas :Bodrati y Ferrari (2014); Lucero e Izasa (2015)

Mendoza
Citas: Burmeister (1861); Darrieu y Segura (2015); Navas y Bó (1991c); Olivera et al. (2009); Reed (1916); Roig (1965)

Observaciones: De la Peña (Uspallata, dpto. Las Heras, 11-01-1982)

Salta
Citas:Moschione et al. (2013); Navas y Bó (1991c); Nores (1995)

Observaciones: De la Peña (Valle Encantado, dpto. Chicoana, 05-12-1977)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (1991c); Nores (1995); Salvador (2015)

Tucumán
Citas: Capllonch (2007); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983) ; Navas y Bó (1991c); Nores (1995); Ortiz et al. (2013c)

CABECITANEGRA ANDINO *Sporagra uropygialis* (P. L. Sclater, 1862)

Otros nombres: Cabecita negra andino. Cabecita negra chileno. Cabecita negra cordillerana. Cabecita negra de capucho.

DESCRIPCIÓN
Largo: 11,5 cm.
Peso: Collar y Newton (2010): 14,0 g
Coloración. Pico y patas pardos. Iris pardo oscuro.
Cabeza, cuello y parte dorsal negros. Plumas del dorso orilladas de amarillo verdoso. Rabadilla, pecho, abdomen y subcaudales amarillos. Alas y cola negras con la base de las plumas amarillas.
La hembra es más pálida.



COMPORTAMIENTO

Alimentación
Pérez et al. (2006).**Vegetales:** Capítulode *Senecio linariifolius.*

HÁBITAT
Quebradas y estepas altoandinas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Negro con amarillo en la rabadilla, base de la cola y de las remeras y ventralmente.
Diferenciarlo del Negrillo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sporagra uropygialis(P. L. Sclater, 1862)por el oeste, desde Jujuy hasta Mendoza, Neuquén y noreste de Chubut.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monitípica. Andes de Chile, Bolivia, Argentina y Peru (migratorio)

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) ; Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Hellmayr (1938); Lönnberg (1903);

Mendoza
Citas: Olivera et al. (2009); Roig (1965)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Matarasso (2007); Pérez et al. (2006); Veiga (1993, 2001); Veiga et al. (2002, 2005)

Río Negro
Citas: Raña en Christie et al. (2004)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Fava et al. (2012a); Lucero (2013i)

CABECITANEGRA AUSTRAL *Sporagra barbata* (Molina, 1782)

Otros nombres: Cabecita negra austral. Cabecita negra patagónica. Cabecita negra de corbata. Chirigüé andino. Jilguero corbatita. Silvestrín.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12,5 cm.
Peso: Humphrey et al. (1970): N= 2 (M) X= 15,0 g; Contreras (1975): N= 161 (?) X= 15,5 g (Rango 13,0 a 19,8); Navas y Bó (1990); 1 macho 15,0 g, 2 hembras 13,7 y 15,2 X= 14,4; Christie et al. (2004): N= 4 (M) 16,0 g, N= 1 (?) 16,0 g; Camperi y Darrieu (2005): N= 4 (M) juvevil 13,7, 15,0, 16,0 y 16,2 g, N= 1 (?) 15,6 g, N= 3 (H) 12,9, 14,5 y 14,7 g
Coloración. Pico gris. Patas gris oscuro. Iris pardo.
Macho. Frente, corona, garganta y anterior del cuello, negros. Dorsal verde amarillenta, jaspeada de negro. Rabadilla verde amarillenta. Lados de la cabeza, del cuello y ventral amarillos. Abdomen blanquecino. Alas

negras con la base amarilla en las primarias y en las secundarias. Cubiertas alares negras con las puntas amarillentas. Cola negra con base amarilla.
Hembra. Sin negro en la cabeza y en la garganta. Es más olivácea.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o en grupo. Tiene un canto variado.



Alimentación
Dupuy (*in llit*.). **Vegetales:** Brote *Beta vulgaris*.
Crawshay (1907). Larvas.
Grigera (1982). **Vegetales:**Hojas y semillas no determinadas. Poligonacea.**Insectos:**Hymenoptera (Formicidae).
Archuby et al. (2007). **Vegetales:**Semilla*Anthemis* sp.*Camelina macrocarpa*, *Chenopodium* sp., *Salsola kali*, *Sisymbrium* sp., *Solanum* sp. **Insectos:** Aphididae (*Aphis* sp., *Pterocomma populeum*). Diptera (larvas). Psyllidae.
Haene et al. (2007).**Vegetales:**Fruto *Berberis buxifolia*.

HÁBITAT
Arboledas en la estepa patagónica, bordes y claros de bosques.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Mendoza, Neuquén, Chubut.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

Semiesfera de pajitas, lanas y plumas.

Uranga (*in litt*.). Camarones, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 08-12-2012, nido en Eucalipto a 3 m del suelo, 4 huevos blancos sin pintas. El 01-12-2013, 2 nidos, uno con 2 huevos completamente blancos, en un Sauce a 3-4 m de altura, el otro en un Pino a 1,90 m de altura con 3 huevos blancos sin pintas.
Astié (2003). Mendoza. Nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Christie et al. (2004). Pichones en enero.
Arenas y Bianchini (2010). Neuquén, dpto. Confluencia, 24-11-2007, se localizaron 6 nidos.

Huevos
Pone 4 ó 5 huevos azules pálidos o blanquecinos con tenues pintas o sin ellas.

Medidas
Goodall et al. (1946): 16,8 a 19,7 x 12,6 a 14,1
Arenas y Bianchini (2010): 16,0 x 12,0 y 19,0 x 1,5

PICHONES
Descripción
Arenas y Bianchini (2010). Nacen con plumón gris blancquecino en la corona y en la rabadilla.Piel anaranjada. Ojos cerrados. Pico amarillo, cavidad bual anaranjada. Patas rosadas.

Otros

Astié (2003). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*



Más información:
Arenas y Bianchini (2010)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: amarillo con la corona y la garganta, negras. Dos bandas alares amarillas. Hembra: sin corona y garganta negras y más olivácea.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sporagra barbata (Molina, 1782)desde Mendoza, La Pampa y sur de Buenos Aires hasta Tierra de Fuego. También en Santa María (Catamarca). Citada para las islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Centro y sur de Chile, Argentina e Islas Malvinas.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas:Camperi (2005); Darrieu y Camperi (2001a); Narosky y Di Giacomo (1993); Zapata (1998)

Catamarca
Observaciones: Straneck en Canevari et al. (1991)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Harris (2008); Sainz-Trápaga (2014); Vidoz (1985)

Observaciones: De la Peña (Esquel, dpto. Futaleufú, 04-02-1976)

La Pampa
Citas: Chebéz et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Navas y Bó (1986); Tejerina et al. (2006)

Mendoza
Citas: Chebez et al. (1993); Ferrer et al. (2011); Gelain (2014h)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Archuby et al. (2007); Arenas y Bianchini (2010); Contreras (1975, 1976, 1977b); Chebez et al. (1993); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (2004); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Olrog (1973); Pereyra (1951); Straneck (1990a); Veiga (2011); Veiga et al. (2005)

Observaciones: De la Peña (Viulla La Angostura, 30-01-1976)

Río Negro
Citas: Archuby et al. (2007); Becerra Serial y Grigera (2005); Bettinelli y Chebez (1986); Camperi (1998); Camperi y Darrieu (2005); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (1998, 2004); Contreras et al. (1980b); Daciuk (1977c); Gelain (1984a, 2001, 2007b, 2012b); Gelain et al. (2003) , Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubullis (1985); Grigera (1976); Grigera y Pavic (2007); Ippi y Trejo (2003); Llanos et al. (2011); Navas y Bó (1986, 1990); Paz Barreto (1997b); Peters (1923b)

Observaciones: De la Peña (San Carlos de Bariloche, dpto. Bariloche, 30-01-1976; 21-11-1998)

Santa Cruz
Citas: Cadierno y Amorós (1999); Chebez et al. (1988); Darrieu et al. (2009); Earnshaw y Earnshaw (2000); Imberti (2005); Imberti y Albrieu (2001); Peri (2013)

Observaciones: De la Peña (El Calafate, 26-01-1974)

Tierra del Fuego
Citas: Chebez y Bertonatti (1994); Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948, 1950); Reynolds (1934)

Islas Malvinas
Citas: Navas y Bó (1986); Woods (2006)



Camarones. Chubut. 08-12-2012
Foto: Máximo Uranga

Subfamilia: Euphoniinae

TANGARÁ COMÚN *Euphonia chlorotica* (Linnaeus, 1766)



Otros nombres: Bananero. Boquénse. Chingolito de la liga. Fruterito común. Fruterito de la liga. Pajarito de la liga. Tangará de cabeza amarilla. Tangará de cabeza verde. Tangará de garganta violácea. Tieté.

DESCRIPCIÓN
Largo: 11 cm
Peso: Darrieu y Camperi (1994): N= 1 (M) 13,2 g, N= 1 (H) 13,1 g; Salvador (2014a): N= 2 (M) 12,2 y 13,1 g, N= 1 (H) 12,3 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (M) 12,7 g, N= 1 (H) 11,9 g
Coloración. Pico gris azulino con punta negra. Patas pardo grisáceas. Iris pardo.
Macho. Frente y anterior de la corona amarillas. Posterior de la corona y dorsal negras azuladas. Cara, garganta y cuello negros. Resto de la parte ventral amarillo. Alas negras. Cola negra con las plumas externas mayormente blancas.

Hembra. Dorsal verde olivácea. Ventralmente verde amarillenta.



COMPORTAMIENTO

Se desplaza por lo alto de los árboles, en pareja o engrupo, a veces junto a
otrasespecies.

Alimentación

Foster (1990). **Vegetales:** Fruto *Allophylus edulis*.
Cazetta et al. (2002). **Vegetales:** *Talauma ovata.*
Di Giacomo (2005h). **Vegetales:**Frutos de *Phoradendron balansae, Phoradendron pruinosum, Rhipsalis lumbricoides.*
Bodrati (2006b). **Vegetales:**Fruto de *Plinia trunciflora.*
Bodrati y Haene (2006). Fruto de *Psychotria carthagenensis*.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:**frutos de *Psittacanthus cuneifolicus,*no determinado.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:**Fruto de *Rhipsalis* sp.

Mas información:
Voss y Sander (1981). Pineschi (1990). Gondim (2001).



Voces

Straneck (*in litt*.). Su voz es una suave y melódica doble nota: Síi . píi ... píh pi síi . píh.

HÁBITAT

Sabanas, bosques, selvas, arboledas cultivadas, selvas en galería.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta, Formosa, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N	N	N	N	N

El nido tiene forma globular, con boca amplia. Emplea fibras vegetales. Internamente cerdas. Atado y adherido a ramas.
Oculto. Elaborado.

Contino (1980). Dpto. Rivadavia, Salta, nidifica en el verano, en cactáceas o árboles, pone 4 huevos.
Di Giacomo (2005h).Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, un nido en octubre y otro en noviembre, con 3 huevos cada uno.
De la Peña (2013c). Romang, dpto. San javier, Santa Fe, 07-10-1995, nido en un Pino Elliottii, a 8 m de altura, 3 huevos.
Estructura semiesférica, globular, con entrada lateral-superior, alargado perpendicularmente.
Emplea en la construcción fibras vegetales. Internamente cerdas.
Medidas: Diámetro interno: 4 cm. Profundidad: 7 cm. Alto: 8 cm. El grosor de la pared: de 1 a 3 cm.
Rodríguez (2012b). Salta, dpto. Capital, 25-07-2011, nido en construcción a 4,5 m de altura, en octubre tenía 2 pichones.

Huevos
Pone 3 ó 4, ovoidales, blanquecinos con pintas y manchitas castañas y pardas, distribuidas por toda la superficie pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Di Giacomo (2005h): 16,6 a 18,5 x 12,0 a 12,3 X= 17,7 x 12,1 (N= 6)
De la Peña (2013c):15,5 a 16 x 12 a 12,2 X= 15,7 x 12,1 (N= 3)
: 15,5 a 16 x 12 a 12,1 (N= 3)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 1,0 a 1,3 X= 1,1 (N= 6)
De la Peña (2013c):cáscaras : 0,060 X= 0,060 (N= 3)

Generalidades
Di Giacomo (2005h). Los huevos fueron puestos en días corridos. El período de incubación es de 14 días. Los pichones permanecieron en el nido 15 días.
De la Peña (2013c). La pareja construye.Traen pajitas y se turnan para entrar al nido. Demora en la construcción 8 días. Pone los huevos en días corridos.

Más información: Di Giacomo (2005h)


Romang.Santa Fe.07-10-1995


Romang.Santa Fe.07-10-1995. Ubicación nido


Romang.Santa Fe.07-10-1995

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: frente y ventral amarillas. Garganta y dorso negro. Mancha blanca en la parte ventral de la cola.
Hembra: dorsalmente olivácea. Ventralmente verde amarillenta.
Diferenciarlo del Tangará amarillo.
La hembra es parecida a las del Tangará picudo y a la del Tangará amarillo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Euphonia chlorotica serrirostris d´Orbigny y Lafresnaye, 1837desde el norte del país hasta Mendoza, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y delta del Paraná (isla Martín García)

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinco subespecies. Extenso rango de extensión y diversos habitats desde Colombia hacia el sur hasta sureste de Brasil y Argentina. Comprende: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Bertonatti et al. (1994); Dabbene (1910); Darrieu y Camperi (2001a); De Francesco (2005); Babarskas et al. (2003)


Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Vides Almonacid (1999); White (1882)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba
Citas:Cobos et al. (1999); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas:Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Darrieu y Camperi (1994); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, 17-09-1979)



Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Muzzachiodi et al. (2003); Ronchi Virgolini et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Martelli (1995); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) ; Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005); Straneck (1990f)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1907, 1923); Pereyra (1942)

Mendoza
Citas: Astié (2003); Chebez et al. (1993); Ferrer et al. (2011); Gelain (2014h)

Misiones
Citas:Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); White (1882)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1988, 1990); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Hartert y Venturi (1909); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene et al. (1995); Nores e Yzurieta (1982b)

San Luis
Citas: Contreras (1979b); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: De la Peña (1988, 1996b, 2011f, 2013c)

Santigo del Estero
Citas: Nores et al. (1991); Salvador y Di Giacomo (2014)

Tucumán
Citas: Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Echevarría et al. (2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011, 2013)**;** Ortiz y Aráoz (2014)

TANGARÁ AMARILLO *Euphonia violacea* (Linnaeus, 1758)



Otros nombres: Bananero. Tangará violáceo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12,5 cm
Peso: Hilty (2011): 12,5-17 g
Coloración. Pico negruzco con la base de la mandíbula gris azulino. Patas gris parduscas. Iris pardo.
Macho. Frente, garganta y ventral amarillas. Corona, lados de la cabeza, cuello, dorsal, alas y cola negros violáceos. Plumas externas de la cola mayormente blancas.
Hembra. Frente amarilla. Dorsalmente olivácea. Ventralmente amarillenta con tono oliva.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Bodrati (2006b). **Vegetales:**Fruto de *Plinia trunciflora.*
Bodrati y Haene (2006). **Vegetales:**Fruto de *Psychotria carthagenensis*.

Más información:
Foster (1990).Argel-de-Oliveira et al. (1996). Krügel y Behr (1998).

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								X			

NIDO
Globular con entrada lateral. Emplea hojas, raicillas, helechos, musgos.
Uranga (*in litt.*). Puerto Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones. Nido en construcción en una enredadera a 2 m del suelo. Mediados de setiembre de 2013.
Saibene et al (1996). Parque Nacional Iguazú, nidifica.

Huevos
Pone 4 huevos blanquecinos con manchas rojas en el polo mayor.



Puerto Iguazú. Misiones. Nido en construcción. Foto: Máximo Uranga

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: negro violáceo con la frente, garganta y parte ventral amarillas. Blanco en las plumas externas de la cola. Hembra: dorsal olivácea. Ventralmente amarillenta.
Se diferencia del Tangará común por tener la garganta amarilla.
La hembra es parecida a la del Tangará picudo y a la del Tangará común.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Euphonia violacea aurantiicollis (W. Bertoni, 1901)en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies.Sud América por el este, desde Venezuela, Trinidad y Tobago, las Guayanas, este de Brasil (selva atlántica) hasta el sur, este de Paraguay y noreste de Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Euphonia violacea aurantiicollis (W. Bertoni, 1901)

Misiones
Citas: Bertoni (1913); Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1988); Pereyra(1927e); Straneck (1990g)

TANGARÁ PICUDO *Euphonia chalybea* Mikan, 1825

Otro nombre: Tangará de garganta verde.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12,5 cm.
Peso: Belton (1985): N= 1 (M) 18 g, N= 2 (H) 19 y 20 g; Hilty (2011): 18-20 g
Coloración. Pico gris azulino con punta negra. Patas gris parduscas. Iris pardo.
Macho. Dorsal, lados de la cabeza, garganta, alas y cola, verdes bronceados brillantes. Azulado en la corona. Frente y parte ventral amarillas.
Hembra. Parte dorsal y garganta oliváceas. Lados del cuello y parte ventral grises. Flancos oliváceos. Alas y cola pardas con las plumas ribeteadas de oliváceo.



HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: dorsal, garganta, alas y cola, verdes. Frente y ventral amarillas.
Hembra: dorsal olivácea. Ventral grisácea.
La hembra es parecida a las del Tangará común y a la del Tangará amarillo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Euphonia chalybea Mikan, 1825en Misiones y noreste de Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Endémico de la Selva Atlántica del sureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS
Corrientes
Citas: Contreras (1987a, 1987b); Darrieu y Camperi (1988); López-Lanús et al. (2013b)

Misiones
Citas:Bodrati et al. (2010b, 2012b); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Chebez (1996); Chebez et al (1998); Krauczuk (2009)

TANGARÁ DE CABEZA CELESTE *Euphonia cyanocephala* (Vieillot, 1818)



Otros nombres: Fruterito. Sietecolores. Tangará sietecolores. Tangará de cabeza azul. Tangará cabeza celeste.

DESCRIPCIÓN
Largo: 11 cm.
Peso: Salvador (1988):N= 1 (M)17,0 g
Coloración. Pico negruzco con la base de la mandíbula gris azulino. Patas gris oscuras. Iris pardo.

Macho. Frente, cara, garganta, dorso, alas y cola, negros violáceos. Corona y nuca celestes. Rabadilla amarilla. Ventralmente amarillo-naranja.
Hembra. Frente castaña. Corona y posterior del cuello celestes. Cara y dorso amarillos verdosos. Ventral amarilla.
Alas negras con las barbas externas ribeteadas de amarillo verdoso. Cola negra.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
De la Peña (2001d). **Vegetales:** Fruto Liga *Phoradendron liga.*
Bodrati (2006b). **Vegetales:** Fruto *Plinia trunciflora.*

Más información:
Voss y Sander (1981)

HÁBITAT
Bosques, claros en selvas, capueras, arboledas, selvas en galería.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: cabeza negra con corona y nuca celestes. Rabadilla y ventral amarillos. Hembra: frente castaña, corona y nuca celestes.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Euphonia cyanocephala aureata (Hellmayr, 1923) en Misiones, Chaco, Formosa, noreste de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, *Euphonia cyanocephala pelzelni* **P. L. Sclater, 1886**en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies.Andes de Colombia, Venezuela, Trinidad, Brasil, Paraguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Euphonia cyanocephala aureata (Hellnayr, 1923)

Corrientes
Citas: Contreras (1987b); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos
Citas: De la Peña (2012b)

Formosa
Citas:Contreras (1987c)

Misiones
Citas: Areta y Bodrati (2010); Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Contreras et al. (1994a); Hellmayr (1936); Krauczuk (2009); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1988); Pereyra(1927e); Zotta (1940)

Santa Fe
Citas: De la Peña (1996b); Giraudo et al. (2008)

Euphonia cyanocephala pelzelni P. L. Sclater, 1886

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009); Nores y Yzurieta (1981)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Esteban (1953); Malizia et al. (2005); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988); Straneck (1990f)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

San Luis
Citas: Casares (1944)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983) ; Ortiz et al. (2011, 2013); Ortiz y Aráoz (2014)

TANGARÁ ALCALDE *Euphonia pectoralis* (Latham, 1801)

Otros nombres: Alcalde. Tangará de vientre castaño. Tangará negro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12 cm.
Peso: Hilty (2011): 15-16,5 g
Coloración. Pico negruzco con la base de la mandíbula gris azulino. Patas gris parduscas. Iris pardo.

Macho. Azul oscuro. Lados del pecho amarillos. Inferior del pecho, vientre y subcaudales castaños.
Hembra. Dorsal olivácea. Ventral grisácea, con vientre y flancos amarillentos oliváceos. Subcaudales castañas.



COMPORTAMIENTO

Alimentación
Bodrati y Haene (2006). **Vegetales:** Frutos de *Rapanea acuminata, Psychotria carthagenensis*.
Bodrati (2006b).**Vegetales:** Fruto *Plinia trunciflora.*
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales:** Frutos, no determinados.

Más información en:
Foster (990). Lopes et al. (2005).

Voces
Straneck (*in litt*.). Su voz es un áspero y atípico Chechechechecheche.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N			N	



Globular con entrada lateral superior. Emplea tallos, fibras vegetales y musgos, liados con telas de arañas.

Castelino y Saibene (1989). Parque Nacional Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 10-11-1987, nido globoso con entrada lateral superior, construido con tallitos y fibras vegetales finas y musgos, liados con telas de arañas. Estaba en un paredón rocoso oculto por orquídeas y otras epífitas. Contenía 3 huevos. El 15-11-1988 otro nido en una cavidad en una pared rocosa, construido con musgos y fibras de Marasmiun en el lecho de la cámara. Contenía 2 huevos.

Huevos

Pone 3 huevos, blancos con puntos y pecas marrones rojizas, más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Castelino y Saibene (1989): 18,5 a 18,8 x 13,5 a 13,6

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: azul. Vientre castaño. Plumas amarillas a los lados del pecho. Hembra: ventralmente grisácea, subcaudales castañas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Euphonia pectoralis (Latham, 1801) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Selva Atlántica o Paranaense en el este de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES

Misiones
Citas:Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Martínez Gamba (2014); Militello y Chebez (2009); Navas y Bó (1988); Straneck (1990g)

Observaciones: De la Peña (Puerto Rico, 11-02-1973)

TANGARÁ BONITO *Chlorophonia cyanea* (Thunberg, 1822)



Otros nombres: Bonito. Bonito del campo. Saira. Siete colores. Tangará de cabeza verde. Tangará de espalda azul.

DESCRIPCIÓN
Largo: 11 cm.
Peso: Hilty (2011): 11-15 g
Coloración. Pico negruzco. Patas gris parduscas. Iris pardo.

Coloración.Macho. Cabeza verde. Regiones perioculares y dorso celestes. Garganta y pecho verdes. Resto de la parte ventral amarillo. Alas pardas con las barbas externas ribeteadas de verde, las cubiertas alares y las secundarias celestes. Cola negra.
Hembra. Dorsal verde. Franja nucal celeste. Ventral amarilla verdosa. Alas y cola como el macho.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Bodrati (2006b). Vegetales: Fruto*Plinia trunciflora.*

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N		

Globoso con entrada inferior. Emplea musgos.

Castelino y Saibene (1989). Parque Nacional Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 20-10-1986, nido con un huevo. El día 22 tenía 2 huevos. Nido globoso con entrada inferior, en una pared rocosa tapizada por musgos,

líquenes y diversas epífitas. Totalmente construido con musgos. El interior revestido con fibras de *Marasmius*.
Altura 13 cm; ancho 14,5 cm; Distancia de la boca a la pared trasera: 7 cm. Boba de 3x4 cm.



Huevos
Pone 2 huevos blanco rosados con puntos y pecas canelas en toda la superficie, pero más concentrados en el polo mayor.

Medidas
Castelino y Saibene (1989): 18,3 a 18,9 x 12,3 a 12,6

Peso
Castelino y Saibene (1989): 1,6 y 1,5

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: cabeza verde, regiones perioculares y dorso celestes. Ventral amarilla. Hembra: verde en dorsal, amarilla en ventral. Franja nucal celeste.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Chlorophonia cyanea cyanea (Thunberg, 1822)en Misiones y noreste de Corrientes y *Chlorophonia cyanea longipennis* (Du Bus de Gisignies, 1855)en Jujuy y Salta.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Se extiende por una extensa región alrededor de Amazonia en áreas separadas que comprenden: Guyana, norte de Brasil, Andes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y una región de selva Atántica del este de Paraguay, sureste de Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chlorophonia cyanea cyanea (Thunberg, 1822)

Corrientes
Citas:Contreras (1987a., 1987b); Darrieu y Camperi (1988)

Misiones
Citas:Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Castelino y Saibene (1989); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2009); Martínez Gamba (2014)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 07-02-1975)

Chlorophonia cyanea longipennis (Du Bus de Gisignies, 1855)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Bettinelli en Chebez (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Di Giacomo, A. G., et al. (1995)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

GORRIÓN

FAMILIA: PASSERIDAE

Aves de pico grueso.

Se alimentan de semillas, granos, insectos, desperdicios.

Construyen el nido con pajas y plumas, lo ubican en lugares diversos.

Frecuentan praderas, arboledas, poblaciones.

GORRIÓN *Passer domesticus*

Otros nombres: Gorrión casero. Gorrión doméstico. Paria. Pásula. Pichitanca.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14,5 cm.

Peso: Humphrey et al. (1970): N= 1 (M) 26,5 g; Salvador (1990a): N= 6 (M) X= 27,3 g (Rango 24,5 a 28,5, N= 5 (H) X= 26,7 g (Rango 24,5 a 27,5); Camperi (1992c): N= 3 (M) X= 30,8 g (Rango 27,5 a 35,0); N= 10 (H) X= 30,4 g (Rango 28,0 a 34,0); Christie et al. (2004): N= 2 (M) 27,0 y 28,5 g, N= 2 (H) 24,0 y 32,0 g; Salvador (2014a): N= 15 (M) X= 30,1 g (Rango 24,5 a 32,6), N= 16 (H) X= 28,5 g (Rango 26,9 a 31); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 32 (M) X= 29,3 g (Rango 22,0 a 34,5), N= 20 (H) X= 29,7 g (Rango 21,2 a 36,0)
Coloración. Pico, patas e iris pardo.
Macho. Frente, corona y rabadilla grises. Franja nucal castaña. Dorsal estriada de negro y castaño. Garganta y pecho negros. Resto de la parte ventral blanquecino. Alas y cola pardas. Cubiertas alares menores castañas. Medianas negruzcas con puntas blancas.
Hembra. Dorsalmente parda estriada de negro en el manto. Ventral grisácea.


Esperanza. 19-09-2015


Esperanza. 19-09-2015

COMPORTAMIENTO
Se desplaza por el suelo dando saltitos. Es omnívoro.
De la Peña (2011a). Recolecta en el suelo, vegetación herbácea, ramas, follaje, aire. Caza al vuelo.
Es confiado, bullanguero. Durante el cortejo el macho salta con las alas entreabiertas alrededor de la hembra. Se pelean en forma “encarnizada”

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa). **Vegetales:** Semillas de Yuyo blanco (*Chenopodium album*), Santa Lucía (*Commelina erecta*), Capín (*Echinochloa colona*). Hojas de rayito de sol (*Lamprantus productus*). Flor y hoja de Flor de seda (*Portulaca grandiflora*)
Dupuy(in llit.). **Vegetales:**Semillas de *Pinus ponderosa.*
Marelli (1919). **Vegetales:**Semillas no determinadas. **Insectos:**Larvas.
Aravena (1928). **Vegetales:**Semillas no determinadas. **Insectos:**Coleópteros. Hormigas aladas. Lepidópteros (larvas).
Zotta (1936). **Vegetales:**Semillas no determinadas. **Otros:** arena.
Zotta (1940). **Vegetales:**Semillas no determinadas, Vegetales. **Insectos:**Coleópteros. Orthópteros. Lepidópteros (larvas). **Otros:** minerales.
Humphrey et al. (1970). **Vegetales:**Semillas no determinadas.
Williamson (1975). **Vegetales:**Hojas de *Artemisia* sp., *Atriplex* sp., *Centaurea* sp.,*Cineraria* sp., *Grabowskia duplicata, Mesembryanthemum* sp.**Insectos:**Insectos, orugas.
Contino (1980). **Vegetales:**Frutosno determinados. **Insectos. Otros:** desperdicios.
Klimaitis (1993). **Vegetales:**Semillas no determinadas, Vegetales. **Insectos. Otros:** Piedritas.
Leveau (2008).**Vegetales:**Néctar*Aloe arborescens.*
Salvador y Salvador en (De la Peña y Salvador 2010).**Vegetales:**Semillas de *Amaramthus* sp., *Chenopodium* sp., *Panicum mileaceum*, *Sorghum* sp.,Fruto de *Ligustrum* sp.**Insectos:**Coleoptera. Homoptera (Aphidae). Isoptera (termitas aladas). Lepidoptera (orugas, polillas). Orthoptera (Acridiidae, Tettigonidae). **Otros:** arena.
Salvadoren (De la Peña y Salvador 2010).**Insectos:** Ephemeroptera. Lepidoptera (Pieridae. *Colias lesbia*: orugas).
De la Peña en (De la Peña y Salvador 2010).**Insectos:** Mosquitos. **Otros:**Pan.
De la Peña (2010). **Vegetales:** Hojas de *Beta vulgaris*, *Cichorium intybus*, *Lactuca sativa*, *Lycopersicon esculentum.* Frutos de *Ficus carica.* Semillas de *Cynodon dactylon*, *Euphorbia serpens*, *Poa annua, Setaria parviflora.***Insectos:**Grillo (*Gryllus argentinus*).
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.



Voces
Stranceck (*in litt*.). Su voz es poco melodiosa. El macho emite una voz de cortejo bisilábica, Shilip . shilip ... shilip .. shilip

HÁBITAT
Áreas rurales, praderas arboladas, orillas de bosques, poblaciones.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Santa Cruz.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N					N	N	N	N


El nido es globular. Emplea pajas e internamente plumas. Lo ubica en árboles, huecos, nidos abandonados, recipientes, construcciones.Expuesto. Elaborado

Pereyra (1938b). Noreste de la provincia de Buenos Aires, nidifica.



Zapata y Cabrera (1969). Chasicó, pdo. Villarino, Buenos Aires, 10-11-1967 nido con 3 huevos.
Burger (1976). Venado Tuerto y Murphy, dpto. Gral. López, Santa Fe, octubre-noviembrede 1972, nidos en nidos de *Furnarius rufus*.
Salvador (1983b). Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 1979 a 1983, el 4,4 % (2 de 45) de los nidos estaban parasitados por *Molothrus bonariensis*.
Salvador y Salvador (1984). Villa María, dpto. San Martín, Córdoba, 2 nidos: 24-10-1980, 2 huevos propios y 1 de *Molothrus bonariensis*; 21-10-1980, 2 huevos propios y 1 de *Molothrus bonariensis.*
Darrieu et al. (1988). Punta Lara, pdo. Ensenada, Buenos Aires, 1974 a 1978, nidificando.
Nores y Nores (1994). Córdoba, nido en uno de Cacholote castaño (*Pseudoseisura lophotes*)
Alabarce y Antelo (1998). San Felipe, dpto. Lules, Tucumán, nido en uno de Hornero en octubre.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, Córdoba, nidifica.
Christie et al. (2004).Nidos en noviembre-diciembre.
Albrieu et al. (2004). Estuario del río Gallegos, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, nidifica entre setiembre y abril-mayo.
Salvador y Bodrati (2014a). Cosquín y La Falda, Córdoba, J. Heredia, localizó nidos parasitados por *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Bodrati (2014a). Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, Bodrati observó una pareja alimentando un pichón de *Molothrus bonariensis.*
Salvador y Bodrati (2014a). San Isidro, pdo. San Isidro, Buenos Aires, Bodrati observó una hembraa alimentando un volantón de *Molothrus bonariensis.*
Leiva et al. (2004). Recreo, dpto. La Capital, Santa Fe, nido en el interior de un nido de nido *Furnarius rufus.*Construido predominantemente con fibras vegetales de gramíneas entretejidas y en menor medida, con fibras algodonosas y fragmentos de bolsas de naylon.
Salvador (2012c).Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, entre 1979 y 2005se localizaron 51 nidos en nidos abandonados de otras aves.
De la Peña (2013c). Nidos observados: 28, desde el 01-10-1972 al 02-10-2004, todos en provincia de Santa Fe.
Segura et al. (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 3 nidos.

Huevos
Pone 4 ó 5 huevos, ovoidales, blancos grisáceos o grises celestes, con pintas pardas y grises, distribuidas por toda la superficie.





Medidas
Smyth (1928): 21,5 a 23,5 x 14,5 a 16,5
Pereyra (1938b): 23,0 a 25,5 x 14,5 a 17,0
Zapata y Cabrera (1969): 21,2 a 22,3 x 15,3 a 15,7 X= 21,7 x 15,5 (N= 3)
Alabarce y Antelo (1998): 21,9 X 15,9
De la Peña (2013c): 20,7 a 23,5 x 15 a 16,7 X= 22,3 x 15,8 (N= 26)

Peso
Zapata y Cabrera (1969): X= 3 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,165 a 0,201 X= 0,192 (N= 26)
De la Peña (2013c):

PICHONES
Descripción.
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Implumes.
3 días
Ojos abiertos. Vivaracho. Implume, excepto alas y cola. Vestigios de vainas en las zonas ptéridas. Pico color natural. Comisura amarillo fuerte. Cavidad bucal rojiza, parte anterior del paladar amarillo.
5 días
Aparecen las láminas. Ventralmente las plumas son blanquecinas. En las alas se ven las dos bandas.
7 días
Bastante emplumado. Color de macho adulto.
10 días
Plumaje de adulto. Pico fuerte. Comisura amarilla. Interior del borde del pico amarillo.

MEDIDAS Y PESOS

Dias de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o canón	Lámina	Vaina o canón	Lámina		
1									1,9
2	0,5	0,9	1,2						2,5
3	0,8	1,5-1,6	2,3-2,5	0,5-0,7		0,5-0,7		0,2-0,4	4,2
4	0,8	1,7-2,0	2,7	1,2		1,0		0,6	7,5
5	0,9	1,9-2,3	3	1,7		1,4		1,1	13,3-15,5
6	0,9	2,4	3,1	1,8		1,5		1,5	14,0-17,0
7	0,9	2,6	3,2	1,9	0,7-1,3	1,4-1,6	0,7-0,9	2,0	16,0-19,2
8	0,9	2,7	3,3	2,0	1,8	1,7	1,2	2,3	18,0-21,2
9	0,9	2,8	3,5	2,1	2,2	1,8	1,7	2,5	20,2-24,3
10	0,9	2,9	3,6	2,1	2,7	1,9	2,1	2,7	22,7-26,7

Generalidades
De la Peña (2013c). Demora en construcción del nido de 10 a 15 días. Los huevos son puestos en días corridos.
Período de incubación de 15 días. Los pichones nacen dentro de las 24 horas y permanecen en el nido 14-15 días.

Otros
Pereyra (1937c)**.**Un ejemplar con Albinismo parcial.
Haro (2002). Un ejemplar con Albinismo parcial.
De la Peña y Bruno (2008). Un ejemplar Albino, en Esperanza (M. de la Peña) y otro en Rorario (F. Bruno).
Turienzo y Di Iorio (2010). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Salvador (1983b). Salvador y Salvador (1984). Salvador y Bodrati (2014a). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

Depredación
De adultos: *Tyto alba* (Morici 1990a)

Más información: Salvador (1983b)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho: garganta y pecho, negros. Corona gris. Nuca castaña. Hembra: dorsal, parda estriada. Ventral grisácea.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Passer domesticus domesticus (Linnaeus, 1758)en todo el país, islas Malvinas y Georgia del Sur.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Doce subespecies. Originario de Eurasia. Mediante introducciones se ha extendido practicamente a todo el mundo. Llegó a Sud América, siendo introducido por Buenos Aires en 1873.


Esperanza. Santa Fe. 06-12-2014.Alimentando al pichón


Esperanza. Santa Fe. 24-09-2014.Baño


Esperanza.Santa Fe.01-01-2011. Juvenil


Esperanza.Santa Fe.10-10-2010. Macho





Esperanza.Santa Fe.12-01-2011



Esperanza. Santa Fe. 06-12-2014. Alimentando al pichón



Esperanza.Santa Fe.03-11-2010

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Passer domesticus domesticus (Linnaeus, 1758)

Buenos Aires

Citas: Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi (1992c); Codesido et al. (2011); Dabbene (1919b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Klimaitis (1977c., 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2004, 2004b, 2005, 2006, 2011b); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Montaldo y Claver (1986); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Salvador y Di Giacomo (2014); Turienzo y di Giori (2010); Zapata (1998)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 07-02-1976)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2002 (2004); Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (El Alto, dpto. El Alto, 29-01-1977; El Alamito, dpto. Andalgalá, 16-12-1999)



Chaco
Citas:Chatellenaz (2005)

Observaciones: De la Peña (Basail, dpto. San Fernando, 27-08-1987)

Chubut
Citas: Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Esquel, dpto. Futaleufú, 02-02-1976; Puerto Madryn, dpto. Biedma, 27-11-2000)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Castellanos (1934); Haro (2002); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador(1983, 1990a, 2012c); Turienzo y di Giori (2010); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 28-02-1976; Las Vertientes, dpto. Río Cuarto, 13-10-2004; Jesús María, dpto. Colón, 23-10-2004)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1987b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918); Short (1971); Wilson (1977)

Observaciones: De la Peña (Corrientes, dpto. Capital, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Muzzachiodi (2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975)

Formosa
Citas:Contreras (1987c); Di Giacomo(2005h); López Lanús (1997); Narosky y Martelli (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2013); Chebez et al. (1998); Lucero (1982); Moschione y Segovia (2005)

Observaciones: De la Peña (San Salvador de Jujuy, dpto. Capital, 01-02-1977)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011a); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler (1984); Siegenthaler et al. (1990); Wetmore (1926b); Williamson (1975)

Observaciones: De la Peña (Realicó, dpto. Realicó, 19-11-1998)

La Rioja
Citas:Giacomelli (1923); Hayward (1967)

Observaciones: De la Peña (Chilecito, dpto. Chilecitop, 08-02-1977)

Mendoza
Citas: Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu y Segura (2015); Gómez (2006, 2013); López de Casenave (2001); Lucero (2013f); Marone (1992a); Olivera et al. (2009); Roig (1965); Sanzín (1918); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (Uspallata, dpto. Las Heras, 11-01-1982; Malargüe, dpto. Malargüe, 15-10-2004)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Chebez (1996a); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Observaciones: De la Peña (Puerto Iguazú, dpto. Iguazú, 13-10-81)

Neuquén
Citas:Babarskas y Renaudeau D´arc (1995); Christie et al. (1988, 2004); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (Villa La Angostura, dpto. Los Lagos, 30-01-1976)

Río Negro
Citas:Camperi (1998); Camperi y Darrieu (2005); Christie et al. (1998, 2004); Contreras et al. (1980b); Gelain (2001, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubullis (1985); Llanos et al. (2011); Pérezy Petracci (1998)

Observaciones: De la Peña (San Carlos de Bariloche, dpto. Bariloche, 30-01-1976)

Salta
Citas:Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Salta, dpto. La Capital, 01-02-1977)

San Juan
Citas: Gelain (2008a); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Lucero (1013f, 2013i); Serié (1923)

Observaciones: De la Peña (Talacasto, dpto. Ullún, 15-01-1982)

San Luis
Citas: Casares (1944); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)

Observaciones: De la Peña (San Luis, dpto. La Capital, 10-01-1982; Mercedes, dpto. Pedernera, 13-10-2004)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Chebez et al. (1998); De Lucca y Saggese (1992); Humphrey et al. (1985); Imberti (2005); Imberti y Albrieu (2001); Zapata (1967)

Observaciones: De la Peña (Río Turbio, dpto. Güer Aike, 09-11-1979)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson, A. S. (1926)

Santiago del Estero
Citas:Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Santiago del Estero, dpto. Capital, 29-01-1977)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996, 1998); Antelo y Brandán (2006); Antelo et al. (2013); Capllonch (2007); Capllonch y Aráoz (2007); Echevarría et al. (2011b); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Marigliano et al. (2010); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014)

Observaciones: De la Peña (San Miguel de Tucumán, dpto. Capital, 30-01-1977)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Keith (1970)

Islas Malvinas
Citas: Dabbene (1923e); Wace (1921); Woods (2006)

Georgias del Sur
Citas: Princey Croxall (1996)

Seco Pon, J. P. y M. Favero. 2013. Registro de aves continentales a bordo de buques pesqueros en aguas argentinas. Nuestras aves 58: 41-43.

Alta mar
Seco Pon y Favero (2013)

BIBLIOGRAFÍA

Acevedo, D. y F. Bruno. 2007. Lista de Aves del Parque Don Tomás. Santa Rosa, La Pampa. Editorial L y M. Gral. Acha. La Pampa.

Acosta, J. C. y F. Murúa. 2001. Inventario de la avifauna del Parque Natural Ischigualasto, San Juan, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie Nº 3: 1-4.

Aguerre, G., P. F. Petracci y M. Zamorano. 2008. Confirmación de la reproducción del Estornino crestado (*Acridotheres cristatellus*) en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 53:19.

Alabarce, E. A. y C. M. Antelo. 1996. Organización temporal de una taxocenosis de aves en un ambiente secundario, en la provincia de Tucumán. Acta Zool. Lilloana 43: 411-425.

Alabarce, E. A. y C. M. Antelo. 1998. Comentarios sobre una ornitocenosis nidificante en la provincia de Tucumán. Acta Zool. Lilloana 44: 223-229.

Alabarce, E. A. y M. M. Lucero. 1977. Observaciones sobre el paso de migraciones en el alto Pilcomayo. Hornero 11: 410-412.

Albrieu, C., S. Imberti y S. Ferrari. 2004. Las aves de la Patagonia Sur. El estuario de Río Gallegos y zonas aledañas. Ed. U.N. de la Patagonia Austral. Río Gallegos. 204 pp.

Alderete, C. A. y P. Capllonch. 2012. Peso de aves de las familias Emberizidae y Cardinalidae en la Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda serie. 94: 1-10.

Alderete, C. y P. Capllonch. 2010. Pesos de aves suboscines de Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 58: 1-12.

Alessio, V. G., A. H. Beltzer, R. C. Lajmanovich y M. A. Quiroga. 2005. Ecología alimentaria de algunas especies de Passeriformes (Furnariidae, Tyrannidae, Icteridae y Emberizidae): consideraciones sobre algunos aspectos del nicho ecológico. Insugeo, Miscelánea 14: 441-482.

Andors, A. V. y F. Vuilleumier. 1995. Breeding of *Anthus furcatus* (Aves: Motacillidae) in northern patagonia, with a review of the breeding biology of the species. Ornitología Neotropical 6: 37-52.

Andreau, M. y D. P. Fernández. 2010. Predación del Juan Chiviro (*Cyclarhis gujanensis*) sobre aves, murciélagos, reptiles y anfibios. Nuestras Aves 55: 43-45.

Antelo, C. M. y E. A. Alabarce.2002. Alimentación y morfometría de aves insectívoras de un sector del bosque Chaqueño (Tucumán-Argentina). Acta Zool. Lilloana 46: 123-129.

Antelo, C. M. y Z. J. Brandán. 2006. Presencia estacional de la avifauna de las Yungas en un ambiente urbanizado del departamento Yerba Buena (Tucumán, Argentina). Acta Zool. Lilloana 50 (1-2): 61-70

Antelo, C. M., N. L. Marigliano, Z. J. Brandán y C. I. Navarro. 2013. Avifauna asociada a sectores de bosques ribereños con modificaciones antropogénicas (Tucumán, Argentina): II. Ensambles presentes en estación seca y su relación con elementos estructurales del hábitat. Acta Zoológica Lilloana. 57 (1): 42-56.

Antoniazzi, L. R. 2006. Cachilo corona castaña (*Aimophila strigiceps*) y Loica pampeana (*Sturnella defilippi*) en el sudeste de la provincia de Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 52: 32-33.

Antoniazzi, L. R., D. E. Manzoli, D. Rohrmann, M. J. Saravia, L. Silvestre y P. M. Beldomenico. 2011. Climate variablility effects the impact of parasitic flies on Argentinean forest birds. Journal of Zoology.283: 126-134.

Arenas, C. y M. Bianchini. 2010. Registros de nidificación del Cabecitanegra austral (*Carduelis barbata*) en la ciudad de Neuquén Capital, Provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 55: 1-10.

Areta, J. I. y A. Bodrati. 2008b. Comportamiento, identificación y relación con la floración de cañas del Espiguero negro (*Tiaris fuliginosa*) en Misiones, Argentina. Hornero 23: 77-86.

Areta, J. I. y M. Repenning. 2011b. Systematics of the Tawny-Bellied Seedeater (Sporophila hypoxantha). II.. Taxonomy and evolutionary implications of the existence of a new tawny morph.Condor 113: 678-690.

Areta, J. I., A. Bodrati y K. Cockle. 2009. Specializotion on *Guadua* Bamboo seeds by three birds species in the Atlantic Forest of Argentina. Biotropica 41: 66-73.

Areta, J. I., E. Jordán, H. Luna y M. Manassero. 2014b. Registros documentados de aves a orillas del río Paraná y de visitantes invernales en Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 59: 18-21.

Areta, J. I., M. Pearman y R. Ábalos. 2012b. Taxonomy and biogeography of the Monte Yellow-Finch (*Sicalis mendozae*): understanding the endemic avifauna of Argentina ´s monte desert. The Condor: 114 (3): 654-671.

Argel-de-Oliveira, M. M., G. D. A. Castiglioni e S. B. de Souza. 1996. Comportamiento alimentar de aves frugívoras em *Trema micrantha* (Ulmaceae) em duas áreas alteradas do sudeste brasileiro. Ararajuba 4: 51-55.

Astié, A. A. y J. C. Reboreda. 2005. Creamy-Bellied Thrush defenses against Shiny Cowbird brood parasitism. Condor, 107: 788-796.

Astié, A. A. y J. C. Reboreda. 2006. Costs of egg punctures and parasitism by shinycowbirds (*Molothrus bonariensis*) at creamy-bellie-dthrush (*Turdus amaurochalinus*) nests. The Auk, 123 (1): 23-32.

Astié, A. A. y J. C. Reboreda. 2009b. Function of egg punctures by Shiny Cowbird in parasitized and non parasitized Creamy-bellied Thrush nests. Journal of Field Ornithology, 80 (4): 336-343.

Atwood, J. L. y S. B. Lerman. 2006. Family Polioptilidae (Gnatcatchers). Pp. 350-376 en del Hoyo, J., Elliott A. &

Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 11. Old World Flycatchers to Old Worl Warblers. Lynx Edicions, Barcelona.

Auer, S. K., Bassar, R. D., Fontaine, J. J. y T. E. Martin. 2007. Breeding biology of passerines in a subtropical montane forest in northwestern Argentina. Condor 109: 321-333.

Azpiroz, A., M. Mattalia, B. López-Lanús y L. L. Sosa. 2013. Caracterización ornitológia y productiva del campo "Gral Ávalos" Monte Caseros, Corrientes, informe técnico de Aves Argentinas/AOP: diciembre 2010. En pp. 351-373: G. D. Marino, F. Miñarro, M. E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.

Azzarri, D. E., L. Ferro y P. G. Grillo. 2011. Leucismo en dos especies de zorzales en la Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda serie. 74: 1-3.

Babarskas, M. y B. López Lanús. 1993. Nidos nuevos o poco conocidos para la provincia de Buenos Aires. Nuestras aves 28: 27-28.

Babarskas, M. y P. Flombaum.1998. Nuevos registros de aves para la provincia de Chubut, Argentina. Nuestras Aves 38: 13-14.

Babarskas, M., E. Haene y J. Pereira.2003. Aves de la Reserva Natural Otamendi. En Haene, E. y J. Pereira (Eds.). Fauna de Otamendi. Inventario de los animales vertebrados de la Reserva Natural Otamendi, Campana, Buenos Aires, Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación. Monografía de aves argentinas 3: 47-113. Aves Argentinas/AOP. Buenos Aires.

Babarskas, M., J. O. Veiga y F. C. Filiberto.1995. Inventario de Aves del Parque Nacional El Rey, Salta, Argentina. Monografía Especial L. O. L. A. Nº 6, 44 Págs. Buenos Aires.

Babarskas, M., J. Veiga y F. Filiberto.1996. Nuevos registros de aves para la provincia de Neuquén. Nuestras Aves 34: 44-46. Buenos Aires.

Baldo, J. L. y M. Ordano.1993. Nuevos registros de aves para Sierra Grande, departamentos San Alberto, Santa María y Punilla, provincia de Córdoba, República Argentina. Nótulas Faunísticas 48: 1-5.

Banchs, R. A. y R. M. Fraga. 1994. Supervivencia de nidos de Cardenal de cresta roja (*Paroaria coronata*) en ambientes modificados del Chaco argentino. Vida Silvestre Neotropical 3: 91-95.

Barros, R. 1930. Sobre algunas aves de la Alta Cordillera de Mendoza. Rev. Chil. de Hist. Nat. 34: 312-320.

Barrows, W. 1883b. Birds of the lower Uruguay. Bull. Nuttall Orn. Club 8: 198-212.

Becerra Serial, R y D. Grigera. 2005. Dinámica estacional del ensamble de aves de un bosque norpatagónico de Lenga (*Nothofagus pumilio*) y su relación con la disponibilidad de sustratos de alimentación. Hornero 20: 13-139

Belton, W. 1985. Birds of Río Grande do Sul, Brazil. Part 2: Formicariidae through Corvidae. Bull. of the Am. Mus. of Nat. Hist. Vol. 180: art. 1. N. York.

Beltzer, A. H. y G. Paporello. 1983. Alimentación de aves en el valle aluvial del río Paraná. IV. *Agelaius cyanopus cyanopus* Vieillot, 1819 (Passeriformes, Icteridae). Iheringia, Sér. Zool. Porto Alegre 62: 55-60.

Beltzer, A. H., B. Comini, S. Latino y M. Quiroga. 1999. Alimentary biology of the Golden billed Saltator *Saltator aurantiirostris* (Aves: Emberizidae) in the Paraná river floodplain (Argentina). Anales de Biología, 22 (Biología animal, 11) (1997) 1999: 51-60.

Beltzer, A. H., M. A. Quiroga y A. L. Bortoluzzi. 2003-2004. Variación estacional de la comunidad de aves en un ambiente lenítico del valle de inundación del río Paraná. Natura Neotropicalis 34 y 35: 33-37.

Beltzer, A. H., P. A. Collins y M. A. Quiroga. 2006. Atlas ornitogeográfico de la provincia de Entre Ríos. Serie Climax Nº 13.Ceride-Conicet. Santa Fe.

Beltzer, A. H.1986c. Estudio preliminar de la avifauna de la Laguna del Cristal (Cuenca del río Saladillo, Santa Fe, Argentina). Historia Natural 8: 65-74.

Beltzer, A. H.1988c.Consideraciones sobre la ecología alimentaria del Chiviro de isla *Saltator coerulescens* y el Chiviro de corbata *Saltator aurantiirostris aurantiirostris* (Aves: Emberizidae) en el valle aluvial del río Paraná medio, Argentina. Studies on Neotropical Fauna and Environment (Holanda) 23 (1): 9-23.

Benstead, P. J., C. J. S. Jeffs y R. D. Hearn. 1998. Riparian bird densities along four tributaries of the río Paraná in north-east Argentina. Hornero 15: 68-71.

Bertonatti, C. C. y P. E. Sutton. 1986. Notas sobre dos especies de la avifauna del partido de Mar Chiquita (Provincia de Buenos Aires). Nuestras Aves 10: 12-13.

Bertonatti, C. y A. L. Guerra. 1997. Hibridación entre Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) y Diuca común (*Diuca ciuca minor*) en estado silvestre, en la Argentina. Hornero 14: 235-242.

Bertonatti, C. y A. López Guerra. 2001. Nuevos registros de híbridos entre Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) y Diuca común (*Diuca diuca minor*). Nuestras Aves 41: 27.

Bertonatti, C., T. Narosky y V. Rodríguez Baiguera.1994. Contribución al conocimiento de la avifauna de Martín García. Nuestras Aves 30: 30-31.

Bertoni, A. de W. 1926. Apuntes ornitológicos. Hornero 3: 396-401.

Bertoni, A. de W.1913. Contribución para un catálogo de aves argentinas. An. Soc. Cient. Arg. 75: 64-102.

Bertoni, A. de W.1918c. Nidos de aves poco conocidos. Hornero 1: 190-191.

Bertoni, A. de W.1919b. Apuntes sobre aves del Paraguay. Hornero 1: 284-287.

Bertoni, A. de W.1939. Revista Sociedad Científica. Paraguay, 4: 1-59.

Bettinelli, M. D. y J. C. Chebez.1986. Notas sobre aves de la meseta de Somuncurá, Río Negro, Argentina. Hornero 12: 230-234.

Bianchini, M. y C. Arenas. 2014b. Registros documentados de aves con picos deformados en Argentina. Nuestras Aves 59: 12-13.

Chatellenaz, M. L. 2008b. Ecología alimentaria de dos especies simpátricas del género Basileuterus en el noreste de Argentina. Hornero 23: 87-93.

Bianchini, M. y C. Arenas. 2013b. Nuevos registros de aves accidentales y aportes a la distribución geográfica de algunas especies de aves para la Argentina. Parte II: No paseriformes. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 129: 1-6.

Blake, J. G. y M. Rougés. 1997. Variation in capture rates of understory birds in El Rey National Park, northwestern Argentina. Ornitología Neotropical 8: 185-193.

Blendinger, P. G. 1999. Facilitation of sap-feeding birds by the Withe-Fronted Woodpecker in the monte desert, Argentina. Condor 101: 402-407.

Blendinger, P. G. y M. E. Alvarez. 2002. Ensamble de aves de los bañados de Carilauquen (Laguna Llancanello, Mendoza, Argentina) consideraciones para su conservación. Hornero 17: 71-83.

Blendinger, P. G. y R. A. Ojeda. 2001. Seed supply as a limiting factor for granivorous bird assemblages in the Monte Desert, Argentina. Austral Ecology, 26 : 413-422.

Blendinger, P. G.1998. Registro de aves poco frecuentes en la Argentina y sector antártico argentino. Nuestras Aves 38: 5-8.

Bodrati, A. y A. Pietrek. 2000. Relevamiento de los recursos biológicos del Parque Provincial "Pampa del Indio" (Departamento Libertador Gral. San Martín, Chaco). AOP. Inf. Inéd. Buenos Aires.

Bodrati, A. y C. Ferrari. 2014. Notas sobre 36 especies de aves nuevas o poco conocidas para la provincia de La Rioja, Argentina. Nuestras Aves 59: 30-42.

Bodrati, A. y E. Haene. 2006. Planta que atraen aves. Jazmín del Monte. Aves argentinas revista de Naturaleza y conservación. Nº 18: 21.

Bodrati, A. y E. Haene. 2008. Planta que atraen aves. Chal-chal o koku. Aves argentinas revista de Naturaleza y conservación. Nº 18: 16-17.

Bodrati, A. y K. Cockle. 2006b. New records of rare and threatened birds from the revista ornit Forest of Misiones, Argentina. Cotinga 26: 20-24.

Bodrati, A. y R. M. Fraga. 2010. Frequent parasitism of Golden-winged Cacique (*Cacicus chrysopterus*) by Shiny Cowbirds (*Molothrus bonariensis*) in the Chaco region of Argentina and Paraguay. Revista Brasileira de Ornitología. 18: 110-112.

Bodrati, A., C. Maders, G. Di Santo, K. Cockle, J. I. Areta y J. M. Segovia. 2009b. Distribución, hábitat y historia natural del Bailarín castaño *Piprites pileata*, una especie críticamente amenzada en Argentina. Cotinga 31: 95-100.

Bodrati, A., E. Mérida, G. Bodrati y E. Sierra. 2006b. Avifauna del talar de Vuelta de Obligado y de sus ambientes contigüos. San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. En: Mérida, E. y J. Athor (Editores). Talares bonaerenses y su conservación. Fundación de Historia Natural "Félix de Azara". Buenos Aires.

Bodrati, A., G. Bodrati, C. Ferrari, E. Mérida y E. Haene. 1997b. Notas sobre la avifauna de Baradero, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 37: 2-4.

Bodrati, A., I. Roesler, J. I. Areta, L. G. Pagano, E. A. Jordán y M. Juhant. 2008c. Tres especies del género *Tityra* en Argentina. Hornero 23 (1): 45-49.

Bodrati, A., J. I. Areta y E. White. 2012b. La avifauna de la Posada y Reserva Puerto Bemberg, Misiones, Argentina. Nuestras Aves 57: 63-80.

Bodrati, A., K. Cockle, J. M. Segovia, I. Roesler, J. I. Areta y E. Jordán. 2010b. La avifauna del Parque Provincial Cruce Caballero, Provincia de Misiones, Argentina. Cotinga 32: 41-64.

Bodrati, A., M. Lammertink y J. M. Segovia. 2009c. El Bailarín castaño (*Pipriptes pileata*) está en la Reserva Natural Cultural papel misonero, provincia de Misiones, Argentina. Nuestras Aves 54: 76-78.

Bonkewitzz , A. N. 1990. Fauna de vertebrados de la laguna Guatraché. Universidad Nacional del Sur. Dpto. de Biología. Bahía Blanca, 103 pp.

Bosisio, A. C. 2003. Catálogo de aves pertenecientes al Museo de Ciéncias Naturales y Antroplógicas "Profesor Antonio Serrano", Paraná, Entre Ríos, Argentina. Memórias del Museo de Ciéncias Naturales y Antropológicas, Serie Nueva, 11: 1-54.

Brandán, Z. J. y C. I. Navarro. 2009. Lista actualizada de las aves de la provincia de Tucumán. Fundación Lillo. Tucumán.

Brandolín, P., R. Martori y M. Ávalos. 2007. Variaciones temporales de los ensambles de aves de la reserva natural de fauna Laguna La Felipa (Córdoba, Argentina). Hornero 22: 1-8.

Brewer, D. y R. I. Oreonidae. 2010. Family Vireonidae (Vireos). Pp. 378-439 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 15. Weavers to New World Warblers. Lynx Edicions, Barcelona.

Brocca, J. L. 1997. Informe Reserva Natural Otamendi. Informe inédito, 49 páginas.

Brunetti, A., A. Mouchard., C. Coulon y E. Haene.1991. El Anambé verdoso (*Pachyramphus viridis*) en el sur de Entre Ríos. Nuestras Aves 25: 27-28.

Bruno, F., D. Acevedo, J. L. Maceda y M. I. Mero. 2007. Reserva Natural Municipal Chadilauquen. Aves. Municipalidad de Embajador Martini. La Pampa.

Bucher, E. H., Tamburini, D., Abril, A. y P. Torres. 2003. Folivory in the White-tipped Plantcutter *Phytotoma rutila*: seasonal variations in diet composition and quality. J. Avian Biol. 34: 211-216.

Bulit, F y V. Massoni.2004.Arquitectura de los nidos de la Golondrina ceja blanca (*Tachycineta leucorrhoa*) construidos en cajas nido. Hornero 19: 69-76.

Bulit, F., J. C. Reboreda y V. Massoni.2005. Inversión parental de la Golondrina ceja blanca (*Tachycineta leucorrhoa*) en el tamaño de puesta y la morfología de sus huevos. XI RAO: 72. Buenos Aires.

Burgos, F. G., J. L. Baldo y F. M. Cornell. 2009. Lista de las aves de la Provincia de Jujuy, Argentina. Secretaría de Turismo y Cultura de Jujuy. S. S. de Jujuy.

Burmeister, H. 1890. Expedición a Patagonia. Anales del Museo Nacional de Buenos Aires. 3: 253-321.

Bustingorry, E. Z. de. 1981. De mis observaciones de campo. Mouseion 2: 2-3 (25 de Mayo, Argentina).

Cadena, C. D., Córdoba Córdoba, S., Lodoño, G. A., Calderón-F., D., Martin, T. E. y M. P. Baptiste. 2007. Nesting and singing behavior of Common Bush-Tanagers (*Chlorospingus ophtalmicus*) in South America. Ornitología Colombiana 5: 54-63.

Cali, R. D. y F. Aguilar. 2002. Monterita de collar (*Poospiza torquata*) en la Reserva Costanera Sur, Buenos Aires, Argentina. Nuestras aves 44: 20.

Calí, R., D. Unterkofler, F. Martínez y J. Raggio. 2008. Aves silvestres de Mendoza. YPF. Buenos Aires.

Campagna, L., K. Geale, P. Handford, D. A. Lijtmaer, P. L. Tubaro y S. C. Lougheed. 2011. A molecular phylogeny of the Sierra-Finches (*Phrygilus*, Passeriformes): Extreme polyphyly in a group of Andean specialista. Molecular Phylogenetics and Ecolution. (en prensa)

Camperi, A. R. 1992c. Estudio sobre aves colectadas en el extremo sudeste de la provincia de Buenos Aires. Neotrópica 38: 127-140.

Camperi, A. R. 1998. Avifauna Andinopatagónica, lista comentada de especies. Physis Sec. C. 56 (130-131): 33-46.

Camperi, A. R. y C. A. Darrieu. 2004. Avifauna de la provincia de San Juan, lista comentada de especies. Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. (n.s.) 6 (1): 147-164. Buenos Aires.

Camperi, A. R. y C. A. Darrieu. 2005. Aves del Alto Valle del Río Negro, Argentina. Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. (n.s.) 7 (1): 51-56. Buenos Aires.

Camperi, A. R. y C. A. Darrieu.2000. (2001b). Estudio de una colección de aves del sur de la provincia de Misiones. Physis Sec. C. 58 (134-135): 79-83.

Camperi, A. R. y C. A. Darrieu.2002 (2004). Avifauna de Catamarca: Lista comentada de especies (Passeriformes) Physis Secc. C. 60 (138-139): 25-40.

Camperi, A. R., C. A. Darrieu y M. Juárez. 2008. Avifauna de la provincia de La Rioja (Argentina): lista comentada de especies. Acta Zoológica Lilloana 52 (1-2): 76-97.

Camperi, A. R., C. A. Darrieu, P. G. Grilli y F. Burgos. 2013. Avifauna de la provincia de Jujuy, Argentina: lista de especies (Passeriformes). Acta Zoológica Lilloana. 57 (1): 72-129.

Camperi, A. R.1990. Notas sobre una colección de aves del río Santa María, Salta, Argentina. Hornero 13: 147-151.

Canavelli, S., M. E. Zaccagnini, J. Torresín, N. Calamari, M. de la Paz Duccomun y P. Capponch. 2004. Monitoreo extensivo de aves en el centro-sur de Entre Ríos. Insugeo, Miscelánea 12: 349-362.

Canevari, M., P. Canevari, G. R. Carrizo, G. Harris, J. Rodríguez Mata y R. J. Straneck.1991b. Nueva guía de las aves argentinas. Tomos I y II. Fundación Acindar.

Canevari, P.1992. *Oxyrunchus cristatus,* una reconfirmación. Nuestras Aves 27: 35.

Cano, P. D., C. Saibene, M. L. Chatellenaz, H. A. Ball y A. Vallejos. 2010. Adiciones a la avifauna del Parque Nacional Mburucuyá, Corrientes, Argentina. FACENA 26: 43-52.

Capllonch, P. 2012. Datos de anillado del Zorzalito boreal (*Catharus ustulatus swainsoni*) en el noroeste de Argentina. Nuestras Aves 57: 11-13.

Capllonch, P. 2015. Correlación entre la muda y la migración en el Brasita de fuego (*Coryphospingus cucullatus fargoi*). Historia Natural. Tercera Serie Volumen 5 (2): 51-58.

Capllonch, P. y E. Moyano Wagner. 2010. Importancia de especies de aves en ambientes altoserranos en la Provincia de Tucumán, Argentina. Biológica Nº 12: 48-54.

Capllonch, P. y R. Aráoz.2007. Aves de los Jardines de Yerba Buena. Tucumán.

Capllonch, P., C. A. Alderete, R. Aráoz, E. Barboza, J. C. Mamaní, D. Ortiz, W. E. Pérez Bogado, O. B. Quiroga y K. Soria. 2015. Observaciones y capturas de aves poco conocidas en el norte de Argentina. Nuestras Aves 60:76-82.

Capllonch, P., D. Ortiz y I. Ferro. 2011b. Notas sobre la avifauna de las Cumbres Calchaquíes, Tucumán, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 55 (1): 50-63.

Capllonch, P., D. Ortiz, M. G. Núñez Montellano, P. G. Blendinger. 2014b. Aportes sobre la distribución, comportamiento y biología del Cerquero amarillo, *Atlapetes citrinellus* (Aves: Emberizidae). Acta Zoológica Lilloana 58 (2): 222-240.

Capllonch, P., R. Lobo Allende, L. Guardia Clips y P. Albornoz.2005c. Comentarios sobre aves de Santo Tomé, Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 49: 33-34.

Capmourteres, V., V. Bauni, J. M. Meluso, S. Bogan y M. Homberg. 2015. Aves de la Reserva Natural Campo San Juan, Misiones: descripción e implicancias para su conservación. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 171: 1-14.

Capurro, H. A. y E. H. Bucher. 1982. Poblaciones de aves granívoras y disponibilidad de semillas en el bosque chaqueño de Chamical. Ecosur, 9: 117-131.

Capurro, H. A. y E. H. Bucher. 1986. Variación estacional en la comunidad de aves del bosque chaqueño de Chamical. Physis, Secc. C, 44: 1-6.

Capurro, H. A. y E. H. Bucher.1988. Lista comentada de las aves del bosque chaqueño de Joaquín V. González, Salta, Argentina. Hornero 13: 39-46.

Carma, M. I. 2009. Relevamiento de aves de la provincia de Catamarca. Consejo Federal de Inversiones.

Carman, R. L. 1971b. Información sobre el Matico *Icterus croconotus*. Hornero 11: 127.

Carman, R. L. 1987. Sobre alimentación de aves. Nuestras Aves 12: 9.

Carman, R. L. 1989b. Nidos de Chingolo en altura. Nuestras aves 18: 11-12.

Carro, M. E., M. V. Lacoretz y T. H. Acosta. 2014. El Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en General Lavalle, Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 59: 29-30.

Casañas, H. E., I. Roesler y J. Klavins. 2007. Historia natural y distribución de la Cachirla trinadora (*Anthus chacoensis*). Hornero 22 (1): 59-63.

Casas, A. E. y M. R. de la Peña.1994. Acerca de la variación en los hábitos de nidificación de las subespecies de *Diuca diuca* (Aves: Emberizidae). Nótulas Faunísticas 57: 1-4.

Castelino, M. A. y C. A. Saibene.1989. Nidificación de aves en Misiones. Nuestras aves 20: 7-9.

Castello, H., E. Crespo, F. Erize, M. G. Costa, J. C. Chebez, M. E. Dunn. 1982. Estudios de preservación y manejo de los recursos faunísticos de la costa atlántica de la provincia de Río Negro con fines turísticos, CFI/FVSA.

Cazetta, E., Rubim, P., De Oliveira Lunardi, V., Francisco, M. R. y M. Galetti. 2002. Frugivoria e dispersao de sementes de Talauma ovata (Magnoliaceae) no sudeste brasileiro. Ararajuba 10: 199-206.

Chatellenaz, M. L. 2002b. *Nemosia pileata* (Wied, 1831) (Aves: Emberizidae), nueva especie para la avifauna chaqueña. Facena 18: 57-58.

Chatellenaz, M. L. 2004. La avifauna del bosque de Quebracho colorado y Urunday del noroeste de Corrientes, Argentina. Facena, 20: 3-12.

Chatellenaz, M. L. y L. I. Ferraro. 2000. Materiales vegetales y fúngicos en nidos de aves del noreste argentino y Paraguay. Facena 16: 103-119.

Chatellenaz, M. L. y L. I. Ferraro.2005. Líquenes en nidos de Pitiayumí, *Parula pitiayum*i: ¿sostén estructural o defensa contra parásitos ? XI Reunión argentina de ornitología. B. Aires. : 79.

Chatellenaz, M. L. y L. I. Ferraro.2007. *Usnea y Ramalina* en la construcción de nidos de *Parula pitiayum*i (Aves, Parulidae): ¿sostén estructural o defensa contra parásitos ? Kurtsiana 33 (2): 49-54.

Chatellenaz, M. L., P. D. Cano, C. Saibene y H. A. Ball. 2010. Inventario de las aves del Parque Nacional Mburucuyá (Provincia de Corrientes, Argentina). Acta Zool. Lilloana 54: 139-150.

Chatellenaz, M., J. M. Fernández y M. L. Thomann. 2012. Nuevos registros de *Macropsalis forcipata*, *Cyanocorax caeruleus* y *Pyroderus scutatus* (Aves: Caprimulgidae, Corvidae y Cotingidae) en el nordeste de la provincia de Corrientes, Argentina. Facena, Vol. 28: 69-73.

Chebez, J. C. 2009. Otros que se van. 1ª Ed. Albatros. Buenos Aires.

Chebez, J. C. y C. Bertonatti. 1994. La avifauna de la isla de los Estados, islas de año Nuevo y mar circundante. (Tierra del Fuego, Argentina). Monografía 1. L.O. L.A. Págs. 57.

Chebez, J. C. y H. Casañas.2000. Áreas claves para la conservación de la biodiversidad de la provincia de Misiones, Argentina. (Fauna vertebrada), 102 pág. FVSA-WWF, Puerto Iguazú.

Chebez, J. C. y S. Heinonen Fortabat.1987b. Novedades ornitogeográficas argentinas. II. Nótulas Faunísticas 3: 1-2.

Chebez, J. C., H. Casañas y S. Chichizola. 1984. Nueva cita de *Ramphocelus bresilius* (Linné) (Thraupidae) para la Argentina. Hornero 12: 221-22

Chebez, J. C., N. R. Rey, M. Babarskas y A. G. Di Giacomo.1998. Las aves de los Parques Nacionales de la Argentina. Monografía Especial L.O.L.A. Nº 12, 126 págs. Bs.As.

Chebez, J. C., S. Heinonen Fortabat, J. Veiga, M. Babarskas y F. Filiberto.1993. Novedades ornitogeográficas argentinas. IV. Nótulas Faunísticas 38: 1-11.

Chebez, J. C.1994. Los que se van. Ed Albatros. Buenos Aires. Págs. 604.

Chehebar, C. y E. J. Ramilo y S. A. Mazzuchelli. 1992. Parque Nacional Laguna Blanca. Plan General de Manejo. Documento preliminar para discusión. Delegación técnica regional. Informe inédito. Administración Parques Nacionales.

Chehebar, C. y E. J. Ramilo. 1992. Fauna del Parque Nacional Nahuel Huapi. Administración de Parques Nacionales y Asociación Amigos del Museo de la Patagonia "Francisco Pascasio Moreno", San Carlos de Bariloche, 38 pp.

Chikilian, M. L., M. G. Celaya y N. T. Bee de Speroni. 1993-1994. Morfohistología y citoquímica comparada del tracto digestivo en tres especies de aves (Emberizidae). Rev .Asoc. Cienc. Nat. Litoral 24 y 25: 35-48.

Chimento, N. R. 2015. Nuevos registros de Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) y comentarios sobre su nidificación. Nuestras Aves 60: 67-69.

Chimento, N. R., F. L. Agnolin, E. L. Gurerrero, A. M. López y R. F. Lucero. 2012. Nuevos registros de aves y consideraciones sobre la extensión geográfica de los talares al sur de la provincial de Buenos Aires. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 89: 1-12.

Chiurla, E. H. y M. M. Martínez.1995. Observaciones sobre el Estornino crestado (*Acridotheres cristatellus*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 31: 24-25.

Chiurla, E. H.1999. Nidificación del Estornino crestado (*Acridotheres cristatellus*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Nuestras aves 39: 6.

Christie, M. I., E. J. Ramilo y M. D. Bettinelli. 2004. Aves del noroeste patagónico. Atlas y guía. L. O. L. A. pp. 328.

Christie, M. I., E. J. Ramilo, M. D. Bettinelli. 1988. Las aves de los Parques Nacionales Norpatagónicos y zonas aledañas. Administración de Parques Nacionales.

Chubb, Ch.1923. Descriptions of two new birds from the N.W. Argentina. Hornero 3: 34-36.
Clark, R. R.1986. Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Guía de campo. L.O. L.A. Bs. As.
Cobos, V., R. Miatello y J. Baldo.1999. Algunas especies de aves nuevas y otras con pocos registros para la provincia de Córdoba, Argentina. II. Nuestras Aves 39: 7-11.
Cocimano, M. C., J. M. Chani, A. L. Echevarría y C. F. Marano. 2005b. La comunidad de aves del río Los Sosa, Tucumán, Argentina. XI RAO: 81. Buenos Aires.
Cockle, K., Martin, K. & K. Wiebe. 2008b. Availability of cavities for nesting birds in the Atlantic Forest, Argentina. Ornitología Neotropical 19 (Suppl.): 269-278.
Coconier, E. G. (ed.) 2007. Las aves silvestres de Acambuco, provincia de Salta, Argentina. Relevamiento de un AICA prioritaria de la selva Pedemontana. Temas de Naturaleza y Conservación 6: 1-127. Aves Argentinas/AOP, Buenos Aires.
Codesido, F. Miñarro y P. Preliasco. 2013. Inventario focal de las aves de las estancias La Gloria y El Raigón: sitio piloto Samborombón, Provincia de Buenos Aires, Argentina. En pp. 253-268/540-546: G. D. Marino, F. Miñarro, M. E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.
Codesido, M. y D. N. Bilenca. 2000. Comparación de los métodos de transectas de faja y de conteo de puntos de radio fijo en una comunidad de aves del bosque semiárido santiagueño. Hornero 15: 85-91.
Codesido, M. y R. M. Fraga. 2009. Distributions of threatened grassland passerines of Paraguay, Argentina and Uruguay, with new locality records and notes on their natural history and habitat. Ornit. Neotrop. 20: 585-595.
Codesido, M., C. González-Fischer y D. Bilenca. 2011. Distributional changes of landbird species in agroecosystems of central Argentina. The Condor 113: 266-273.
Cody, M. L. 2005. Family Mimidae (Mockingbirds and Thrashers). Pp. 448-495 en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.10. Cuckoo-shrikes to Thrushes. Lynx Edicions, Barcelona.
Colina, U. y R. Portales. 2012. Nuevos registros de la Monterita serrana (*Compsospiza baeri*) y del Jilguero cola blanca (*Sicalis citrina*) en la provincia de Jujuy, Argentina. Nótulas Faunísticas 106: 1-8.
Collar, N. J. e I. Newton. 2010. Family Fringillidae (Finches). Pp. 440-617 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 15. Weavers to New World Warblers. Lynx Edicions, Barcelona.
Comparatore, V. M., Martínez, M. M., Vassallo, A. I., Barg, M. y J. P. Isacch. 1996. Abundancias y relaciones con el hábitat de aves y mamíferos en pastizales de *Paspalum quadrifarium* (Paja Colorada) manejados con fuego (provincia de Buenos Aires, Argentina). Interciencia 21: 228-237.
Contino, F. N.1980. Aves del noroeste argentino. Univ. Nac. Salta. Págs. 136.
Contreras, J. R. 1975. Características ponderales de las aves del Parque Nacional Nahuel Huapi y regiones adyacentes. Physis. Sec. C. 34 (88): 97-107.
Contreras, J. R. 1979g. Lista faunística preliminar de los vertebrados de la Reserva Ecológica de Ñacuñan, Cuaderno Técnico del IADIZA 5: 39-47.
Contreras, J. R. 1983b. Notas sobre el peso de aves argentinas. II. Historia Natural 3 (4): 39-40.
Contreras, J. R. 1983c. Notas sobre el peso de aves argentinas. III. Historia Natural 3 (8): 95-96.
Contreras, J. R. 1990b. Datos reproductivos de 45 especies de aves passeriformes que anidan en el valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, Argentina. Nótulas Faunísticas 22: 1-4.
Contreras, J. R. 1993b. Acerca de algunas especies de aves del extremo sudeste de la provincia de Formosa, República Argentina. Nótulas Faunísticas 47: 1-8.
Contreras, J. R. y A. Fernández. 1980. Ecología de la avifauna de la laguna del Viborón, departamento Maipú, provincia de Mendoza. Rev. Mus. Hist. Nat. de San Rafael (Mendoza) VIII (1): 3-14.
Contreras, J. R. y A. O. Contreras.1986. Un ave nueva para el "Impenetrable" chaqueño: el Anambé castaño. Nuestras Aves 11: 9-10.
Contreras, J. R. y V. G. Roig. 1977b. La Calandria de tres colas, *Mimus triurus* (Vieillot) en la Isla Victotia, Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Neuquén. Hornero 11: 436.
Contreras, J. R. y V. G. Roig. 1977c. Biota centro-andina. IV. Phrygilus gayi gayi (Gervais) un ave nueva para la provincia de Mendoza y para la avifauna argentina. Physis, 36 (92): 349-350.
Contreras, J. R. y V. G. Roig.1976. Biota centro-andina. V. Nuevos datos sobre nidación de *Mimus patagonicus* (Aves, Mimidae). Neotrópica 22 (68): 103-104.
Contreras, J. R. y Y. E. Davies. 1980. Aportes para el conocimiento del peso de las aves argentinas. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 11: 21-29.
Contreras, J. R., V. G. Roig y A. G. Giai. 1980b. La avifauna de la cuenca del río Manso superior y la orilla sur del Lago Mascardi, Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. Historia Natural 1: 41-48.
Contreras, J. R.1976. Una nueva subespecie de *Geositta rufipennis* prodecente de las cernanias de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, Argentina. (Aves: Furnariidae). Physis. Sec. C 35 (91): 213-220.
Contreras, J. R.1977b. La avifauna del Valle del río Collón Cura, provincia del Neuquén. Idia. Suplemento 34: 250-270.

Contreras, J. R.1978b. Características ponderales de algunas especies de aves de la isla Victoria, provincia de Neuquén. Resumen común. VII Congreso argentino de Biología. Mendoza. 11 p.

Contreras, J. R.1980-81. Consideraciones sobre las asociaciones interespecíficas de aves Passeriformes de la región selvática costera del alto río Paraná, en la provincia de Corrientes. Facena 4: 61-75.

Contreras, J. R.1987b. Lista preliminar de la avifauna de la provincia de Corrientes, República Argentina. Historia Natural VII (6): 61-70.

Contreras, J. R.1987c. Lista preliminar de la avifauna de la provincia de Formosa, República Argentina. Historia Natural VII (4): 33-52.

Contreras, J. R.y A. Fernández.1978. Avifauna mendocina. I. *Geothlypis aequinoctialis velata* Vieillot y *Colibri coruscans coruscans* (Gould) (Aves: Parulidae y Trochilidae). Rev. Asc. Cienc. Nat. Litoral 9: 61-64.

Cormenzana Méndez, A., A. L. Echevarría y R. M. Bárquez. 2011. Composición y estructura de la avifauna de Maimará, provincial de Jujuy, Argentina. IX Congreso de Ornitología Neotropical, VIII Congreso Peruano de Ornitología. Libro de Resúmenes: 349.

Cortes, M. C., Cazetta, E., Staggemeier, V. G. y M. Galetti. 2009. Linking frugivore activity to early recruitment of a bird dispersed tree, *Eugenia umbelliflora* (Myrtaceae) in the Atlantic rainforest. Austral Ecology 34: 249-258.

Couri, M. S., F. L. Rabuffetti, J. C. Reboreda. 2005. New data on *Philornis seguyi* García (1952) (Diptera, Muscidae). Brasilian Journal of Biology 65: 631-637.

Cozzani, N. C., R. Sánchez y S. M. Zalba. 2004. Nidificación de la Loica Pampeana (*Sturnella defilippi*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hornero 19 (2): 47-52.

Cozzani, N. y S. M. Zalba. 2009. Estructura de la vegetación y selección de hábitats reproductivos en aves del pastizal pampeano. Ecología Austral, 19: 35-44.

Craig, A. J. F. K. y C. J. Feare. 2009. Family Sturnidae (Starlings). Pp. 654-758 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 14. Bush-Shrikes to World Sparrow. Lynx Edicions, Barcelona.

Crawshay, R. 1907. The birds of Tierra del Fuego. Bernard Quaritch, London.

Cueto, V. R. y J. López de Casenave. 2000b. Seasonal changes in bird assemblages of coastal woodlands in east-central Argentina. Stud Neotrop Fauna & Environm 35: 173-177.

Cueto, V. R., J. L. de Casenave y L. Marone. 1997. Geographical distribution and sympatry of Tufted and Plain-Mantled Tit-spinetails (Leptasthenura platensis and Leptasthenura aegithaloides) in Argentina. Ornitología Neotropical 8: 113-120.

Cueto, V. R., J. López de Casenave y L. Marone. 2008. Neotropical austral migrant landbirds: Population trends and habitad use in central Monte desert, Argentina. Condor, 110 (1): 70-79.

Cueto, V. R., L. Marone y J. López de Casenave. 2006. Seed preferences in Sparrow species of the Monte deset, Argentina: implications for seed-granivore interctions. Auk, 123 (2): 358-367.

Cusano, S. y E. Cusano. 2015. Registros australes de la Tenca (*Mimus thenca*) en la provincia de Neuquén, Argentina. Ecoregistros Revista, 5 (9): 49-53.

Dabbene, R.1919b. Notas sobre una colección de aves de la Isla Martín García. Hornero 1: 236-248.

Dabbene, R.1933. Las especies argentinas del género *Phrygilus*. Anales de la Sociedad Científica Argentina. CXV: 169-193.

Daguerre, J. B.1922. Lista de aves coleccionadas y observadas en Rosas, F. C. S. Hornero 2: 259-271.

Damonte, M. J. y V. R. Cueto. 2005. Comportamiento de búsqueda de alimento y selección de especies vegetales por dos especies de aves insectivoras del desierto del Monte. XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de resúmenes, 85.

Dardanelli, S. y M. Nores. 2001. Extinción y colonización de aves en fragmentos de bosque de la provincia de Córdoba, Argentina. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, Rep. Argentina.Tomo 66: 55-60.

Dardanelli, S., M. L. Nores y M. Nores. 2006b. Minimum area requirements of breeding birds in fragmented woodland of Central Argentina. Diversity and Distributions12: 687-693.

Darrieu, C. A. y L. N. Segura. 2015. Avifauna de la provincia de Mendoza, Argentina: lista de especies (Passeriformes). Acta zoológica lilloana 59 (1-2): 83–123.

Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 1998. Fluctuación anual del peso corporal, tamaño de gonadas y muda de *Pseudoleistes virescens* (Pecho amarillo Común) (Aves: Emberizidae: Icteridae). Neotrópica 44: 121-122.

Darrieu, C. A. y A. R. Camperi.1988. Estudios sobre la avifauna de Corrientes. V. Passeriformes poco citados. (Parulidae, Thraupidae). Neotrópica 36: 133-137.

Darrieu, C. A. y A. R. Camperi.1991. Estudio de una colección de aves de Corrientes. II. (Formicariidae, Cotingidae, Pipridae). Neotrópica 37 (97): 75-80.

Darrieu, C. A. y A. R. Camperi.1993b. Estudio de una colección de aves de Corrientes, Argentina. IV. (Phytotomidae a Parulidae) Neotrópica 39 (101-102): 83-92.

Darrieu, C. A. y A. R. Camperi.1994. Estudio de una colección de aves de Corrientes: Thraupidae e Icteridae. Neotrópica 40 (103-104): 49-55.

Darrieu, C. A. y A. R. Camperi.1996. Estudio de una colección de aves de Corrientes (Emberizidae y Fringillidae). Neotrópica 42 (107-108): 69-75.

Darrieu, C. A. y A. R. Camperi.2000 (2001). Aves observadas en el lago Colhué Huapi y sus alrededores, provincia del Chubut. Physis Secc. C, 58 (134-135): 23-25. Buenos Aires.

Darrieu, C. A., A. R. Camperi y S. Imberti.2009. Avifauna (Passeriformes) of Santa Cruz province, Patagonia

(Argentina): annotated list of species. Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat. ,n.s. 11 (1): 49-67.
Darrieu, C. A., G. Soave y E. Soave. 1988. Nidificación de Passeriformes en la reserva integral de Punta lara y sus alrededores, Buenos Aires, Argentina. Hornero 13: 53-58.
De Francesco, V. 2005. Reserva Natural de Usos Múltiples Isla Martin García. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 42-43. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
De la Peña, M. R. 1981g. Notas nidobiológicas sobre Corbatitas (Aves, Emberizidae). Segunda parte. Historia Natural 2 (6): 45-48.
De la Peña, M. R. 1983b. Notas nidobiológicas sobre Fringílidos (Aves, Emberizidae). Cuarta parte. Historia Natural 3 (14): 141-143.
De la Peña, M. R. 1997b. Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. Ed. L.O.L.A. pp.1-126.
De la Peña, M. R. 2010b. Nidos de aves Argentinas. UNL. (Digital)
De la Peña, M. R. 2012b. Distribución y citas de aves de Entre Ríos. Serie Naturaleza y Conservación Nº 6. Pág. 1-206.
De la Peña, M. R. y F. Bruno. 2008. Albinismo en aves argentinas. ECO. Ciencia y Naturaleza. Nº 10: 34-38.
De la Peña, M. R. y J. F. Pensiero.2003. Contribución de la flora en los hábitos alimentarios de las aves en un bosque del centro de la provincia de Santa Fe, Argentina. Ornit. Neot. 14 (4): 499-514.
De la Peña, M. R. y R. F. Tittarelli. 2011. Guía de aves de La Pampa. Santa Rosa. Gobierno de La Pampa.
De la Peña, M. R. y S. A. Salvador. 2010. Manual de la alimentación de las aves argentinas. UNL. (Digital)
De la Peña, M. R., M. Manassero, J. L. López y H. Luna.2003b. Nuevos registros de aves para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 45: 32-35.
De la Peña, M. R.1996b. Nuevos registros o aves poco citadas para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina. Hornero 14 (3): 87-89.
De la Peña, M. R.2002h. Nuevas observaciones en la alimentación de las aves. Rev. FAVE. Cienc. Vet. 1 (2): 59-64.
De la Peña, M. R.2013c. Nidos y Reproducción de las aves argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad Nº 8. Ediciones Biológica. Santa Fe.
De Lucca, E. R. 1996b. Nidificación del Bailarín azul *Chiroxiphia caudata* en Argentina. Nuestras aves 33: 32.
De Lucca, E. R. y M. D. Saggese.1992. Aves del departamento Deseado, Santa Cruz. Hornero 13: 259-260.
De Mársico, M. C. y J. C. Reboreda. 2009. Impacto del parasitismo de Tordo pico corto (*Molothrus rufoaxillaris*) sobre la supervivencia de nidos de Músico (*Agelaioides badius*). XIII RAO: 155. Tafí del Valle, Tucumán.
De Mársico, M. C., B. Mahler, M. Chomnalez, A. G. Di Giacomo y J. C. Reboreda. 2010b. Host Use Generalist and Specialist brood Parasitic Cowbirds at Population and Individual Levels. Advances in the Study of Behavior, 42: 81-119.
Delhey, J. K. V. y M. Carrete.1999. Aves nuevas o poco conocidas para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 40: 11-12.
Delhey, R.1992. Algunas aves nuevas o poco conocidas para la región de Bahía Blanca. Nuestras Aves 27: 31-32.
Di Giacomo, A. G, A. S. Di Giacomo y J. C. Reboreda. 2008. Biología reproductiva del Capuchino canela (*Sporophila hypoxantha*) en Formosa. XII RAO: 57. San Martín de los Andes. Neuquén.
Di Giacomo, A. G. 1987b. Primeros registros de la Golondrina parda chica en Buenos Aires y presencia del Volatinero en la misma provincia. Nuestras Aves 12: 20-21.
Di Giacomo, A. G. 1998c. Datos preliminares sobre el parasitismo de cría de *Molothrus rufoaxillaris* en dos hospedantes simpátricos: *Molothrus badius* y *Gnorimopsar chopi.* Res. X RAO: 23. Mar del Plata.
Di Giacomo, A. G. 2005h. Aves de la Reserva El Bagual. En Di Giacomo, A. G. y S. F. Krapovickas (Eds.). Historia natural y paisaje de la Reserva El Bagual, provincia de Formosa, Argentina. Inventario de la fauna de vertebrados y de la flora vascular de un área del Chaco Húmedo. Temas de Naturaleza y Conservación 4: 201-465. Aves Argentinas/AOP. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. G. y B. López Lanús.1998. Aportes sobre la nidificación de veinte especies de aves del noroeste argentino. Hornero 15: 29-38.
Di Giacomo, A. G. y B. López Lanús.2000. Nuevos aportes al conocimiento de la nidificación de algunas aves del noroeste argentino. Hornero 15: 131-134.
Di Giacomo, A. G. y H. A. Aguilar.1987. Sobre un nuevo hospedante para la Argentina del Renegrido *Molothrus bonariensis* (Aves: Icteridae). Nótulas Faunísticas 4: 1-2.
Di Giacomo, A. G. y J. Leiberman.2000. Descripción del pichón de *Xenopsaris albinucha*. Hornero 15: 129-130.
Di Giacomo, A. G., A. S. Di Giacomo y M. Babarskas.1993. Nuevos registros de *Sturnus vulgaris* y *Acridotheres cristatellus* en Buenos Aires. Nuestras Aves 29: 32-33.
Di Giacomo, A. G., A. S. Di Giacomo, J. Mazar Barnett y B. M. López Lanús.1997. Nuevas citas de *Catamblyrhynchus diadema* en el noroeste argentino. Hornero 14 (4): 264-266.
Di Giacomo, A. G., B. Mahler and J. C. Reboreda. 2010. Screaming Cowbird Parasitism of nest of Solitary Caciques and Cattle Tyrants. The Wilson Journal of Ornithology, 122 (4): 795-799.
Di Giacomo, A. G., B. Mahler y J. C. Rebereda. 2009. Primeros registros de parasitismo de Tordo pico corto (*Molothrus rufoaxillaris*), de Boyero negro (*Cacicus*

solitarius) y Picabuey (*Machetornis rixosa*). XIII RAO: 156. Tafí del Valle, Tucumán.
Di Giacomo, A. G.2000. Nidificación de algunas rapaces poco conocidas en el Chaco oriental argentino. Hornero 15: 135-139.
Di Giacomo, A. S. y C. Kopuchian. 2016. Una nueva especie de Capuchino (Sporophila: Thraupidae) de los Esteros del Iberá, Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 61: 3-5.
Di Giacomo, A. S., V. De Francesco y E.G. Coconier. (eds.). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. CD-Rom. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Sallo, F. G. y L. N. Segura. 2014. Nidificación del Estornino pinto (*Sturno vulgaris*) en un nido de Leñatero (*Anumbius annumbi*) en el noreste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 59: 13-15.
Dinelli, L.1918b. Notas biológicas sobre las aves del noroeste de la Rep. Argentina. Hornero 1: 57-68.
Dinelli, L.1922. Notas biológicas sobre las aves de Tucumán. Hornero 2: 312-313.
Dinelli, L.1924. Notas biológicas sobre aves del noroeste de la Argentina. Hornero 3: 253-258.
Doiny Cabré, C. y R. Lejarraga. 2007. Aves de Sierra de la Ventana. Bahía Blanca.
Doiny Cabré, P. C. 2006.Aves nuevas o poco registradas para sierra de le Ventana, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 52: 21-23.
Domínguez, M., B. Mahler y J. C. Reboreda. 2014. Impac of Shiny Cowbird and bottly parasitism on the reproductive success of the globally endangered Yellow Cardinal, *Gubernatrix cristata*. Bird Conservation International 25: 294-305.
Domínguez, M., J. C. Reboreda y B. Mahler. 2013. Impacto del parasitismo del Tordo renegrido, *Molothrus* bonariensis, y de larvas de moscas parásitas sobre el éxito reproductivo del cardenal amarillo, *Gubernatrix cristata*. Resúmenes, XV RAO, La Pampa.
Domínguez, M., M. Ayarragaray y R. Lapido. 2015. Nidos de cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) en la provincia de San Luis, Argentina. Nuestras Aves 60: 8-10.
Earnshaw, A. y N. Earnshaw. 2000. www.geicities.com. Lista de aves avistadas en un viaje a la Patagonia. Enero 2000.
Eastman, A. S., G. E. Dupuy, A. A. Medina y S. I. Tirante. 2005. Relevamiento de aves y dinámica anual de aves migratorias de la Vega Maipú, San Martín de los Andes, Provincia del Neuquén. XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 90. Buenos Aires.
Echevarría, A. L., C. F. Marano, J. M. Chani y M. C. Cocimano. 2008c. Composición de la comunidad de aves del embalse La Angostura, Tafí del Valle, Tucumán. Acta Zoológica Lilloana 52 (1-2): 98-105.
Echevarría, A. L., C. F. Marano, M. C. Cocimano, M. E. Fanjul y M. A. Cormenzana. 2014. Composición y variación de la comunidad de aves del embalse El Tunal, Salta, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 58 (1): 80-93.
Echevarría, A. L., L. R. Lobo Allende, M. D. Juri, J. M. Chani, J. Torres Dowsall y E. Martín. 2011b. Composición, estructura y variación estacional de la comunidad de aves del Jardín Botánico de la Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina. Acta. Zool. Lilloana 55: 123-136.
Esteban, J. G. 1953. Nuevas localidades para aves argentinas. Acta Zool. Lilloana, 13: 349-362.
Euler, C. 1900. Descripçao dos ninhos e ovos das aves do Brasil. Rev. Mus. Paul. 4: 9-418.
Fandiño, B. 2014. Dos nuevas especies de aves para la provincia de Santa Fe (Argentina): *Turdus chiguanco* (Aves: Turdidae) y *Catamenia analis* (Aves: Thraupidae). Natura Neotropicalis 45: 103-108.
Fandiño, B. y A. A. Pautasso. 2011. Avifauna del AVP La Salamandra, pp.: 62-105. En: Pautasso, A. A. 2011. La fauna y su conservación en los Bajos Submeridionales. Ediciones Biológica. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad Nº 5. Santa Fe, Argentina, 278 pp.
Fandiño, B. y A. R. Giraudo. 2010. Revisión del inventario de aves de la provincia de Santa Fe, Argentina. Revista FABICIB, Vol. 14: 116-137.
Fandiño, B., A. J. Berduc y A. H. Beltzer. 2010. Ensamble de aves de bosques nativos y exóticos en la Estación reproductiva de un área protegida en el espinal de Entre Ríos, Argentina. Ornitología Neotropical 21: 1-16.
Fandiño, B., L. A. Leiva, A. A. Pautasso, H. Luna y M. Manassero. 2015b. Avifauna de las reservas natural manejada “El Fisco” y privada de uso múltiple “Isleta linda”, Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 60: 39-45.
Fanjul, M. E., A. L. Echevarría y M. Nores. 2008. Bandadas mixtas de aves en un gradiente latitudinal en las Yungas de Argentina. XII Reunión Argentina de Ornitología. Libro de resúmenes: 155.
Fanjul, M. E., A. L. Echevarría y M. Nores. 2009. Las bandadas mixtas de aves en la Reserva Privada Portalde Piedras, Jujuy, Argentina. XIII Reunión Argentina de Ornitología. Libro de resúmenes: 135.
Fava, G., J. C. Acosta y G. Blanco. 2013. Primeros registros documentados y aportes a la distribución geográfica de ocho especies de aves de San Juan, Argentina. Nuestras aves 58: 12-16.
Fernández Chaves, R. 2013. Presencia del Juan chiviro (*Cyclarhis gujanensis*) en el sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina y registro más austral en su distribución geográfica. Ecoregistros Revista, 3 (11): 44-46.
Fernández, G. J. y M. E. Mermoz. 2000. Effectof predation and cowbird parasitism on thenesting success of two sympatric Neotropical marshbirds. Wilson Bulletin, 112: 355-365.
Fernández, G. J. y M. E. Mermoz.1998. Evaluación de la existencia de adaptaciones específicas contra el parasitismo de cría del Tordo renegrido, *Molothrus bonariensis*, en el Federal, *Amblyramphus holosericeus*. Res. X RAO: 26-27. Mar del Plata.

Fernández, G. J. y N. M. Duré Ruiz. 2007. Éxito reproductivo y productividad del Chingolo (*Zonotrichia capensis*) en un área de monte de la provincia de Buenos Aires (Argentina). Ornitología Neotropical, 18: 481-492.

Fernández, G. J., M. E. Mermoz, P. E. Llambías y E. M. Pujol. 2007. Life history traits and breeding success of the scarlet-headed blackbird (*Amblyramphus holosericeus*) in the argentinean pampas. Ornitología Neotropical, 18: 407-419.

Ferreira Fadini, R. y P. De Marco Jr. 2004. Interacoes entre aves frugívoras e plantas em um fragmento de mata atlantica de Minas Gerais. Ararajuba 12: 97-103.

Ferreira, S., L. Flores, E. Gatica y C. López Herrera. 2005b. Nidificación de *Troglodytes solstitialis* (Troglodytidae) en cajas nido (Provincia de Salta). XI RAO: 97. Buenos Aires.

Ferrer, D. G. 2014. Leucismo en un ejemplar de Siete cuchillos (*Saltator aurantiirostris*) en la localidad de Merlo, provincia de San Luis, Argentina. Nótulas Faunísticas, Segunda Serie 154: 1-2.

Ferrer, D. G., S. Bossio, R. Massarelli y A. Traslaviña. 2015. Nuevos registros de aves para el Parque Provincial Aconcagua y zonas aledañas, Las Heras, Mendoza, Argentina. Parte II. Nuestras Aves 60: 74-76.

Ferrer, D., R. Escudero, A. Traslaviña y E. Navarro. 2013b. Nuevos registros de aves para el parque provincial Aconcagua y zonas aledañas, Argentina. Nuestras aves 58: 24-26.

Ferrer, D., U. Lardelli y R. Olivera. 2011. Propuesta para declarar sitio AICA al Parque Provincial Aconcagua y al Monumento Natural Puente del Inca, Las Heras, Mendoza, Argentina. Biológica Nº 14: 71-75.

Finch, D. W.1991. Novedades ornitológicas argentinas. Nuestras Aves 24: 24-25.

Fiori, S. M. y S. M. Zalba. 1999. Plan de Manejo de la Reserva Provincial Auca Mahuida, Neuquén. GEKKO-Grupo de estudios en Conservación y Manejo. Departamento de biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur-Bahía Blanca, 1-260 p.

Fiorini, V. D. y J. C. Reboreda.2006. Cues used by Shiny Cowbirds (*Molothrus bonariensis*) to locate and parasitise Chalk-browed Moc-kingbird (*Mimus saturninus*) mest. Behavior Ecology and Sociobiology, 60: 379-385.

Fiorini, V. D., D. T. Tuero y J. C. Reboreda. 2011. Defensas de la Ratona común (*Troglodytes aedon*) frente al parasitismo del Tordo renegrido (*Molothrus bonariensis*). XIV Reunión Argentina de Ornitología, Libro de Resúmenes: 79.

Fiorini, V. D., D.T. Tuero y J. C. Reboreda.2005b. ¿Varía el Tordo renegrido (*Molotrhus bonariensis*) su comportamiento de picadura de huevos según el hospedador que parasita ? XI RAO: 99. Buenos Aires.

Fitzpatrick, J. W. 2004. Family Tyrannidae (Tyrant-Flycatchers) Pp. 170-363 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 9. Cotingas to Pipits and Wagtails. Lynx Edicions, Barcelona.

Fracchia, G. y A. Aranda-Rickert. 2015. La Liga (*Ligaria cuneifolia*) como recurso alimenticio clave para aves del monte de la provincia de La Rioja. Nuestras Aves 60: 95-97.

Fraga, R. M. y A. G. Di Giacomo. 2004. Cooperative breeding of the Yelow-rumped Marshbird (Icteridae) in Argentina and Paraguay. Condor 106: 671-673.

Fraga, R. M. y S. A. Salvador. 2013. Conducta y biología reproductiva de la Tacuarita azul (Polioptila dumicola) en un área pampeana y otra del espinal, Argentina. Historia Natural. Tercera Serie Vol. 3 (2): 37-50.

Fraga, R. M., H. Casañas and G. Pugnali.1998. Natural history and conservation of the endangered Saffron-cowled Blackbird Xanthopsar flavus in Argentina. Bird Conservation Internacional 8: 255-267.

Fraga, R. M., M. Codesido, H. Povedano, A. Jurado y R. Zárate.2004.First documented tecord of the Brown-and-Yellow Marshbird (Pseudoleistes virescens) for Paraguay, with comennts on its sympatry with the Yellow-Rumped Marshbird (P. guirahuro) in Argentina and Paraguay. Ornit. Neotropical 15 (2): 139-142.

Fraga, R. y S. Narosky.1985. Nidificación de las aves argentinas. (Formicariidae a Cinclidae). AOP. Pp. 1-96.

Friedmann, H. 1927. Notes on some Argentina birds. Bull. Mus. Comp. Zool. 68: 139-236.

Friedmann, H. 1929. The Cowbirds. C. C. Thomas, Springfield, Illinois.

Friedmann, H. 1931. Additions to the list of birds known to be parasitized by Cowbirds. Auk, 487: 52-65.

Friedmann, H. 1963. Host relations of the parasitic cowbirds. U. S. Nat. Mus. Bull. 233: 1- 276.

Gantchoff, M. G., M. C. De Márgico y J. C. Reboreda. 2011. Análisis del plumaje y vocalizaciones de los juveniles de dos especies parásitas de cría y un hospedador compartido: ¿hay evidencias de mimetismo? XIV Reunión Argentina de Ornitología, Libro de Resúmenes: 81.

García, M. (1952). Las especies argentinas del género *Philornis* Mein., con descripción de especies nuevas (Dipt. Anthom.). Revista de la Sociedad Entomológica Argentina 15: 277-293.

Gelain, M. A y M. Diez Peña.2005. Nidificación de la Ratona aperdizada (*Cistothorus platensis*) en el oeste de Río Negro, Argentina. Nuestras Aves 49: 24-25.

Gelain, M. A. y J. Tolosa. 2011. Aves de la provincia de Río Negro. Lista sistemática. Xolmis CRO 6: 1-37.

Gelain, M. A. y R. Pereyra Lobos. 2011b. Lista de aves de la provincia de San Juan, Argentina. Xolmis CRO 3: 1-12.

Gelain, M. A., L. Sympson y F. F. Vidoz.2003. Aves de Bariloche. Lista comentada de aves del departamento Bariloche, Provincia de Río Negro, Argentina. Libros del Mediodía. San Carlos de Bariloche.

Genise, J.F., Straneck R. J. y P. L. Hazeldine. 1993. Sapsuckimg in the White-Fronted Woodpecker *Melanerpes cactorum* Ornit. Neotropical 4: 77-82.

Giai, A. G. 1942. Aves desde mi ventana. Hornero 8: 268-270.
Giai, A. G. 1952. Diccionario ilustrado de las aves argentinas. Parte I. Aves continentales. Ed. Haynes. Bs. As.
Giai, A. G.1950. Notas de viajes. Por el norte occidental de Santa Fe y por el norte de Misiones. Hornero 9: 121-164.
Giannini, M. D. A. Serna y C. Urcelay.2001. La Monterita serrana (*Poospiza baeri*) en la sierra de Velazco, La Rioja (Aves: Emberizidae). Nuestras Aves 41: 4-5.
Gigoux, E. E. y G. Looser. 1930. Los tipos de aves conservados en el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago. Boletín del Museo Nacional, Santiago de Chile, 13: 5-36.
Gil, G., E. Haene y J. C. Chebez. 1995. Notas sobre la avifauna de Sierra de las Quijadas. Nuestras Aves 31: 26-28.
Giovambattista, G.1988. Dos citas poco frecuentes para la línea sur, Pcia. de Río Negro. Garganchillo 7: 8.
Giraudo, A, R. S. A. Di Giacomo, M. A. Ordano, M. L. Chatellenaz y E. Krauczuk. 2003b. Aves amenazadas del Iberá: un refugio que se desvanece. Pp. 273-301. En B. B. Alvarez (ed.). Fauna del Iberá. EUDENE. Talleres Gráficos Volpe/Fox, Buenos Aires.
Giraudo, A. R., A. Bortoluzzi y V. Arzamendia. 2006. Vertebrados tetrápodos de la reserva y sitio ramsar "Esteros del Iberá" (Corrientes, Argentina): análisis de su composición y nuevos registros para especies amenazadas. Natura Neotropicalis, 37 (1-2): 1-20.
Giraudo, A. R., J. L. Baldo y R. R. Abramson.1993. Aves observadas en el sudeste, centro y este de Misiones (República Argentina), con la mención de especies nuevas o poco conocidas para la provincia. Nótulas Faunísticas 49: 1-13.
Gómez, V. 2006. Aves del Parque General San Martín (Mendoza). Distribución y características. Multequina, 15 (2): 81-95, versión on line.
Gómez, V. 2011. Estacionalidad de la avifauna en Villavicencio, Mendoza. XV Reunión Argentina de Ornitología. Libro de resúmenes, 85.
Gómez, V. 2013. Avance de la avifauna sobre zonas urbanas en Mendoza. XV RAO. Libro de resúmenes: 29.
Gómez, V. y P. Capllonch. 2009. Comentarios preliminares sobre la avifauna estacional en la Reserva Natural Villavicencio, Las Heras, Mendoza, Argentina. XIII Reunión Argentina de Ornitología. Libro de resúmenes, 120.
Gondim, M. J. C. 2001. Dispersao de sementes de *Trichilia sp*. (Meliaceae) por aves em um fragmento de mata mesófila semidecídua, Rio Claro, SP, Brasil. Ararajuba 9: 101-112.
González Gómez, P. L., Valdivia, C. E., Romero, C. R. Y A. M. Humaña. 2004. *Puya berteroniana* y *Puya coerulea* como recurso alimenticio para aves en Chile central. Bol. Chil. Ornit. 10: 29-33.
González, M. A., F. N. Moschione y M. Saravia. 2011. Avifauna del Cerro Negro de San Antonio, Jujuy. XIV Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 85.
Goodall, J. F, A. W. Johnson y R. A. Philippi.1946. Las aves de Chile. Tomo 1. Platt Est. Graf. SA.
Gorleri, F., M. C. Gorleri y M. Murdoch. 2011. Aves de la Reserva de Biosfera Laguna Oca, Formosa, Argentina. Universidad Nacional de Formosa/SPU Programa de Voluntariado Universitario. Ideas Gráficas. Formosa.
Grant, C. H. B. 1911c. List of Birds collected in Argentina, Paraguay, Bolivia y Southern Brasil, with field notes. Ibis 1911: 80-137; 317-350; 459-478.
Graña Grilli, M. y D. Montalti. 2014. Relación entre la estructura y la ubicación del nido del Varillero ala amarilla (*Agelasticus thilius*). Hornero 29 (1): 37–40.
Grigera, D. E. y S. Rubulis. 1985. Aves de la cuenca del río Manso superior. Cuadernos Univ. Universidad Nac. del Comahue Centro Regional Bariloche. 14: 1-18.
Grigera, D. y C. Pavic. 2007. Ensamble de aves en un sitio quemado y en un sitio no alterado en un área forestal del noroeste de la patagonia argentina. Hornero 22 (1): 29-37.
Grilli, P. y J. I. Areta. 2003. Nuevo registro de Anambé verdoso (*Pachyramphus viridis*) en la provincia de Buenos Aires. Rev. Nuestras aves 46: 28.
Grilli, P., F. Moschione y F. Burgos. 2006. Leucismo parcial en Pepitero de collar *Saltador aurantiirostris* en Santa Bárbaras, Jujuy. Cotinga 25: 89-90.
Guerra-Navarro, C. y V. R. Cueto. 2011. Cambios interanuales en el comportamiento de alimentación de las aves insectivoras del desierto del Monte, Argentina. IX Congreso de Ornitología Neotropical, VIII Congreso Peruano de Ornitología, Libro de resúmens, 472.
Güller, R. 2008.*Sporophila nigrorufa* (D´Orbigny y Lafresnaye, 1837) una nueva especie para la avifauna argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda serie. 20: 1-3.
Güller, R., H. Di Santo y R. Lejarraga. 2004. Nido de Cachirla pálida (*Anthus hellmayri*) en la Reserva Natural Otamendi. Provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 48: 12.
Haedo Rossi, J. A. y J. G. Esteban. 1972. Albinismo en aves y mamíferos argentinos. Acta Zool. Lilloana. 29: 343-366.
Haene, E. H., S. Krapovickas, F. Moschione y D. Gómez. 1995. Observaciones y comentarios biogeográficos sobre la avifauna del este de la provincia de San Juan, Argentina. Hornero 14 (1-2): 48-52.
Haene, E. H.1987. Nuevos registros para la avifauna sanjuanina. Nuestras Aves 12: 18-19.
Haene, E. H.1997. El Comesebo cabeza negra (*Phrygilus atriceps*) en la provincia de San Juan, Argentina. Nuestras Aves 37: 7.
Haene, E., H. Matarasso, J. Veiga y S. Imberti. 2007. Calafate. Naturaleza y Conservaciόm 20: 9.
Handford, P. 1983. Breves notas sobre aves del valle de Tafí, provincia de Tucumán. Neotrópica 29 (81): 97-105.
Haro, G. 2002. Aves albinas en la colección del Museo de Zoología de la Universidad Nacional de Córdoba. Natura Neotropicalis 33: 85-88.

Haro, J. G. 1998. Alimentación de aves insectívoras en un bosque de coníferas en río de los Sauces (Córdoba, Argentina) Natura Neotropicalis 29: 117-125.
Haro, J. G. y M. Gutierrez. 1992. La avifauna de una forestación de pinos en río de los Sauces, Córdoba. Hornero 13: 214-218.
Harris, G. 2008. Guía de aves y mamíferos de la costa patagónica. El Ateneo. Buenos Aires.
Hartert, E. y S. Venturi.1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. Novit. Zool. 16: 159-267.
Haupt, C. y M. E. Mermoz. 2009. Comportamiento de rechazo de huevos de Tordo renegrido (*Molothrus bonariensis*) en el Dragón (*Pseudoleistes virescens*). XIII RAO: 157. Tafí del Valle, Tucumán.
Haupt, C., M. E. Mermoz y G. J. Fernandez.2005. Defensas antiparasitarias del pecho amarillo (*Pseudoleistes virescens*): ¿Existe alguna relación entre la intensidad de defensa del nido y la habilidad de reconocer huevos ajenos? XI RAO: 112. Buenos Aires.
Hecker, E. y F. Vidoz. 1998. Aves del Lago Escondido. Hidden Lake S.A. Págs. 95.
Heinonen, S. y J. C. Chebez. 1989. Nuevas aves para Misiones. Nuestras Aves 18: 5-7.
Hermann, H. y W. Meise. 1965. Untersuchungen zur Brutbiologie des Töpfervogels *Furnarius rufus* (Gmelin) auf einer argentinischen hacienda. Abhandlungen und Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg NF 10 : 117-145.
Herrera, E. D., V. Cailly-Arnulphi, S. Leveque, A. Arias y D. Elizondo. 2013. Aves del departamento Valle Fértil, San Juan, Argentina. Libro de Resúmenes XV RAO: 68. Santa Rosa, La Pampa.
Hilty, S. L. 2011. Family Thraupidae (Tanagers) Pp. 46-329 in: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 16. Tanager to New World Blackbirds. Lynx Edicions, Barcelona.
Holland, A. H. 1890. On some birds of the Argentine Republic. With notes by P. L. Sclater. Ibis 1890: 424-428.
Holland, A. H. 1892. Short notes on the birds of Estancia Espartillar, Argentina Republic. Ibis 1892: 193-214.
Holland, A. H. 1893b. Field-Notes on the Birds of Estancia Sta. Elena, Argentine Republic. Ibis: 483-488.
Holland, A. H. 1895. Field-Notes on the Birds of Estancia Sta. Elena, Argentine Republic. Wiht Notes by P. L. Sclater. Ibis 1895: 213-217.
Höy, G. y J. Ottow. 1964. Biological and oological studies of the molothrine cowbirds (Icteridae) of Argentina. Auk 81: 186-203.
Höy, G.1971. Über Brutbiologie und Eier einiger Vögel aus Nordwest-Argentinien II. Jour. Für Ornit. 112, Heft 2: 158-163.
Höy, G.1980b. Notas nidobiológicas del noroeste argentino. II. Physis, Secc.C.39 (96): 63-66.
Hudson, W. H. 1870. Sixth letter on the ornithology of Buenos Ayres. Proceeding of the Zoological Society of London 1870: 545-547.
Hudson, W. H. 1872. On the birds of the Río Negro of Patagonia. Proc. Zool. Soc. London: 534-550.
Hudson, W. H. 1974. Notes on the procreant instinct of the three species of *Molothrus* in Buenos Ayres. Proceeding of the Zoological Society of London 1874: 153-174.
Humphrey, P. S., D. Bridge, P. W. Reynolds y R. T. Peterson.1970. Birds of Isla Grande (Tierra del Fuego). Prelim. Smiths. Manual. University of Kansas. Mus. of Nat. Hist. Págs. 411.
Humphrey, P. S., D. Siegel-Causey y P. C. Rasmusenn. 1985. Report on Ornithological Research conducted in the provinces of Chubut and Santa Cruz, Argentina. December 1934 through February 1985. Museum of Nathural Hitory University of Kansas, 38 pp.
Ibañez, L., M. del Huerto, V. D. Fiorini y D. Montalti. (2011). Reproducción del Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*), una especie exótica, en Buenos Aires. Resúmenes XIV RAO, Formosa: 89.
Idoeta, F. Roda M. e I. Roesler (2011). La Golondrina tijerita *Hirundo rustica* sigue expandiendo su área de nidificación en Argentina. Cotinga 33: OL58-60.
Imberti, S. y C. Albrieu.2001. Lista de las aves de la laguna Nimez. Univ. Nac. de la Patagonia Austral, Rio Gallegos, Santa Cruz, Argentina. Pag. 1-8.
Ippi, S. y A. Trejo. 2003. Dinámica y estructura de bandadas mixtas de aves en un Bosquede lenga (*Nothofagus pumilo*) del noroeste de la patagonia argentina. Ornitología Neotropical 14: 353-362.
Isacch, J. P. 2002. Nectarivorous feeding by shiny cowbirds: a complex feeding innovation. The Wilson Bulletín 114 (3): 412-414.
Isacch, J. P. y M. M. Martínez. 2001. Estacionalidad y relaciones con la estructura del hábitat de la comunidad de aves de pastizales de Paja colorada (*Paspalum quadrifarium*) manejados con fuego en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ornitología Neotropical. 12: 345-354.
Isacch, J. P., C. F. Pérez y O. O. Iribarne. 2006. Bird species composition and diversity at middle argentinean coast of la Plata River. Ornitología Neotropical 17: 419-432.
Isacch, J. P., M. S. Bó, N. O. Maceira, M. R. Demaría y S. Peluc. 2003. Composition and seasonal changes of the birds community in the West Pampa Grasslands of Argentina. Journal Field Ornithology, 74 (1): 59-65.
Jaramillo, A. P. 2000. Punta Rasa, South America´sfirst vagrant trap?. Cotinga 14: 33-38.
Jehl, J. R. y M. Rumboll. 1976. Notes on the avifauna of isla Grande and Patagonia, Argentina. Trans. of the San Diego Soc. of Nat. Hist. 18: 145-154. San Diego.
Jordán, E. A., R. M. Fraga, R. Rivollier, M. Dellacasa y G. Puente. 2015. Poblaciones recientes del Tordo amarillo (*Xanthopsar flavus*) en Entre Ríos. XVI. Reunión Argentina de Ornitología: 104. La Plata. Buenos Aires.
Keith, A. R. 1970. Bird observations from Tierra del Fuego. Condor 72 (3): 361-363.

Keve, A. y A. Kovács. 1971. Notas taxonómicas sobre el Chingolo (*Zonotrichia capensis*) del sud-oeste argentino. Hornero 11: 85-92.

Kiltie, R. A. y J. W. Fitzpatrick.1984. Reproduction and social organization of the Black-Capped Donacobius (*Donacobius atricapillus*) in southeastern Perú. The Auk 101: 804-811.

King, J. R. 1973. Reproductive relationships of the Rofous-Collared Sparrow an the Shiny Cowbird. Auk, 90: 19-34.

Klavins, J. y D. Álvarez. 2012. El Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en la provincial de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 57: 27-29.

Klimaitis, J. F. y F. N. Moschione.1986. Cartilla sistemática de las aves de la Reserva integral de selva subtropical marginal de Punta Lara y sus alrededores (Provincia de Buenos Aires).

Kovacs, C., O. Kovacs, Z. Kovacs y C. M. Kovacs. 2005. Manual ilustrado de las aves de la patagonia, Antártica Argentina e islas del Atlántico Sur. 368 pág. El Bolsón.

Krauczuk, E. R. 2005. Aves do Inta-Campo Anexo ao Zaiman, e do Campus da Universidade Nacional de Misiones, Posadas, Misiones, Argentina. Atualidades Ornitológicas Nº 126: 1-22.

Krauczuk, E. R. 2006. Las aves del gran Posadas (Misiones, Argentina) y comentarios sobre especies de interés. Atualidades Ornitológicas Nº 134.

Krauczuk, E. R. 2008. Riqueza específica, abundancia y ambientes de las aves de Corpus Chriti, San Ignacio, Misiones, Argentina. Lundiana 9 (1): 21-31

Krauczuk, E. R. y A. S. Di Giacomo. 2005. Reserva Natural Rincón de Santa María. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 147-148. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.

Krauczuk, E. R. y F. Castía.2009.Notes on geographic distribution of three birds species in Misiones province, Argentina. Actualidades Ornitológicas On-line Nº 151.

Krauczuk, E. R. y J. Baldo.2004. Contribuiçao para o conhecimento da avifauna de um fragmento de floresta com araucaria em Misiones, Argentina. Actualidades ornitológicas 119: 1-42.

Kroodsma, D. E. y D. Brewer. 2005. Family Troglodytidae (Wrens). Pp. 356-447 en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.10. Cuckoo-shrikes to Thrushes. Lynx Edicions, Barcelona.

Krügel, M. M. e E. R. Behr. 1999. Consumo dos frutos de *Alchornea triplinervia* (Euphorbiaceae) por aves em fragmentos florestais urbanos de Maringá, Paraná. Biotemas 12 (1): 149-155.

Krügel, M. M. y E. R. Behr. 1998. Utilizaçao de frutos de *Schinus terebinthifolius* Raddi (Anacardiaceae) por aves no Parque do Ingá, Maringá, Paraná. Biociências 6: 47-56.

Krügel, M. M., M. I. Burger e M. A. Alves. 2006. Frugivoria por aves em *Nectandra megapotamica* (Laureaceae) em uma área de Floresta Estacional Decidual do Rio Grande do Sul, Brasil. Iheringia, Ser. Zool. 96: (1): 17-24.

Laguna, M., E. Martí, S. Dardanelli y M. Nores.2005. Predadores de nidos en aves en fragmentos de bosque en Córdoba, Argentina. XI RAO: 117. Buenos Aires.

Lambertucci, S. A., F. Barbar, C. Cabrera, y M. Bertini. 2009. Comentarios sobre las aves de la sierra de Pailemán, Río Negro, Argentina. Nuestras Aves 54: 81-87.

Lange, C. 1981. Una temporada de observaciones sobre *Podiceps gallardoi* (Aves: Podicipediformes). Ecología y etología. Neotrópica 27 (77): 39-56.

Larracoechea, G., H. Durán y C. D´Acunto. 2012. Nidificación de la Golondrina tijerita (*Hirundo ristica*) en el balneario Arroyo Pareja, Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 57: 18-19.

Leiva, L. A., S. M. Verón y M. D. Acosta. (2004). Nidos de aves pertenecientes a la colección del Museo Provinvial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino, Santa Fe, Argentina. Serie Catálogo Nº 18: 1-68.

Leveau, C. M. y L. M. Leveau. 2006. Ensamble de aves en calles arboladas de tres ciudades costeras del sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hornero 21: 25-30.

Leveau, C. M. y L. M. Leveau.2001. Nuevos registros de aves para Benito Juárez, provincia de Buenos Aires (Argentina). Nuestras Aves 41: 30-31.

Leveau, L. M. y C. M. Leveau. 2004b. Riqueza y abundancia de aves en agroecosistemas pampeanos durante el período post-reproductivo. Ornit. Neotropical 15 (3): 371-380.

Leveau, L. M. y C. M. Leveau. 2005. Avian community response to urbanization in the pampean region, Argentina. Ornitología Neotropical 16: 503-510.

Leveau, L. M. y C. M. Leveau. 2011b. Uso de bordes de cultivo por aves durante invierno y primavera en la pampa austral. Hornero 26: 149-157.

Lichtenstein, G. 1998. Parasitism by Shiny Cowbirds of Rufous-bellied Thrushes. Condor 100: 680-687.

Liljeström, M., J. C. Reboreda y A. Schiavini. 2008. Biología reproductiva de la Golondrina patagónica *Tachycineta meyeni* en Tierra del Fuego. Comunicación: Poster. XII RAO. San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia Argentina: 74.

Llanos, F. A., M. Failla, G. J. García, P. M. Giovine, M. Carbajal, P. M. González, D. Paz Barreto, P. Quillfeldt and J. F. Masello. 2011. Birds from the andangered Monte, the Steppes and Coastal biomes of the province of Río Negro, northern Patagonia, Argentina. Check List. Vol. 7. www.checklist.org.br

Llanos, F. B. y J. G. García. 2005. Biodiversidad de aves, mamíferos y reptiles del Área Natural Protegida Embalse y Costa Dique Casa de Piedra, Río Negro, Patagonia Argentina. Informe Dirección de Fauna Silvestre. Río Negro.

Lobo Allende, I. R., A. L. Echevarría, J. M. Chani y M. D. Juri. 2009. Aporte al conocimiento de cuatro especies del monte: *Asthenes steinbachi*, *Pseudoseisura gutturalis ochroleuca*, *Teledromas fuscus* y *Poospiza ornata*. XIII RAO: 122. Tafí del Valle. Tucumán, Argentina.

Lobo Allende, I. R., A. L. Echevarría, y M. D. Juri. 2010. Distribución y abundancia de cuatro especies de aves endémicas del monte, en Catamarca y La Rioja, Argentina. Acta Zool. Lilloana 54 (1-2): 129-138.

Lobo Allende, I. R., P. Bortnyk y M. D. Juri. 2014. Aportes a la avifauna de la provincia de La Rioja, Argentina. Acta zoológica lilloana 58 (1): 161-164.

Lobo Alllende, I. R. y P. N. Bortnyk. 2013. Aporte al conocimieno de la avifauna de La Rioja. XV RAO. Santa Rosa, La Pampa. Libro de Resúmenes: 69.

Lomáscolo, S. B., A. C. Monmany, A. Malizia y T. E. Martin. 2010. Flexibility in nest choice and nesting success of *Turdus rufiventris* (Turdidae) in a montane forest in northwestern Argentina. The Wilson J. of Ornithology 122 (4): 674-680.

Lopes, L. E., Fernandes, A. M. y M. A. Marini. 2005. Diet of some Atlantic Forest birds. Ararajuba 13: 95-103.

López de Casenave, J. y L. Marone. 1996. Efectos de la riqueza y de la equiatividad sobre los valores de diversidad en comunidades de aves. Ecología, 10: 447-455.

López de Casenave, J., J. P. Pelotto, S. M. Caziani, M. Mermoz y J. Protomastro. 1998. Responses of avian assemblages to a natural edge in a Chaco semiarid forest in Argentina. The Auk 115 (2): 425-435.

López de Casenave, J., J. P. Pelotto, S. M. Caziani, M. Mermoz y J. Protomastro. 1998. Responses of avian assemblages to a natural edge in a Chaco semiarid forest in Argentina. The Auk 115 (2): 425-435.

López de Casenave, J., V. R. Cueto y L. Marone. 2008. Seasonal dynamics of guild structure in a bird assemblage of the central Monte desert. Basic and Applied Ecology, 9: 78-90.

López Lanús, B., A. G. Di Giacomo y M. Babarskas. 1999. Estudios sobre ecología y comportamiento de la Pajonalera pico recto *Limnoctites rectirostris* en la Reserva Otamendi, Buenos Aires, Argentina. Cotinga12: 61-63.

López Lanús, B.1997. Inventario de las aves del Parque Nacional "Río Pilcomayo" Formosa, Argentina. Monografía Especial L.O.L.A. Nº 4, 76 págs. Bs.As.

López-Lanús, B. (2015). Guía Audiornis de las aves de Argentina, fotos y sonidos; identificación por características contrapuestas y marcas sobre imágenes. Primera edición. Audiornis Producciones. Buenos Aires, Argentina. Versión de autor de 19 ejemplares, ISBN ISBN 978-987-33-9633-5.

López-Lanús, B., A. Galimberti, C. Giarduz, H. Luna, M. Manassero, A. A. Pautasso, M. P. Ducommun, A. A. G. Saigo, P. Petracci, G. A. Marteleur y M. R. de la Peña. 2013a. Inventario focal de fauna de las estancias El Estero, La Norma, El Matrero y La Elena en el sitio piloto San Javier: Santa Fe, Argentina. En pp. 135-169/277-306/331-347/507,511-513: G. D. Marino, F. Miñarro, M. E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.

López-Lanús, B., A. S. Di Giacomo, A. Azpiroz, P. Haynes, A. Galimberti, A. Keyel, A. Ocampo, R. Güller, R. Moller Jensen, M. Mattalia, H. Cardoso, C. Giarduz, G. Papini y A. G. Di Giacomo. 2013b. Inventario focal de fauna de las estancias La Higuera, María Concepción, La Serena y Virocay en el sitio piloto Aguapey: Corrientes, Argentina. En pp. 179-223/277-293/307-319/331-347/490,494-506: G. D. Marino, F. Miñarro, M. E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.

López-Lanús, B., D. Unterkofler, U Ornstein, V. del Sastre, R. Moller Jensen y P. Herrara. 2013d. Diversidad y estado de conservación de las aves de los Bajos Submeridioles (AICA SF03): informe de Aves Argentinas/AOP para la Fundación Vida Silvestre Argentina; junio de 2009. En pp. 375-417: G. D. Marino, F. Miñarro, M. E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.

López-Lanús, B., P. Grilli, E. Carini, M. Montero y J. Castillo. 2013c. Inventario focal de fauna de las estancias La Catalina, La Aurora del Palmar, La Filiferta y Campo Bajo en el sitio piloto Gualeguaychú: Entre Ríos, Argentina. En pp. 179-223/277-293/307-319/331-347/490,494-506: G. D. Marino, F. Miñarro, M. E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.

Lucero, F. y C. Schmidt. 2014. Observaciones de Macá plateado (*Podiceps occipitalis occipitalis*) y Golondrina zapadora (*Riparia riparia*) en la laguna Seca, Guayata (*Chloephaga melanoptera*) y Cauquén común (*Chloephaga picta*) en la laguna Larga, provincias de San Juan y Mendoza, Argentina. Ecoregistros 4 (8): 21-28.

Lucero, F. y J. C. Chebez. 2011. Nuevas citas y ampliación de la distribución de algunas aves en las provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 71: 1-16.

Lucero, M. M., J. M. Chani, Z. J. Brandán, A. L. Echevarría y M. D. Juri. 2002. Lista de aves de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena. Acta Zool. Lilloana 46 (1 y 2): 131-135.

Lucero, R. F., F. L. Agnolin, S. O. Lucero y M. C. Molina. 2011. Fauna de la Reserva Micológica "Dr. Carlos Spegazzini", Partido de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Parte I : Mammalia-Aves. Tercera serie. 1: 65-94.

Luna, H. y M. Manassero. 2013. Registros documentados de aves en Santa Fe, Argentina. Nuestras aves 58: 63-68.

Macchi, L., P. G. Blendinger y M. G. Nuñes Montellano. 2011. Spatial analysis of sap consumption by birds in the Chaco dry forests from Argentina. Emu 111: 212-216.

Maceda, J. J. y M. Erro. 2010. Juan chiviro (*Cyclarhis gujanensis*), Chiví común (*Vireo olivaceus*) y Remolinera patagónica (*Cinclodes patagonicus*) en la provincia de La Pampa, Argentina. Nuestras Aves 55: 40-42.

Maceda, J. J. y M. S. Kin.2001. Lista de las aves de la Facultad de Agronomía de Santa Rosa (La Pampa) y sus alrededores. Rev. Fac. Agr. UNL La Pampa. Vol. 12 Nº 1: 21-30.

Maceda, J. J., M. Mero, H. Riesco y M. Dolsan.2001. Lista de las aves de la reserva Parque Luro, La Pampa. Rev. Fac. Agr. UNL La Pampa. Vol. 12 Nº 2: 47-59.

Machado, L. O. M. e G. A. B. da Rosa. 2005. Frugivoria por aves em *Cytharexyllum myrianthum* Cham (Verbenaceae) em áreas de pastagens de Campinas, SP. Ararajuba 13 (1): 113-115.

Maders, C., N. Fariña y A. Bodrati. 2007. Redescubrimiento del bailarín castaño (*Piprites pileata*) en Argentina. Ornit. Neotr. 18: 127-131.

Mahler, B., Y. S. Adamson, A. G. Di Giacomo, V. A. Confalonieri y J. C. Reboreda. 2009. Utilization of new host in the screaming cowbird *Molothrus rufoaxillaris*, a host specilist brood parasite: host switch or host acquisition ?. Behav Ecol. Sociobiol 63: 1603-1608.

Malizia, L. R., P. G. Blendinger, M. Eva Alvarez, L. O. Rivera, N. Politi y G. Nicolossi. 2005. Bird communities in Andean premontane forests of Northwestern Argentina. Ornitología Neotropical 16: 231-251.

Manassero, M., H. Luna y L. Acquaviva.2006. Nuevos registros de aves para Santa Fe, Argentina. Parte II. Nuestras Aves 51: 29-31.

Marateo, G., H. Povedano y J. Alonso. 2009. Inventario de las aves del Parque Nacional El Palmar, Argentina. Cotinga 31: 47-60.

Marigliano, N. L., C. I. Navarro y Z. J. Brandán. 2010. Aves asociadas a los bordes de una parcela cultivada con Trigo (Burruyacú, Tucumán, Argentina) Acta Zool. Lilloana 54 (1-2): 121-128.

Marone, L. 1990. Modifications of local and regional bird diversity after a fire in the Monte Desert, Argentina. Revista Chilena de Historia Natural, 63: 187-195.

Marone, L. 1991. Habitat features affecting birda spatial distribution in the Monte desert, Argentina. Ecología Austral, 1: 77-86.

Marone, L. 1992b. Seasonal and year-to-year fluctuations of birds populations and guilds in the Monte Desert, Argentina. J. Field. Ornithol. 63: 294-308.

Marone, L., B. E. Rossi y J. López de Casenave. 1998. Granivore impact on soil-seed reserves in the central Monte desert, Argentina. Functional Ecology, 12: 640-645.

Marone, L., J. López de Casenave y V. R. Cueto. 1997. Patterns of habitat selection by wintering and breeding granivorous birds in the central Monte desert, Argentina. Revista Chilena de Historia Natural, 70: 72-81.

Marone, L., J. López de Casenave y V. R. Cueto. 2000. Granivory in southern South America Desert: conceptual issues and current evidence, BioScience, 50 (2): 123-132.

Marone, L., J. López de Casenave, F. A., Milesi, y V. R. Cueto. 2008. Can seed-eating birds exert top-down effects on grasses of the Monte desert?. Oikos 117: 611-619.

Martella, M. B., J. L. Navarro y E. H. Bucher. 1985. Vertebrados asociados a los nidos de la Cotorra Myiopsitta monachus en Córdoba y La Rioja. Physis 43: 49-51.

Martella, M. B., J. L. Navarro y E. H. Bucher. 1985.Vertebrados asociados a los nidos de la Cotorra *Myiopsitta monachus* en Córdoba y La Rioja. Physis 43: 49-51.

Martinez Achenbach, G. 1957. Lista de las aves de la Provincia de Santa Fe. Anal. Mus. Cs. Nat. " F. Ameghino". Tomo 1 (1): 1-61.

Martínez Gamba, R. 2014. Lista de aves del Parque Natural Municipal Monte Seguín, Provincia de Misiones, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 163: 1-10.

Martínez, F., E. Bustos y F. Santos. 2012. El sistema Leyes-Tulumaya sigue dando sorpresas ¿Establecimiento del Federal (*Amblyramphus holosericeus*) en Mendoza?. Nuestras Aves 57: 51-53.

Martínez, F., F. Lucero, R. Calí, D. Valdés, D. Ferrer y J. C. Chebez. 2009. Registros novedosos de aves para las provincias de Mendoza y San Juan. Nótulas Faunísticas. Segunda serie Nº 35: 1-9.

Martínez, H. S., Sorraco, M. T. y A. D. Bischff. 1975. Nota preliminar sobre alimentación de aves de la zona de Chasicó (partido de Villarino- provincia de Buenos Aires). Direc. Rec. Nat. Minis. Asun. Agrar. 1-12.

Mason, P. 1985. The nesting biology of some passerines of Buenos Aires, Argentina, Pp. 954-972. En P. A. Buckley, M. S. Foster, E.S. Morton, R. S. Ridgely and F. G. Buckley (eds.) Neotropical Ornithology. Orntith. Monogr. Nº 36.

Mason, P. 1986. Boord parasitism in a host generalist, the Shiny Cowbird: II. Host selection. Auk, 103: 61-69.

Mason, P. 1987. Pair formation in Cowbirds: evidence found for Screaming but not Shiny Cowbirds. Condor 89: 349-356.
Masramón, D. O. de. 1975. Contribución al estudio de las aves de San Luis. Hornero 11: 309-311.
Masramón, D. O. de. 1980. Contribución al estudio de las aves de San Luis. Hornero 12: 59-68.
Masramón, D. O. de. 1983. Lista de aves del nordeste de San Luis. Hornero extraordinario 77-87.
Masramón, D. O. de.1962. Nidificación de algunas aves de San Luis. Nuestras aves Nº 1: 8-10.
Massoni, V. y J. C. Reboreda. 1995. Nidificación colonial y exito reproductivo del Varillero de ala amarilla *Agelaius thilius*. V Cong. Ornit. Neotropical : 22. Asunción. Paraguay.
Massoni, V. y J. C. Reboreda. 1998. Cost of brood parasitism and the lack of defenses on the Ywllow-winged Blackbird-Shiny Cowbirds system. Behavioral Ecology and Sociobiology, 42: 273-280.
Massoni, V., D. W. Winkler y J. C. Reboreda. 2006. Brood parasitism of White-rumped Swallows by Shiny Cowbird. Journal of Field Ornithology, 77: 80-84.
Massoni, V.; Loetti, V. y J. C. Reboreda. 2005. Sexual dimorphism and oarental care in the Yellow-wiged Blackbird (*Agelaius thilius*). Orniología Neotropical 16: 551-555.
Matarasso, H. F. y F. R. Seró López. 2008. La Tenca (*Mimus thenca*) en la provincia de Neuquén: una nueva especie para Argentina. Hornero 23 (1): 41-43.
Maugeri, F. G. y H. O. Drozd.2006. Primer registro de nidificación del Matico (*Icterus croconotus strictifrons*) para la Argentina. Ornitología Neotropical 17: 301-305.
Maugeri, F. G. y J. Liotta.2002. Primer registro de *Carduelis atrata* (Aves: Fringillidae) y una nueva cita de *Gnorimopsar chopi* para la provincia de Buenos Aires, Argentina (Aves: Icteridae). Neotrópica 48: 83-84.
Mazar Barnett, J. y J. Herrera.1996. Primer registro de *Tiaris fuliginosa* (Wied, 1830) para la Argentina. Hornero 14 (3): 73-74.
Mazar Barnett, J. y M. Pearman.2001. Lista comentada de las aves argentinas. Lynx Edicions. Barcelona. Págs.163.
Mazar Barnett, J., Pugnali, G. D., Pearman Morrison, M., Bodrati, A., Moschione, F., Clark, R., Roesler, I., Monteleone, D., Casañas, H., Burgos Gallardo, F., Segovia, S., Pagano, L., Povedano, H. y J. Areta. 2014. The Andean Swallow (*Orochelidon andecola*) in Argentina. Rev. Brasileira Ornitología 22: 172-179.
Mazar Barnett, J., R. Clark, A. Bodrati, G. Bodrati, G. D. Pugnali and M. Della Seta.1998c. Natural history notes on some little-know birds in north-west Argentina. Cotinga 9: 64-75.
Mazar Barnett, J., R. Clark, A. Bodrati, G. Bodrati, G. D. Pugnali and M. Della Seta.1998c. Natural history notes on some little-know birds in north-west Argentina. Cotinga 9: 64-75.
Mazza, S. y A. Fiora. 1930. Proteosoma de Mirlo, *Planesticus anthracinus* (Burm.) y Leucocitozoon de Benteveo, *Pitangus sulphuratus bolivianus* (Latr.) y Fueguero, *Piranga flava* (Vieill.) de Tumbaya (Jujuy). V Reunión de la Sociedad Argentina de Patología Regional del Norte: 993-995.
Mazza, S. y A. Fiora. 1932. Nuevos hemoproteus y microfilarias de aves de Jujuy. VII Reunión de la Sociedad Argentina de Patología Regional del Norte: 998-1001.
Mérida, E. y A. Bodrati. 2006. Consideraciones sobre la conservación de los talares de barrancas del nordeste de Buenos Aires y descripción de las características de un relicto en Baradero. En : Mérida, E. y J.Athor (Editores). Talares bonaerenses y su conservación. Fundación de Historia Natural "Félix de Azara". Buenos Aires.
Mermoz, M. E. y G. J. Fernández. 1999. Albinismo parcial en el Varillero ala amarilla (*Agelaius thilius*). Nuestras aves 40: 20-21.
Mermoz, M. E. y G. J. Fernández. 1999b. Low frecuency of Shiny Cowbird parasitim on the Scalet-headed Blackbirds: anti-parasite adaptations or nonspecific host life-history traits. Journal of Avian Biology, 30: 15-22.
Mermoz, M. E. y G. J. Fernández. 2003. Breeding success of a specialist brood parasite, the Screaming Cowbird, parasitizing an alternative host. The Condor 105 (1): 63-72.
Mermoz, M. E. y J. C. Reboreda. 1993. Exito reproductivo del Tordo, *Molothrus bonariensis*, en nidos del Pecho amarillo, *Pseudoleistes virescens.* Resúmenes VIII RAO: 28. Pto. Iguazú.
Mermoz, M. E. y J. C. Reboreda. 1994. Brood parasitism of the Shiny Cowbirds, *Molothrus bonariensis*, on the Brown-and-Yellow Marshbids, *Pseudoleistes virescens*. Condor 96: 716-721.
Mermoz, M. E. y J. C. Reboreda. 1996. New host for a specialized brood parasite, the screaming cowbird, Condor 98: 630-632.
Mermoz, M. E. y J. C. Reboreda. 2003. Reproductive success of shiny cowbird (*Molothrus bonariensis*) parasitizing the large brown-and-yellow marshbird (*Pseudoleistes virescens*) in Argentina. Auk, 120 (4): 1128-1139.
Mermoz, M. E. y J. C. Reboreda.1995b. Adaptaciones de *Pseudoleistes virescens* contra el parasitismo de cría de *Molothrus bonariensis.* V Cong. Ornit. Neotropical : 90. Asunción. Paraguay.
Mezquida, E. T. 2004b. Nest site selection and nesting success of five species of passerines in a South American open Prosopis woodland. Journal Ornithology, 145: 16-22.
Mezquida, E. T. y L. Marone. 2003b. Comparison of the reproductive biology of two Poospiza warblind-finches of Argentine in wet and dry years. Ardea, 91 (2): 251-262.
Mezquida, E. T. y L. Marone.2001. Factors affecting nesting success of a bird assembly in the central Monte Desert, Argentina, J. Avian, Biol. 32: 287-296.
Mezquida, E. T.2003. La reproducción de cinco especies de Emberizidae y Fringillidae en la reserva de Ñacuñan,

Argentina. Hornero 18 (1): 13-20.
Miatello, R., C. Rosacher y V. Cobos.1993. Algunas especies de aves nuevas o con pocos registros para la provincia de Córdoba, República Argentina. Nótulas Faunísticas 50: 1-12.
Miatello, R., J. Baldo, M. Ordano, C. Rosacher y L. Biancucci.1999. Avifauna del Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídrica Provincial de Achala. Córdoba. Argentina. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables. Córdoba. Pp. 193.
Miatello, R., V. Cobos y C. Rosacher. (1991) 1994. Algunas especies de aves nuevas o poco conocidas para la provincia de Córdoba, República Argentina. Nótulas Faunísticas 69: 1-5.
Milat, J. A. y J. F. Klimaitis.1993. Nidificación y comportamiento reproductivo del Pitiayumí (*Parula pitiayumi*) en Magdalena, Buenos Aires. Mus. Ornt. Municipal de Berisso. Pub.Nº 5: 1-11.
Militello, E. y J. C. Chebez. 2009. Notas sobre aves del Parque Nacional Iguazú y zona de influencia, Misiones, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda serie 32: 1-5.
Miller, L. 1917. Field notes on *Molothrus bonariensis* and *M. badius*. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 37: 579-592.
Moller Jensen, R. C. 2006. Registro del Fueguero oscuro (*Ramphocelus carbo*) en el Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones, Argentina. Nuestras Aves 52: 33-34.
Montaldo, N. H. 2000. Exito reproductivo de plantas ornitócoras en un relicto de selva subtropical en Argentina. Rev. Chilena de Hist. Nat. 73: 511-524.
Montaldo, N. H. y J. A. Claver. 1986. Guía de las aves silvestres de las Facultades de Agronomía y de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Rev. Fac. Agr. 7 (2-3): 191-216.
Montaldo, N. H.2005. Aves frugívoras de un relicto de selva subtropical ribereña en Argentina : manipulación de frutos y destino de las semillas. Hornero 20 (2):163-172.
Montalti, D. y G. Kopij (2001). Bird community of inner La Plata City, Argentina. Acta Ornithologica 36:161–164
Montalti, D., Ferman, L., Camperi, A. R., Soave, G. E., Arambarri, A. M. y C. A. Darrieu. 2005. Winter diet of Great Pampa-Finches *Embernagra platensis* in Guaraní Lagoon, Argentina. Act. Ornithol. 40: 79-82.
Monteleone, D. e I. Roesler. 2005. Las aves de los bosques y pastizales montanos: una recorrida por los sitios menos explorados del noroeste argentino. Naturaleza y conservación, 17: 8-15.
Moreyra, P. 1997. Informe interno. Administración de Parques Nacionales. 11 páginas.
Moschione, F. N. y J. San Cristóbal.1991b. Nuevas observaciones de la Viuva *Pipraidea melanonota* en la ribera platense. Garganchillo 11: 10.
Moschione, F. N. y J. Segovia. 2005. Listado de las aves de la Reserva Natural Las Lancitas, Santa Bárbara, Jujuy. (Informe Téc.) Proy. Elé/DFS.
Moschione, F. N., A. L. Sureda, L. Lizarraga y M. A. González. 2008a. Las aves de las áreas protegidas del Noroeste argentino: su representación por unidad, provincia y ecoregión. Comunicación Poster. XII. RAO: 147. San Martín de los Andes, Neuquén.
Moschione, F. N.1989b. Nuevas aves para la reserva de Punta Lara. Garganchillo 10: 7-11.
Moschione, F. y L. Bishels. 2004. Listado de las aves del Parque Provincial Loro Hablador, provincia del Chaco. Informe Técnico. Proyecto Elé/DFS. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Moschione, F. y R. Banchs. 1992. Informe de factibilidad para la creación de un refugio de vida silvestre en el campo "Los Morillos" de Ansilia S.A. Informe inédito. Fundación Vida Silvestre Argentina. Buenos Aires.
Moschione, F., O. Spitznagel y M. González. 2013. Lista de aves de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta.
Muzzachiodi, N. 2001b. Nuevos registros de aves para el área natural protegida "Islote Municipal", Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 2: 1-2.
Muzzachiodi, N. 2002. Avifauna registrada en la reserva natural "Juan Bautista Alberdi", Oro Verde, departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 11: 1-3.
Muzzachiodi, N., M. G. Wilson y R. A. Sabattini. 2003. Avifauna registrada en un ciclo anual en el Parque Escolar Rural "Enrique Berduc", La Picada, Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 16: 1-3.
Narosky, S., R. Fraga y M. de la Peña. 1983. Nidificación de las aves argentinas (Dendrocolaptidae y Furnariidae). Asoc. Ornit. del Plata, 98 pp.
Narosky, T. y A. G. Di Giacomo.1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires, distribución y estatus. Asoc. Orn. del Plata. Vazquez Mazzini Editores, L.O. L. A., Buenos Aires.
Narosky, T. y A. Martelli. 1995. Una nueva visita al este de Formosa. Nuestras Aves 31: 28-29.
Narosky, T. y L. M. Lozzia. 1988. Aves de la Reserva El Bagual. Nuestras Aves 15: 7-9.
Navarro, C. I. y N. L. Marigliano. 2009. Presencia del Saí común (*Conirostrum speciosum*) en la provincia de Tucumán. Nuestras Aves 54: 87-88.
Navas, J. R. 1964. Nota sobre la distribución geográfica de *Sicalis auriventris* y de *Sicalis u. uropygialis* (Aves, Fringillidae). Neotrópica 10 (31): 36-39.
Navas, J. R. 1982. Introducción a la avifauna del Parque Nacional El Palmar. Anales P. Nac. XV : 35-64.
Navas, J. R. 1994. Aves nuevas o poco comunes de la Patagonia, Neotrópica 40 (103-104): 93-94.
Navas, J. R. 2002b. Las aves exóticas introducidas y naturalizadas en la Argentina. Rev. Mus. Argentino Ciencias Nat., N.S. 4 (2): 191-202.

Navas, J. R. y N. A. Bó. 1988b. Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina. III. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Zool. 15: 11-37.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1990. Apuntes sobre aves de la meseta de Somuncurá, provincia de Río Negro. Neotropica 36: 45-53.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1991c. Anotaciones taxonómicas sobre Emberizidae y Fringillidae de la Argentina (Aves: Passeriformes). Rev. del Museo de La Plata. Zool. 15: 119-134.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1993. Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina. V.(addenda) Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Zool. 16 (4): 37-50.
Navas, J. R. y N. A. Bó.1986b. Notas sobre una colección de aves del Parque Nacional Lihué Calel, La Pampa, Argentina. Hornero 12: 250-261.
Navas, J. R. y N. A. Bó.2000. Aportes al conocimiento de la distribución, la cría y el peso de aves de las provincias de Mendoza y San Juan, República Argentina. Primera parte. (Aves: Phytotomidae, Mimidae, Troglodytidae, Moracillidae, Emberizidae y Fringillidae). Hornero 15 (2): 123-127.
Nores, A. I. y M. Nores.1994. Nets building and nesting behavior of the Brown Cacholote. Wilson Bull. 106 (1): 106-120.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1983c. Especiación en las sierras pampeanas de Córdoba y San Luis (Argentina) con descripción de siete nuevas subespecies de aves. Hornero Nº Extraordinario: 88-102.
Nores, M. y D. Yzurieta.1975. Sobre aves de la Provincia de Córdoba. Hornero 11: 312-314.
Nores, M. y D. Yzurieta.1980b. Aves de ambientes acuáticos de Córdoba y centro de Argentina. Sec. de Estado de Agricultura y Ganadería. Acad. Nac. Cienc. de Córdoba. Págs. 235.
Nores, M. y D. Yzurieta.1981. Nuevas localidades para aves Argentinas. Historia Natural 2 (5): 33-42.
Nores, M. y D. Yzurieta.1983b. Nuevas localidades para aves Argentinas. Parte V. Historia Natural 3 (16): 159-160.
Nores, M. y M. M. Cerana. 1990. Biogeography of forest relics in the mountains of northwestern Argentina. Revista Chilena de Historia Natural 63: 37-48.
Nores, M., D. Yzurieta y R. Miatello. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. 56: 1-114.
Nores, M., D. Yzurieta y S. A. Salvador.1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. Bol. Acad. Nac. Cs.Córdoba, 59: 157-196.
Noriega, J. I., R. Aramburú, E.R. Justo y L. J. M. De Santis. 1993. Birds present in pellets of *Tyto alba* (Strigiformes, Tytonidae) from Casa de Piedra, Argentina. J. Raptor Res. 27: 37-38.
Núñez Chas, J. y M. Sorensen.1992. Cardenilla en la laguna de Los Padres, Buenos Aires. Nuestras Aves 27: 30.
Núñez Montellano, M. G., P. G. Blendinger, M. A. Vattuone, E. Barboza, G. Terán, J. Martiarena, G.Salas y D. Gómez. 2009c. Consumo de savia por aves del Chaco semiárido. XIII RAO: 80. Tafí del Valle, Tucumán.
Ojeda, V. y A. Trejo. 2002. Primeros registros de nidificación en cavidades para tres especies de aves del bosque ndino patagónico. Hornero 17 (2): 85-89.
Olivera, R. A., U. Lardelli y F. Bruno. 2009. Aves del Parque Provincial Aconcagua y Monumento Natural Puente del Inca. Mendoza, Argentina. Lista comentada. Publicaciones El Arunco Nº 2. Ed. de la Travesía. La Pampa, Argentina.
Olrog, C. C. 1948. Observaciones sobre la avifauna de Tierra del Fuego y Chile. Acta Zool. Lilloana 5: 437-531. Tucumán.
Olrog, C. C. 1950. Notas sobre mamíferos y aves del Archipiélago de Cabo de Hornos. Acta Zool. Lilloana 9: 505-532.
Olrog, C. C. 1958b. Notas ornitológicas sobre la colección del Instituto Miguel Lillo (Tucumán). III. Acta Zool. Lilloana, 15: 5-19.
Olrog, C. C. 1959c. Notas ornitológicas sobre la colección del Instituto Miguel Lillo (Tucumán). V. Acta Zool. Lilloana, 17: 421-428.
Olrog, C. C. 1971b. El anillado de aves en la Argentina, 1961-71. Séptimo informe. Neotrópica, 17: 97-100.
Olrog, C. C. 1974. Notas ornitológicas, X. Sobre la colección del Instituto Miguel Lillo. Tucumán. Acta Zool. Lill., 31: 69-75. Tucumán.
Olrog, C. C. y J. R. Navas. 1961. *Sicalis lutea* en la fauna argentina (Aves, Fringillidae). Neotrópica, 7 (23): 55-57.
Olson, S. L. y H. M. F. Alvarenga. 2006. An extraordinary feeding assemblage of birds at a termite swarm in the Serra da Mantiqueira, Sao Paulo, Brazil. Rev. Bras. Ornit. 14: 297-299.
Oniki, Y y E. O. Willis.1999. Single nestling care and male abandoning in variable ansthrikes *Thamnophilus caerulescens*, with notes on excess roadside clearing. Ornitología Neotropical 10: 91-94.
Oniki, Y. y E. O. Willis. 1982. Breeding records of birds from Manaus, Brazil I. Accipitridae to Caprimulgidae. Rev. Brasil. Biol. 42: 733-740.
Ordano, M. y A. Bosisio. 1997. Historial records of threatened and near threatened argentinian birds from Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino of Santa Fe, Argentina. Bull. Br. Ornithol., Club 117: 77-79.
Ordano, M., A. Bortoluzzi, M. Chatellenaz y L. Biancucci. 2008. Respuesta a corto plazo de las aves a la quema y al pastoreo en pastizales del Parque Nacional Mburucuyá, Argentina. INSUGEO, Miscelánea, 17 (2): 425-446.
Ordano, M., A. Bosisio, B. Boscarol, A. Beltzer y G. P. de Amsler. 1999. Stomach contents of thirty six bird species from northern Argentina. Revista Ceres, 46 (267): 555-563.

Orenstein, R. I. 2011. Family Cardinalidae (Cardinals) Pp. 330-427 in: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 16. Tanager to New World Blackbirds. Lynx Edicions, Barcelona.

Orians, G. H. 1980. Some adaptations of marsh-nesting blackbirds. Princeton Univ. Press. Princeton. New Jersey

Orians, G. H., C. E. Orians y K. J. Orinan. 1977. Helpers at the nest in some Argentine blackbirds. Pp. 137-151. Evolutionary ecology, Macmillan Press LDT. London, UK.

Ormerod, S. J. y S. J. Tyler. 2005. Family Cinclidae (Dippers). Pp. 332-355 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 10. Cuckoo-shrikes to Thrushes.. Lynx Edicions, Barcelona.

Ortiz, D. y C. Ruiz. 2011. Migración y estacionalidad de aves en el arroyo Mista, Tucumán, Argentina. Nuestras Aves 56: 16-18.

Ortiz, D. y P. Capllonch. 2008. Dos fruteros migrantes de Argentina. Ornitología Neotropical,19: 473-479.

Ortiz, D. y P. Capllonch. 2011. La migración del Chingolo (*Zonotrichia capensis*) en Argentina. Historia Natural. Tercera serie. Vol. 1: 105-109.

Ortiz, D. y R. Aráoz. 2014. Aves de la Sierra de San Javier. Universidad Nacional de Tucumán.

Ortiz, D. y R. Aráoz. 2014. Aves de la Sierra de San Javier. Universidad Nacional de Tucumán.

Ortiz, D., A. Novillo, I. Ferro, R. Ovejero y P. Capllonch. 2005. Contribución al conocimiento de la avifauna de las cumbres calchaquíes (Tucumán, Argentina). XI RAO: 136. Buenos Aires.

Ortiz, D., P. Capllonch, S. Aveldaño, J. Mamani, O. Quiroga y T. Moreno Ten. 2013c. Los Passeriformes de Tucumán, Argentina: Lista, distribución y migración. Biológica 16: 39-71.

Ortiz, D., P. Capllonch, S. Aveldaño, J. Mamani, O. Quiroga y T. Moreno Ten. 2013c. Los Passeriformes de Tucumán, Argentina: Lista, distribución y migración. Biológica 16: 39-71.

Ortiz, D., R. Aráoz y C. Aldetere. 2011b. Lista sistemática de las aves de la reserva experimental Horco molle, provincia de Tucumán, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 62: 1-5.

Ortiz, G. y F. Murúa. 1994. Aves de ambientes acuáticos de la provincia de San Juan (Argentina). I. Multiquina, 3: 125-131.

Ortiz, G. y F. Murúa. 1994. Aves de ambientes acuáticos de la provincia de San Juan (Argentina). I. Multiquina, 3: 125-131.

Pagano y A. Bodrati. 2011. El Tueré enmascarado (*Tityra semifasciata*) coloniza misiones, Argentina. Nuestras Aves 56: 33-34.

Pagano, L. G. y E. Mérida. 2009. Aves del Parque Costero del Sur. Pp. 200–244, en: Athor J. (ed) Parque Costero del Sur. Naturaleza, conservación y patrimonio cultural. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires, Argentina.

Pagano, L. G., E. A. Jordán, J. I. Areta, R.F. Jensen e I. Roesler. 2012. Aves de la Reserva Natural Punta Lara. En 97-143: Roesler, I. y M.G. Agostini (eds). Inventario de los Vertebrados de la Reserva Natural Punta Lara, provincia de Buenos Aires, Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas No 8. Buenos Aires, Argentina.

Partridge, W. H.1953c. Observaciones sobre aves de las provincias de Córdoba y San Luis. Hornero 10: 23-73.

Partridge, W. H.1961b. Aves de Misiones nuevas para Argentina. Neotrópica 7 (22): 25-28.

Partridge, W. H.1962. Dos aves nuevas para la fauna Argentina. Neotrópica 8 (25): 37-38.

Passler, R. 1922. In der Umgebung Coronel´s (Chile) beobachtete Vögel. J. f. Orn. 70: 430-482.

Pearman, M. y J. Navas.2002. Confirmación y primer ejemplar coleccionado de Pepitero picudo (*Saltator maxillosus*) en la Argentina. Nuestras Aves 43: 18-19.

Pereyra, C. B. de. 1927. Observaciones sobre algunas aves de Zelaya (Prov. de Buenos Aires). Hornero 4: 75-77.

Pereyra, C. B. de. 1935. Sobre la nidificación de algunas aves. Hornero 6: 102-104.

Pérez, C. H. F. y P. Petracci. 1998. Notas sobre la avifauna de la cuenca media y superior del Río Negro, Provincia de Río Negro, Argentina. X RAO: 38.

Pérez, C. H. F., K. Delhey y P. F. Petracci. 2006. Aves nuevas o poco frecuentes del norte de la patagonia argentina.Nuestras Aves 52: 25-28.

Pérez, J. H. 1988. Estornino pinto en la Capital Federal. Nuestras Aves 17: 13.

Pergolani de Costa, M. J. I. 1950. El pájaro denominado "Varillero" o "Congo", *Agelaius ruficapillus* Vieillot, como plaga de los arrozales en Santa Fe. Pub. Min. Agricul. y Ganad. Serie B, 16: 1-14.

Peri, P. L. 2013. Reserva Provincial Punta Gruesa. Una mirada al bosque nativo y los pastizales naturales. Río Gallegos. 67 Pp.

Peris, S. J. y Alabarce. 1991. La avifauna postreproductora de los pastizales de altura (Tafí del Valle, Sierra del Aconquija, Tucumán). Acta Zool. Lilloana 40: 125-133. Tucumán.

Peris, S., G. Soave, A. Camperi, C. Darrieu y R. Aramburú. 2005. Range expansion of the European Sterling *Sturnus vulgaris* in Argentina. Ardeola 52: 359-364.

Pessino, M. E. M., R. Banchs, M. Fernández y M. Dolsan. 2002. Registro de un híbrido entre Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) y Diuca común (*Diuca diuca*) en el norte de la provincia de La Pampa, Argentina. Nuestras Aves 44: 15-16.

Pessino, M. y R. F. Tittarelli. 2006. Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) diagnóstico de su situación con respecto al comercio ilegal en la provincia de La Pampa, Argentina. Gestión Ambiental 12: 69-76.

Petracci, P. F. y K. Delhey. 2004. Nesting attempts of the Cliff Swallow *Petrochelidon pyrrhonota* in Buenos Aires Province, Argentina. Ibis, 146: 522-525.

Petracci, P. F., K. J. V. Delhey, C. H. F. Pérez, D. Basanta, M. V. Massola, M. Zamorano y M. Fosatti. 2004a. Nuevos aportes al conocimiento de la distribución y anidación de algunas especies de aves en la Argentina. Nuestras Aves 48: 25-31.

Piacentini, H., D. Paz Barreto, y A. Wucusich. 2003. Registro de Fauna zona de Reserva Cinco Chañares págs. 369-386, en Bajo del Gualicho, una planicie patagónica bajo el nivel del mar-Realidad y leyenda. Coord. R. F. Massera y J. C. Guarido. Secretaría de Estado de Acción Social de Río Negro 2003, págs. 1-416.

Piloni, G. 2002 (2004). Revisión sistemática de las subespecies de *Zonotrichia capensis* (P. L. S. Müller) (Aves: Emberizidae) y su distribución geográfica en la República Argentina. Physis, Sec C, 60 (138-139): 1-23.

Piloni, G. 2015. Cambios en la distribución del Boyerito (*Icterus pyrrhopterus*) para la provincia de Buenos Aires. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 175: 1-5.

Piloni, G. y A. R. Camperi. 2011. Actualización de la distribución y algunas consideraciones sistemáticas sobre el Yal plomizo (*Phrygilus unicolor*) en la Argentina. Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat ,n. s. 13 (1): 111-116.

Pineschi, R. B. 1990. Aves como dispersoras de sete espécies de *Rapanea* (Myrsinaceae) no maciço do Itatiaia, estados do Rio de Janeiro e minas Gerais. Ararajuba 1: 73-78.

Plotnick, R. 1953. Algunas costumbres de la Cachirla de uña corta. Hornero 10: 18-22.

Pretelli, M. G. 2012. Albinismo en un ejemplar de Pecho amarillo común (*Pseudoleistes virescens*). Nuestras Aves 57: 49-51.

Prince, P. A. y J. P. Croxall. 1996. The birds of South Georgia. Bull. Brit. Orn. Club. 116 (2): 81-104.

Pugnali, G. y P. Chamorro. 2008. Lista de aves de la Reserva Costanera Sur.Aves Argentinas.Buenos Aires.

Pujalte, J. C., A. R. Reca, A. Balabusic, P. Canevari, L. Cusato y V. P. Fleming. 1995. Unidades ecológicas del Parque Nacional Río Pilcomayo. Anales de Parques nacionales 16: 1-185.

Quiroga, M. A y H. R. Hadad. 2004. Diversidad de aves y macrófitas en diferentes comunidades vegetales de un humedal. Revista FABICIB (8): 435-57.

Quiroga, M. A. y A. H. Beltzer. 2002. Ecología alimentaria del Tordo negro de laguna *Agelaius cyanopus cyanopus* (Aves: Icteridae) en el valle del río Paraná, Argentina. Revista FABICIB, Vol. 6: 105-112.

Quiroga, M. A., A. H. Beltzer, y J. C. Reboreda. 2005. El parasitismo de larvas de *Philornis sp.* (Muscidae) reduce el éxito reproductivo de la Ratona común (*Troglodytes aedon*) XI RAO: 143, Buenos Aires.

Quiroga, M. O. Del Barco y F. Agostelli.2003. First aproaches to the reproductive biology of *Sicalis flaveola* (Birds: Emberizidae) at the alluvial valley of Paraná River, Argentina. Revista FAVE. Cias. Veterinarias 2 (1): 35-40.

Quiroga, O. B. 2014. Primeros regostros documentados del Sietevestidos serrano (*Poospiza whitii*) en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. EcoRegistros Revista, 4 (9): 29-31.

Rabuffetti, F. L. y J. C. Reboreda. 2007. Early infestation by botflies (*Philornis seguyi*) decreases chick survival and nesting success in Chalk-browed Mockingbirds (*Mimus saturninus*). Auk 124: 898-906.

Raffo, F. C., M. R. de la Peña, R. Laenen Silva, G. Capuccio y L. M. Bonin. 2008. Aves del Río Uruguay. CARU.

Rainer Cinti, R. 1983. Parque Nacional Lihué Calel. Administración de Parques Nacionales y Revista Aire y Sol.

Ramírez-Llorens, P., E. E. White y M. Rotundo. 2003. Sobre algunas aves de la estancia Guaycolec, prov. de Formosa, Argentina. Nuestras Aves 46: 36-40.

Reales, F., L. Prevedel, G. Savor y S. Tessore. 2015. Primeros registros del Cerquero de collar (*Arremon flavirostris*) en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Revista Nº 5. Artículo Nº 6: 12-14.

Rebolo Ifran, N. y V. A. Fiorini. 2010. European Starling (*Sturnus vulgaris*): population density and interactions with native species in Buenos Aires urban parks. Ornitología Neotropical 21: 507-518.

Reboratti, J. H. 1918. Sobre distribución geográfica de algunas especies de aves. Hornero 1:193-194.

Reboreda, J. C., M. E. Mermoz, V. Massoni, A. A. Astié y F. Rabuffetti.2003. Impacto del parasitismo de cría del Tordo renegrido (*Molothrus bonariensis*) sobre el éxito reproductivo de sus hospedantes. Hornero 18 (2): 77-88.

Reinaudo, H.2003. Aves nuevas o raras para la reserva costanera sur, ciudad de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 45: 30.

Reinert, B. L. y M. R. Bornschein. 1998. Alimentacao da Gralha-azul (*Cyanocorax caeruleus*, Corvidae). Ornitología Neotropical 9: 213-217.

Rey, N. y G. Zurita.2004. Primer registro de la Ratona grande (*Campylorhynchus turdinus*) en la provincia de misiones, Argentina. Nuestras Aves 48: 21-22.

Reynolds, P. W.1934. Apuntes sobre aves de Tierra del Fuego. Hornero 5: 339-352.

Ribon, R. y J. E. Simon.1997. The nest and eggs of the Chestnut-Vented Conebill *Conirostrum speciosum* (Temminck, 1824). Ornitología Neotropical 8: 71-72.

Ridgely, S. R. and G. Tudor. 1994. The birds of South America. Vol. II. Univ. of Texas Press, Austin. Págs. 814.

Ríos, J. M. y A.M. Mangione. 2010. Respuesta disuasiva del granívoro Zonotrichia capensis (Passeriformes: Emberizidae) frente a fenoles comunes en las semillas. Ecología Austral, 20: 215-221.

Rivero, E. M., B. Lartigau, P. H. Caridad y P. Ramírez Llorens.1996. Registro concreto de nidificación del estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en la Argentina. Nuestras aves 34: 46.

Roda, M. A. y B. López Lanús. 2007. The range of Rufous-rumped Seedeater *Sporophilahypochroma* extends to the Pampas region of Argentina, with the first nest of the especie. Cotinga 30: 61-62.

Roda, M. A. y C. F. Danti. 2015. Nuevos registros de aves para Saladillo, provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 60:32-38.

Rodrigues Fernandes, F., Dominici Cruz, L. y A. A. Ferreira Rodrigues. 2007. Diet of the Grey-breasted Martin (Hirundinidae: *Progne chalybea*) in a wintering area in Maranhao, Brazil. Rev. Bras. Ornit. 15: 445-447.

Rodríguez Graves, V., A. Pautasso, P. Preliasco, M. V. Del Sastre y F. Miñarro. 2009. Relevamiento ambiental de la Estancia Isleta Linda. Provincia de Santa Fe. Fundación Vida Silvestre Argentina.

Roesler, I. 2003b. Observaciones de aves poco comunes en el noroeste de Buenos Aires y noreste de La Pampa, Argentina. Nuestras Aves 45: 22-24.

Roesler, I., H. Poverano, A. S. Di Giacomo y O. Spitznagel. 2006. La Monterita canela (*Poospiza ornata*) en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 51: 34-35.

Roesler, I., S. Imberti, H. E. Casañas, P. M. Hernández, J. M. Klavins y L. G. Pagano. 2014. Noteworthy records and natural history comments on rare and threatened birds species from Santa Cruz province, Patagonia, Argentina. Revista Brasileira de Ornitologia, 22 (2): 189-200.

Roitman, G. G., N. H. Montaldo y D. Medan. 1997. Pollination Biology of *Myrrhinium atropurpureum* (Myrtaceae): Sweet, Fleshy Petals Attract Frugivorous Birds. Biotrópica 29 (2): 162-168.

Rolón, L. H. y J. C. Chebez. 1998. Reservas Naturales Misioneras. 160 pp. Edit. Univ. UNAM, Posadas.

Ronchi Virgolini, A., L. J. Alonso y A. Manzano. 2008. Estado actual de la comunidad de aves del Parque Nacional Pre-Delta (Diamante-Entre Ríos). XII RAO: 97.

Rossetti, M. A. y A. R. Giraudo. 2003. Comunidades de aves de bosques fluviales habitados y no habitados por el hombre en el río Paraná Medio, Argentina. Hornero 18: 89-96.

Rossetti, M. A., V. Alessio, A. H. Beltzer y H. F. Díaz. 2003. Dieta del Boyero negro *Cacicas solitarius* (Aves: Icteridae) en el valle de inundación del río Paraná, Argentina. Revista FAVE. Ciencias Veterinarias 2 (2): 123-131.

Rouges, M. y D. Seaman. 2001. Primer registro de diadema (*Catamblyrhynchus diadema*) para el Parque Nacional El Rey, Salta, Argentina. Nuestras aves 42: 28-29.

Rougés, M. y J. G. Blake.2001. Tasas de captura y dietas de aves del sotobosque en el Parque biológico Sierra de San Javier, Tucumán. Hornero 16 (1): 7-15.

Rozzi, R., Armesto, J. J., Correa, A., Torres Mura, J. C. y M. Sallaberry. 1996. Avifauna de bosques templados en islas deshabitadas del archipiélago de Chiloé, Chile. Rev. Chilena Hist. Nat. 69: 125-139.

Ruggera, R. A., M. D. Gómez y P. G. Blendinger. 2014. Frugivory and seed dispersal role of the Yellow-striped Brush-Fing (*Atlapetes citrinellus*) an endemic emberizid of Argentina. Umu. Htip://DX.DOI.Org/10.1071.MU14033.

Rumboll, M., P. Capllonch, R. Pereyra Lobo y G. Punta. 2005. Sobre el anillado de aves en la Argentina: recuperaciones y recapturas. Nuestras Aves, 50: 21-24.Rebollo, M. E., L. A. Bragagnolo, M. A. Santillán, P. Orozco, F. G. López, M. M. reyes, J. M. Grande, P. Martínez y A. Cicchino. 2013. Aspectos de la biología del Coludito Copetón (Leptasthenura platensis) en el Bosque de Caldén, La Pampa, Argentina. XV Reunión Argentina de Ornitología. Libro de resúmenes, 437.

Sackmann, P. y J. C. Reboreda. 1996. Defensas antiparasitarias en dos hospedantes del Tordo renegrido, *Molothrus bonariensis* . IX RAO: 47. Buenos Aires.

Sagario, M. C. y V. R. Cueto. 2014. Evaluación del comportamiento territorial de cuatro especies de aves granívoras en el monte central. Hornero 29 (2): 81–92.

Saibene, C. A., M. A. Castelino, N. R. Rey, J. Herrera y J. Calo. 1996. Inventario de las aves del Parque Nacional "Iguazú", Misiones, Argentina. Monografía 9. L.O. L. A. Págs. 70.

Saibene, C.1986. Avistaje del Fruterito cabeza negra en el Parque Nacional Iguazú. Nuestras Aves 10: 15.

Saidón, M., I. Barrios y C. Gómez.1988. Estornino crestado asilvestrado en Plaza Paso, La Plata. Garganchillo 5: 11-12.

Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2011. Nuevas víctimas del Tordo renegrido (*Molothrus bonariensis),* hallados enArgentina. Nuestras aves 56: 38-39.

Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2013c. Vertebrados y huevos en la alimentación de algunos Passeriformes de Agentina. Biológica 16: 135-140.

Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2014b. Observaciones sobre una colonia de cría del Boyero cacique (*Cacicus haemorrhous*) en Misiones, Argentina. Nuestras Aves 59: 47-49.

Salvador, S. A. y A. G. Di Giacomo. 2014. Datos de pesos de aves argentinas. Parte 3. Historia Natural. Tercera serie. Vol. 4 (2): 63-88.

Salvador, S. A. y L. A. Salvador. 2012. Reproducción de aves en Pampa de Achala, Córdoba, Argentina. Historia Natural. Tercera serie. Vol. 2 (2): 119-145.

Salvador, S. A. y L. A. Salvador.1984. Notas sobre hospedantes del Renegrido (*Molothrus bonariensis*) (Aves: Icteridae). Historia Natural 4: 121-130.

Salvador, S. A. y L. A. Salvador.1986. Nota sobre la reproducción del Misto (*Sicalis luteola*) en Córdoba, Argentina. Hornero 12: 274-280.

Salvador, S. A. y L. A. Salvador.1988. Nidificación de aves en Pampa de Achala, Córdoba. Nuestras aves 16: 20-23.

Salvador, S. A. y S. Narosky.1983. Nuevos nidos de aves argentinas. Hornero 12: 134-137.

Salvador, S. y S. Narosky. 1984. Notas sobre nidificación de aves andinas en la Argentina. Hornero 12: 184-188.

Salvadori, T. 1900. Contribuzione all´avifauna dell´Amedica Australe (Patagonia, Terra del Fuoco, Isola Degli Stati, Isole Falkland). Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova. Ser 2 (20): 609-634.

San Juan, G. y E. Zanin. 2011. Registros de Tesorito (*Phibalura flavirostris*) en Misiones. Ecoregistros. Revista Nº 1. Artículo Nº 11: 1-3.

Sánchez, A. D. y M. J. Solis Fieg. 2012. Primer registro documentado de parasitismo de Tordo renegrido (*Molothrus bonariensis*) sobre Golondrina tijerita (*Hirundo rustica*). Nuestras Aves 57: 62-63.

Sánchez, R., N. C. Cozzani y S.M. Zalba.2005. Selección y sitios de nidificación y éxito reproductivo de la loica pampeana (*Sturnella defilippii*) XI RAO: 150. Buenos Aires.

Sánchez, R., P. G. Blendinger y B. Loiselle. 2009. Selección de sitios de nidificación de *Poospiaza torquata* en el Chaco semiárido argentino. XIII RAO: 83. Tafí del Valle, Tucumán.

Sanzín, R.1918. Lista de aves mendocinas. Hornero 1: 147-152.

Sardina Aragón, P. N., N. Politi, L. O. Rivera y R. M. Bárquez. 2011b. Variables ambientales asociadas al habitat del Mirlo de agua (*Cinclus schulzi*) en dos ríos de montaña de Jujuy, Argentina. IX Congreso de Ornitología Neotropical, VIII Congreso Peruano de Ornitología. Libro de Resúmenes: 529.

Savigny, C. 2004. Albinismo parcial en un ejemplar de Comesebo andino (*Phrygilus gayi*). Nuestras Aves 48: 18.

Savigny, C. 2013. Registros de aves de interés para el Parque Nacional Iguazú y el norte de la provincia de Misiones, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 124: 1-4.

Savigny, C.2003. Registros de passeriformes nuevos o poco comunes para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 45: 31.

Schlatter, R. P. y P. Vergara. 2005. Magellanic Woodpecker (*Campephilus magellanicus*) sap feeding and its role in the Tierra del Fuego forest bird assemblage. Jour. Ornith. 146: 188-190.

Schmidtutz, C. y C. Agulián.1988. Nidificación del Estornino pinto. Nuestras aves 17: 14.

Seco Pon, J. P. y M. Favero. 2013. Registro de aves continentales a bordo de buques pesqueros en aguas argentinas. Nuestras aves 58: 41-43.

Seewald, P. A. y C. H. F. Pérez. 2009. Aves nuevas o poco frecuentes del Alto Valle de Río Negro, Río Negro, Argentina. Nuestras Aves 54: 25-27.

Segura, L. N. y J. C. Reboreda. 2011. Botfly parasitism effects on nestling growth and mortality of Red-crested Cardinals. Wilson Journal of Ornithology 123: 107-115.

Segura, L. N. y M. F. Arturo. 2009. Selección de sitios de nidificación del Cardenal común (*Paroaria coronata*) en bosques naturales de Argentina. Ornitología Neotropical 20: 203-213.

Segura, L. N., N. Bogado, C. A. Darrieu y D. Montalti. 2014b. La colección de huevos “Ronald Runnacles” del Museo de La Plata: historia y material depositado. Probiotica. FCN y M, UNLP, La Plata, Argentina, Serie Técnica y Didáctica 27: 1-9.

Seijas, S., A. Trejo y M. Gelain. 2004. Primer ejemplar colectado de la Golondrina tijerita (*Hirundo rustica*) en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Nuestras Aves 48: 33-35.

Serié, P. y C. H. Smyth.1923. Notas sobre aves de Santa Elena (E. Ríos). Hornero 3: 37-55.

Serracín, R. y F. Romero.1998. Nuevos registros de aves para la provincia de La Pampa, Argentina. Nuestras Aves 38: 9-10.

Sferco, G. D. y M. Nores. 2003. Lista comentada de las aves de la reserva natural Chancaní, Córdoba, Argentina. Hornero 18: 21-29.

Short, L. L. (Jr.).1967. Some unusual birds of southern Buenos Aires province.Hornero 10:459-460.

Short, L. L. (Jr.).1971. Aves nuevas o poco comunes de Corrientes. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Zool. IX (11): 283-309.

Short, L. L. 1968. Sympatry of Red-breasted Meadowlarks in Argentina, and the taxonomy of Meadowlarks (Aves: *Leistes*, *Pezites*, and *Sturnella*). Amer. Mus. Novitates 2349: 1-30.

Siegenthaler, G. B. (Coord.) 2004. Relevamiento de los vertebrados de la provincia de La Pampa. Inventario integrado de los recursos naturales de la provincia de La Pampa. Clima, geomorfología, suelo, vegetación y fauna de vertebrados. Reedición. INTA.UNLP. Gobierno de La Pampa, CD, multimedia.

Siegenthaler, G., E. Fiorucci, S. Tiranti, P. Borraz, M. Urioste y A. García. 1990. Informe de avance del plan de relevamiento de los vertebrados de la provicia de La Pampa. Agro Pampeanno. Ministerio de Asuntos Agrarios de La Pampa. 18: 38-49.

Siegentlhaler, G. 1984. La avifauna de la Laguna Don Tomás y espejos de agua contiguos. Santa Rosa, La Pampa. Resumen V reunión Argentina de ornitología. Buenos Aires.

Smyth, C. H.1928. Descripción de una colección de huevos de aves argentinas.Hornero 4: 125-152.

Snow, D. W. 1976. The web of adaptation. Collins, Londres.

Snow, D. W. 1982. The Cotingas. Cornell Univ. Press.

Soave, G. E., G. Marateo, P. Rey, D. Glaz y C. A. Darrieu. 1999b. Evolución estacional de los ensambles de aves en un talar del nordeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. CIC. Informe Nº 55. Mist. de la Prod. y el empleo. Prov. de B. Aires.

Soria, K. 2015. Descripción del nido y los pichones de la Monterita serrana (*Compsospiza baeri*). Hornero 30 (1): 29-32.

Soria, K., D. Ortiz, R. Aráoz, E. M. Wagner, C. Alderete y P. Capllonch. 2010. Sobre el anillado de aves en la Argentina: recapturas de aves en localidades de monitoreo en el noroeste de Argentina. Nótulas Faunísticas Nº 53: 1-6.

Soria, K., S. Abeldaño y P. Capllonch. 2008. Interpretación de las mudas del plumaje de tres zorzales comunes de la provincia de Tucumán. Xolmis Nº 3: 19-27.

Soriano Grandes, E., C. Bisiau y A. Parsons. 2014. La Calandria mora (*Mimus patagonicus*)en la provincia de Corrientes, Argentina. Ecoregistros 4 (7): 19-20.

Spinuzza, J. M. y F. Villegas. 2013. Primer registro del Boyero negro (*Cacicus solitarius*) para la Reserva de uso múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita y para la provincia de Córdoba, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 119: 1-5.

Stone, W. 1928. Reports of the Princeton University Expedition to Patagonia, 1896-1899. Vol. II, Ornithology, Part. V, pp. 719-857.

Storer, R. W. 1989. Notes on Paraguayan Birds. Occasional Papers of Museum of Zoology of University of Michigan 719: 1-21.

Straneck, R. 1987. Aportes sobre el comportamiento y distribución de la Cachirla amarillenta, *Anthus lutescens* Pucherán y la Cachirla chaqueña, *Anthus chacoensis* Zimmer (Aves, Motacillidae). Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. Zool. XIV (6): 95-102.

Straneck, R. 1990b. Canto de las aves pampeanas I. L.O.L.A. Buenos Aires.

Straneck, R. 1990c. Canto de las aves pampeanas II. L.O.L.A. Buenos Aires.

Straneck, R. 1990g. Canto de las aves de Misiones I. L.O.L.A. Buenos Aires.

Tejerina, P., M. J. Turnes y S. L. Tiranti. 2006. Aves. En: Salomone, F. y N. Gouts. (eds.). Los vertebrados de las áreas protegidas de la provincia de La Pampa. Ed. Santa Rosa, La Pampa, Argentina.

Travaini, A., J. Bustamante, J. J. Negro y R. D. Quintana. 2004. ¿Puntos fijos o recorridos lineales para el censo de aves en la estepa patagónica?. Ornitología Neotropical15: 513-525.

Tuero, D. T., V. D. Fiorini y J. C. Reboreda. 2007. Effects of Shiny Cowbird *Molothrus bonariensis* parasitins on different components of Housse Wren *Troglodytes aedon* reproductive success. Ibis 149: 521-529.

Tuero, D. T., V. D. Fiorini y J. C. Reboreda.2005. Causas de la reducción del áxito de eclosión de los huevos de la Ratona común (*Troglodytes aedon*) en nido parasitados por el Tordo renegrido (*Molothrus bonariensis*) XI Reunión argentina de ornitología. Buenos Aires: 170.

Tuero, D. T., V. D. Fiorini, B. Mahler y J. C. Reboreda. 2012. Shiny cowbird *Molothrus bonariensis* egg size and chick growth vary between two hosts that differ markedly in body size. Journal of Avian Biology 43: 001–007.

Turienzo, P. y O. Di Iorio. 2010. Insects found in birds´ nests from Argentina. *Furnarius rufus* (Gmelin, 1788) (Aves: Furnariidae) and their inquiline birds, the true hosts os *Acanthocrios furnarii* (Cordero & Vogelseng, 1928) (Hemiptera: Heteroptera: Cimidae). Zootaxa 2700: 1-112.

Turner, A. K. 2004. Family Hirundinidae (Swallows and Martins). Pp. 602-685 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 9. Cotingas to Pipits and Wagtails. Lynx Edicions, Barcelona.

Tyler, S. J. y L. Tyler. 1996. The Rufous-throeted Dipper *Cinclus schulzi* on rivers in north-west Argentina and southern Bolivia. Bird Conservation International 6: 103-116.

Urcola, M. R. 2011. Aberraciones cromáticas en aves de la colección ornitológica del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat., n. s. 13(2): 221-228.

Vasconcelos, M. F. de, M. de Souza Werneck e M. R. de la Peña. .2006. Observacoes sobre a construcao de um ninho de Cavalaria (*Paroaria capitata*) com material industrializado. Revista Brasileira de Ornitología 14 (2): 167-168.

Veiga, J. O. y G. Dupuy. 2009. Nuevas especies y registros de aves para la provincia de Neuquén, Argentina. Nuestras Aves 54: 79-81.

Veiga, J. O. y J. L. Perez. 2014. Hallazgo de una nueva población de Tenca (*Mimus thenca*) en la provincia de Neuquén, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 158: 1-5.

Veiga, J. O., F. Filiberto, M. Babarskas y C. Savigny. 2005. Aves de la provincia de Neuquén. Patagonia Argentina. Lista comentada y distribución. 184 págs. Edit. R y C.

Vides Almonacid, R. 1986. Notas sobre la repartición del nicho trófico-espacial de las aves en una localidad altoandina de Catamarca, Argentina. Historia Natural 4: 33-40.

Vides Almonacid, R. 1999. Aves. En: Lavilla, E. O. & J. A. González (eds.). Biodiversidad de Agua Rica (Catamarca, Argentina). BHP Cooper, Fundación Miguel Lillo.

Vides Almonacid, R. 2001. Nuevo dato del Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) para Tucumán, Argentina. Nuestras Aves 42: 23-24.

Vides Almonacid, R. y C. Cocimano. 1998. Aportes al estudio poblacional y uso de hábitat de *Poospiza baeri,* especie endémica del noroeste argentino. X RAO: 52. Mar del Plata.

Villegas, M. y P. G. Blendinger. 2009. El vecindario fructificante no afecta la remoción de frutos de *Eugenia uniflora* (Myrtaceae) por aves frugívoras. Resúmenes. XIII Reunión Argentina de Ornitología.

Vizentín-Bugoni, J., J. I. Areta, A. G. Di Giacomo, A. S. Di Giacomo, F. Jacobs, M. A. Afonso Coimbra and R. A. Dias. 2013. Breeding biology and conservation of the Marsh Seedeater *Sporophila palustris.* Bird Conservation International 23:147 – 158.

Volkmann, L y R. Cargnelutti. 2001. Nuevas localidades para aves de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 41: 23-26.

von Ihering, H. 1900. Catalogo critico-comparativo dos nihos e ovos das aves do Brasil. Rev. Mus. Paul. 4: 191-300.

Voss, W. A. and M. Sander.1981. Frutos e sementes vários na alimentaçao das aves livres. Porto Alegre. Trigo e Soja, Nº 58: 28-31.

Voss, W. A. y M. Sander.1980. Frutos de ârvores nativas na alimentaçao das aves. Porto Alegre. Trigo e Soja, Nº

51: 26-30.
Wace, R. H. 1921. Lista de aves de las islas Falkland. Hornero 2: 194-204.
White, E. W. 1882. Notes on birds collected in the Argentine Republic. Proc. Zool. Soc. London, 591-629.
Willis, E. O. y Y. Oniki. 2002. Birds of Santa Teresa, Espírito Santo, Brazil: Do humans add or substract species ? Papeis Avulsos de Zoologia 42: 193-264.
Wilson, D. B. 1977. Comportamiento de algunas aves de Mercedes (Provincia de Corrientes) Hornero 11: 430-432.
Wilson, D. B.1979.Nota sobre casos de parasitismo del Renegrido (*Molothrus bonariensis*) sobre varios passeriformes observados en la provincia de Corrientes. Hornero 12: 69-71.
Woods, R. W. 1988. Guide to birds of the Falkland Island. Anthony Nelson, Oswestry, Inglaterra.
Woods, R. W. 2006. Checklist of Falkland Islands Birds.
Wrede, M. A. y D. Albarracín.1991. Presencia de la Golondrina parda chica (*Riparia riparia*) y el Dragón (*Pseudoleistes virescens*) en La Pampa. Nuestras Aves 25: 27.
Zapata, A. R. P. 1969. Aves observadas en el Golfo San Jorge, Provincias de Chubut y Santa Cruz, Argentina. Zoología Platense, 1: 21-27.
Zapata, A. R. P. y A. M. A. de Cabrera. 1969. Sobre una colección de huevos de aves silvestres. Comunicaciones Vol. 1 Nº 5: 73-97. La Plata.
Zapata, A. R. P. y H. S. Martínez. 1972b. Algunas aves no citadas y otras pocos frecuentes para el sur de la provincia de Buenos Aires. Acta Zool. Lilloana 29: 181-199.
Zapata, A. R. P.1975. Aves observadas en la proximidad de la confluencia de los ríos Uruguay y Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Hornero 11: 291-304.
Zapata, A. R. P.1998. Aves registradas en la región de la laguna Chasicó, sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Natura Neotropicalis 29 (2): 156-161
Zarco, A., M. C. Sagario y V. Cueto. 2013. Dinámica del uso del espacio por los juveniles de Saltatricula multicolor en el desierto del monte central. XV Reunión Argentina de Ornitología. Libro de resúmenes, 37
Zelaya, D., D. Forcelli, S. Goldfeder, D. Ramadori, M. S. Croome y P. Bellagamba.2001. El Estornio crestado (*Acridotheres cristatellus*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 42: 26-27.
Zelaya, P. V., S. A. Salvador, H. Giraudo y J. Klavins. 2013. Primeros registros de Tersina (*Tersina viridis*) para la ecoregión chaqueña de Argentina. Nuestras aves 58: 52-54.
Zotta, A. R. 1932. Notas sobre el contenido estomacal de algunas aves. Hornero 5: 77-81.
Zotta, A. R. 1936g. Sobre el contenido estomacal de algunas aves. Hornero 6: 261-270.
Zotta, A. R. 1939c.Lista sistemática de las aves argentinas. Hornero 7: 299-326.
Zotta, A. R. 1940c. Lista sobre el contenido estomacal de las aves argentinas. Hornero 7: 402-411.
Zotta, A. R. 1944. Lista sistemática de las aves Argentinas. Mus. Argen. Cienc. Nat. Buenos Aires.
Zuberbühler, E. 1953b. Dos nidos de ratona. Hornero 10: 93-94.
Show, D. W. 2004. Family Cotingidae (Cotingas). Pp. 32-108 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 9. Cotingas to Pipits and Wagtails. Lynx Edicions, Barcelona.
Snow, D. W. 2004a. Family Pipridae (Manakins). Pp. 110-169 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds.. Handbook of the Birds of the World. Vol. 9. Cotingas to Pipit and Wagtails. Lynx Edicions, Barcelona.
dos Anjos, L. 2009. Family Corvidae (Crow). Pp. 494-640 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 14. Bush-Shrikes to World Sparrow. Lynx Edicions, Barcelona.
Gibson, E. 1880a. Ornithological notes from the neighbouhood of Cape San Antonio, province of Buenos Ayres. Ibis (4th ser.) 4: 1-38.
Barrows, W. 1883a. Birds of the lower Uruguay. Bull. Nuttall Orn. Club, 8: 83-212.
Withington, F. 1888. On the Birds of Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentine, Ibis 1888: 461-473.
Oustalet, E. 1891. Oiseaux. Mission Scientifique du Cap Horn, 1882-1883. Zoologie 6 (B): 1-341. París.
Frenzel, J. 1891. Uebersicht uber die in der Provinz Córdoba (Argentinien) vorkommenden Vogel. J. F. Orn., 19: 113-127.
Holland, A. H. 1893a. Letter en Migration in Argentine Republic. Ibis 1893: 467-468.
Goeldi, E. 1894. On the nesting of *Phibalura flavirostris* and *Lochmias nematura*. Ibis (6th ser.) 6: 485-494.
Koslowsky, J. 1895b. Enumeración sistemática de las aves de Chilecito, La Rioja. Rev. Mus. La Plata 6: 277-287. La Plata.
Scott, W. E. D. 1900b. New or undetected species of birds from South America. Bulletin of British Ornithological Club, (10): 62-64.
Lönnberg, E. 1903. On a collection of birds from northwestern Argentina and the Bolivian Chaco. Ibis 1903: 441-471.
Lillo, M. 1905. Fauna Tucumana. Aves. Rev. Letras y Cs. Soc. Tucumán. 41 pp.
Giacomelli, E. 1907. Catálogo sistemático de la avifauna riojana. Anales de la Sociedad Científica Argentina, 63: 66-84.
Lillo, M. 1909. Notas ornitológicas. Apuntes de Historia Natural, 1: 21-26.
Dabbene, R.1910a. Ornitologia Argentina, Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. As. T. XVIII.: 1-513.
Reed, C. S. 1913. Datos para la biología del *Molothrus bonariensis*. Revista Chilena de Historia Natural, 13: 172-179.

Gibson, E. 1918. Further ornithological notes from the neighbourhood of Cape San Antonio, Province of Buenos Aires. Part. I. Passeres. Ibis 6: 363-415.
Dabbene, R.1918f. Sobre los nidos de Pajera de pico curvo *Limnornis curvirostris* Gould y del Pecho colorado *Leistes militaris superciliaris* (Bp.). Hornero 1: 104-105.
Chubb, C. 1918a. Notes on *Embernagra platensis* and its allies with a description of a new species. Ibis 6: 1-10.
Marelli, C. A.1918.Aves de Curuzú Cuatiá. (Corrientes). Hornero 1: 74-80.
Marelli, C. A. 1919.Sobre el contenido del estómago de algunas aves. Hornero 1: 221-228.
Ménégaux, A. 1919. Etude d´une collection d´oiseaux faite par M. E. Wagner dans le province des "Misiones" (République Argentine) Rev. Franc. Orn. 10: 332-335.
Reed, C. S.1919. Breves notas acerca de nidos y huevos de algunas aves de la cordillera de Mendoza. Hornero 1 (84): 267-273.
Renard, A.1920. Notas sobre aves de Cañuelas (Prov. de Buenos Aires). Hornero 2: 58-60.
Giacomelli, E. 1923. Catálogo sistemático de las aves útiles y nocivas de la provincia de La Rioja. Hornero 3: 66-84.
Goodall, J. M. 1923. Remarks on the eggs of some Argentine Cuckoos and Argentine and Canadian Cowbirds. Bulletion of the Bristish Ornithologist Club, 43: 63-68.
Pereyra, J. A. 1923a. Lista de aves colectadas en otras regiones de la República Argentina. Hornero 3: 174.
Pereyra, J. A. 1923b. Las aves de la región ribereña de la provincia de Buenos Aires. Hornero 3: 159-174.
Pereyra, J. A. 1923b. Las aves de la región ribereña de la provincia de Buenos Aires. Hornero 3: 159-174.
Pereyra, J. A.1923b. Las aves de la región ribereña de la provincia de Buenos Aires. Hornero 3: 159-174.
Pozzi, A. 1923. La Perdiz de Santa Cruz (Patagonia) *Tinamotis ingoufi* Hornero 3: 180-184.
Daguerre, J. B.1924d. Observaciones sobre la nidificación de los Tordos *Molothrus brevirostris* y *M*. *badius*. Hornero 3: 285.
Wetmore, A.1926a. Report on a collection of birds made by J. R. Pemberton in Patagonia. University of California Publications in Zoology 24 (4): 395-474.
Wetmore, A.1926b. Observations on the birds of Argentina, Paraguay, Uruguay and Chile. United States Nat. Mus. Bull. 133: 1-448.
Wilson, A. S.1926. Lista de aves del sur de Santa Fe. Hornero 3: 349-362.
Pereyra, J. A. 1927a. Notas ornitológicas. El nido de la Golondrina (*Pygochelidon c. patagonica*). Hornero 4: 80.
Pereyra, J. A. 1927c. Notas sobre los nidos de *Synallaxis spixi* y *Pachyrhamphus polychopterus*. Hornero 4: 79.
Pereyra, J. A. 1927d. Segunda lista de aves colectadas en la región ribereña de Buenos Aires. Hornero 4: 23-34.
Pereyra, J. A. 1927d. Segunda lista de aves colectadas en la región ribereña de Buenos Aires. Hornero 4: 23-34.
Pereyra, J. A. 1927e. Lista de aves colectadas en otras regiones (continuación). Hornero 4: 28-34.
Aravena, R. O.1928. Notas sobre la alimentación de las aves. Hornero 4: 153-166.
Hellmayr, C. E. 1929. A contribution to the ornithology of Natural History, Zoological Series, 12: 1-501.
Laubmann, A. 1930. Vögel en Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Gran Chaco-Expedition. Verlag von Strecker und Schröder, Stuttgart.
Budin, E.1931. Lista y notas sobre aves del N.O. Argentino (Prov. de Jujuy) Hornero 4: 401-411.
Carcelles, A.1931. Notas sobre algunas aves de la isla de Sud Georgia. Hornero 4: 398-401.
Hellmayr, C. E. 1932. The birds of Chile. Field Museum of Natural History, Zoological Series, 19: 1-472.
Pereyra, J. A.1932c. Notas ornitológicas del mes de diciembre de 1931. Hornero 5: 65-69.
Castellanos, A.1933. Aves del valle de los Reartes (Córdoba). Hornero 5: 159-174.
Pereyra, J. A. 1933b. Miscelánea ornitológica. Hornero 5: 215-219.
Pereyra, J. A.1933a. Nuestros Tordos de bañado del género *Agelaius*. Hornero 5: 189-192.
Renard, A.1933. Observaciones sobre el parasitismo del Tordo. Hornero 5: 219-220.
Hellmayr, C. E. 1934. Cataloge of birds the Americas and the adjacent islands. Field Mus. Nat. Hist. Zool. 13, Parte VII, I-VI, 1-531.
Castellanos, A.1934. Aves del valle de los Reartes (Córdoba). Hornero 5: 307- 338.
Fiora A. 1934. El peso de aves. Hornero 5: 353-365.
Pereyra, C. B. de. 1934a. Nido de Benteveo sobre un poste. Hornero 5: 411-412.
Pereyra, C. B. de. 1934a. Parásitos en las aves. Hornero 5: 412.
Pereyra, J. A.1934b. El nido del Federal *Amblyrhamphus holosericeus*. Hornero 5: 384-386.
Hellmayr, Ch. E. 1935. Catalogue of birds of the Americas. Vol. XIII, Part. VIII.
Radboone, S.1935. Notas sobre algunas aves del lago San Martín (Santa Cruz) Hornero 6: 99-101.
Zotta, A. R.1937e. Notas ornitológicas. Un "Chingolo más debe incluirse en la avifauna argentina. Hornero 6: 480-481.
Dinelli, L. M. 1937. La protección de las aves. Hornero 6: 483-488.
Castellanos, A.1937. Observaciones de algunas aves de Tierra del Fuego e isla de los Estados. Hornero 6: 382-394.
Pereyra, J. A. 1937b. Contribución al estudio y observaciones ornitológicas de la zona norte de la Gobernación de La Pampa. Mem. Jard. Zool. La Plata. Tomo 7: 197-326.
Pereyra, J. A. 1937c. Miscelánea ornitológica. Algunos casos interesantes de albinismo. Hornero 6: 437-449.
Pereyra, J. A.1938a. Algunos nidos poco conocidos de nuestra avifauna. Hornero 7: 24-30.

Pereyra, J. A.1938b. Aves de la zona ribereña nordeste de la provincia de Buenos Aires. Memorias del Jardín Zoológico. La Plata. Tomo 9, parte 2: 1-304.
Pereyra, J. A. 1940b. Una nueva subespecie de Cachirla para nuestra avifauna. Hornero 7: 396-397.
Pereyra, J. A. 1942a. Avifauna argentina. Mem. del Jardín Zool. La Plata. Tomo 10: 171-274.
Freiberg, M. A. 1943. Enumeración sistemática de las aves de Entre Ríos y lista de los ejemplares que las representan en el Museo de Entre Ríos. Memorias del Museo de Entre Ríos. Zoología, 21: 1-110.
Casares, J.1944b. Aves de Estanzuela. San Luis. Hornero 8: 379-463.
Olrog, C. C.1956a. Contenidos estomacales de aves del noroeste argentino. Hornero 10: 158-163.
Pereyra, J. A.1956. Notas biológicas sobre el Corbatita común. Hornero 10: 140-142.
Bó, N. A. 1958. Nota sobre una colección de aves del este de Chubut. Rev. Mus. La Plata. Zool. VII: 35-50.
Partridge, W. H.1961a. Aves de Misiones. Neotrópica 7 (23): 58.
Snow, D. W. 1962.A field stydy of the Black-and-White Manakin, *Manacus manacus*, in Trinidad. Zoológica 47: 65-104.
Navas, J. R.1965a. El área geográfica de *Phytotoma rara* (Aves, Phytotomidae) Neotrópica 11 (34): 38-40.
Hayward, K. J. 1967. Fauna del noreste argentino. 1. Las aves de Guayapa (La Rioja). Acta Zool. Lilloana XXII : 211-220.
Haverschmidt, F. 1968. Birds of Surinam. Oliver & Boyd, Edinburgh.
Daciuk, J. 1968. La Fauna del Parque Nacional Laguna Blanca. Anales de Parques Nacionales. XI. 2º Entrega: 225-304.
Skutch, A. F. 1969b. Life histories of central American birds. Vol.3. Pacific Coast Avif. Nº 35, Berkeley, California, EE.UU.
Olrog, C. C. 1971a. *Turdus albicollis comtemptus*, subespecie nueva para la Argentina (Aves, Turdidae). Neotrópica 17: 157.
Fraga, R. M. 1972. Cooperative breeding and a cae of successive polyandry in the Bay-winged Cowbirds. Auk 8: 447-449.
Bó, N. A.1972. *Zonotrichia capensis hypoleuca* (Todd). Sistemática y distribución en la Argentina. (Aves, Fringillidae). Neotrópica 18: 95-102.
Klimaitis, J. F. 1973. Estudio descriptivo de una colonia de Tordos varilleros (*Agelaius ruficapillus*) Hornero 11: 193-202.
Earnshaw, E. M.1973. Entre las aves de Tierra del Fuego. Hornero 11: 203-208.
ffrench, R. 1973. A guide to the birds of Trinidad and Tobago. Harrowood, Pennsylvania.
Höy, G. 1973a. Contribución a la avifauna argentina. Physis Secc. C. 32 (84): 222-223.
Boswall, J. 1973. Supplementary notes on the birds of Point Tombo, Argentina. Bull. B.O.C: 93: 33-36.
Ripley, S. D. 1950. A smoll collection of birds from Argentine. Tierra del Fuego. Postilla 3: 1-11.
Pereyra, J. A. 1951. Avifauna argentina. Hornero 9: 291-347.
Pinto, O. 1953. Sobre a coleçao Carlos Estevao de pieles, aves, ninhos e ovos das aves de Belém (Pará). Pap. Av. Depto. Zool. S. Paulo 11: 111-222.
Zuberbühler, E. 1956a. Un nido de Calandria en el suelo. Hornero 10: 175.
Zuberbühler, E. 1956b. Un nido de Misto construído sobre uno de Chingolo. Hornero 10: 175.

Hudson, G. E. 1974. Aves del Plata. Ed. Libros de Hispanoamérica. Buenos Aires.
Contino, F. 1975. Observaciones sobre la conducta de *Sappho sparganura* en el cerro de Santa Bárbara, Jujuy, Argentina. Hornero 11: 265-270.
Willianson, J. 1975. Alimentación de algunas aves de La Pampa. El Hornero 11(4): 322-324.
Narosky, S.1975. Notas caliológicas. Hornero 11: 285-290.
Grigera, D. E. 1976. Ecología alimentaria de cuatro especies de Fringillidae frecuentes en la zona del Nahuel Huapi. Physis Sec. C., 35 (91): 279-292. Buenos Aires.
Höy, G.1976a.Notas nidobiológicas del noreste argentino. Physis, Secc. C. 35 (90): 205-209.
Burger, J. 1976. House Sparrows usurp Hornero nests in Argentina.-The Wilson Bulletin. Vol. 88: 357-358.
Forter, M. S. 1976. Nesting biology of the Long-tailed Manakin. Wilson Bull. 88: 400-420.
Casañas, H. E.1977. Sobre la presencia de la Cachirla pálida *Anthus hellmayri* en la provincia de Córdoba, Argentina. Hornero 14: 270-273.
Klimaitis, J. F.1977c. Lista sistemática de aves del Partido de Berisso (Bs. As.) Parte II : Orden Passeriformes. Hornero 11: 404-409.
Contreras, J. R. y V. G. Roig. 1977a. Biota centro-andina. VI. Tres especies de aves nuevas para la provincia de Mendoza. Neotropica 23: 31-32.
Friedmann, H., L. F. Kiff y S. I. Rothstein. 1977. A further contribution to knowledge of the host relations of the parasitic cowbirds. Smiths. Contr. to Zoology Nº 235: 1-7
Daciuk, J. 1977c. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdéz y Patagonia XXI. Lista sistemática y comentarios de una colección ornitológica surcordillerana (Subregión Araucana, Prov. de Río Negro y Chubut, Argentina) Physis, Sec. C, 36 (92): 201-213, Buenos Aires.
Narosky, S. 1977. Una nueva especie del género *Sporophila* (Emberizidae). Hornero 11: 345-348.
Fraga, R. M. 1978. The Rufous-collared sparrow as host of the Shiny cowbird. Wilson Bull, 90 (1): 271-284
Gochfeld, M. 1978a. Ecological aspects of habitat selection by two sympatric Mockingbirds, *Mimus* spp., in patagonia. Ibis 120: 61-65.

Gochfeld, M. 1978b. Social facilitacion of singing: group size and flight song rates in the Pampas Meadowlarks. Ibis 120: 338-339.
Contreras, J. R. 1979f. Bird weights from northeastern Argentina. Bull. B.O.C. 99: 21-24.
Fraga, R. M. 1979c. Differences between nestlings and fledglings of Screaming and Bay-winged cowbirds. Wilson Bull, 91 (1): 151-154.
Fraga, R. M.1979b. Helpers at the nest in passerines from Buenos Aires Province, Argentina. Auk 96: 606-608.
Fraga, R. M.1979d. Parasitismo multiple del Renegrido, *Molothrus bonariensis*: azar, ayuda e Interferencia. Primer encuentro iberoamericano de ornitología y mundial sobre ecología y comportamiento de las Aves: 52. Buenos Aires.
Gochfeld, M. 1979a. Brood parasite an host coevolution: interactions between Shiny Cowbird and two species of Meadowlarks. American Naturalist, 113: 855-870.
Gochfeld, M. 1979b. Interspecific territoriality in Red Breasted Meadowlarks and a method for estimating the mutuality of their participation. Behavioral Ecology and Sociobiology 5: 159-170.
Nores, M. y D. Yzurieta.1979a. Especiación en las sierras pampeanas de Córdoba y San Luis (Argentina) con descripción de siete nuevas subespecies de aves. Hornero Nº Extraordinario: 88-102.
Olrog, C. C. 1979d. Notas ornitológicas del Noroeste argentino (Aves: Passeriformes). Neotrópica 25 (74): 125-126.
Contreras, J. R. 1980a. Algunos comentarios sobre las razas argentinas de *Saltator aurantiirostris* y la revalidación de *Saltator aurantiirostris tilcarae* Chapman, 1927 (Aves, Emberizidae). Historia Natural 1 (17): 113-120.
Contreras, J. R. 1980o. New data on Shiny cowbird parasitism (Molothrus bonariensis bonariensis : Aves, Icteridae). Historia Natural 1: 151-152.
Contreras, J. R.1980o. New data on Shiny cowbird parasitism (*Molothrus bonariensis bonariensis*: Aves, Icteridae). Historia Natural 1: 151-152.
Grigera, D. E.1982. Ecología alimentaria de algunas Passeriformes insectívoras frecuentes en los alrededores de S. C. de Bariloche. Ecologia 7: 67-84.
Fraga, R. M.1982. Host-brood parasite interaction between Chalk-browded Mockingbirds and Shiny Cowbirds. M. A. Thesis. Universidad de California, Santa Barbara. U.S.A.
Lucero, M. M. 1982. El anillado de aves en la República Argentina. Fundación Miguel Lillo. Miscelania 74: 1-35.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1982a. Nuevas localidades para aves Argentinas. Parte II. Historia Natural 2: 101-104.
De la Peña, M. R. 1983f. Notas nidobiológicas sobre Mistos y Diuca (Aves, Emberizidae). Tercera parte. Historia Natural 3 (4): 33-38.
Fraga, R. M.1983c. Parasitismo de cría del Renegrido, *Molothrus bonariensis* sobre el Chingolo, *Zonotrichia capensis*: nuevas observaciones y conclusiones. Hornero extraordinario: 245-255.
Lucero, M. M. 1983. Lista y distribución de aves y mamíferos de la provincia de Tucumán. Miscelánea Nº 75. Fund. M. Lillo. Tucumán. Págs. 61.
Martínez, M. M. 1983. Nidificación de *Hirundo rustica erythrogaster* (Boddaert) en la Argentina. (Aves, Hirundinidae). Neotrópica 19 (81): 83-86.
Contreras, J. R. 1983a. Notas sobre el peso de las aves argentinas. I. Historia Natural 3 (1): 16.
De la Peña, M. R. 1983a. Hábitos parasitarios de algunas especies de aves. Hornero extraordinario: 165-169.
Oniki, Y. y E. O. Willis. 1983a. Breeding records of birds from Manaus, Brazil: V. Icteridae to Fringillidae. Rev. Brasil. Biol. 43 (1): 55-64.
Salvador, S. A. 1983a. La avifauna en Villa María y sus alrededores. Escuela Normal " Víctor Mercante" . Inst. Sec. "Bernardino Rivadavia". Villa María, Córdoba. Argentina.
Salvador, S. A.1983b. Parasitismo de cría del Renegrido (*Molothrus Bonariensis*) en Villa María, Córdoba, Argentina (Aves: Icteridae). Historia Natural 3 (16): 149-158.
Narosky, S.1983b. Registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas. Hornero 12: 122-126.
Fraga, R. M.1984a. Bay-winged Cowbirds (*Molothrus badius*) Remove Ectoparasites from Their Brood Parasites, the Screaming Cowbirds (*M. rufoaxillaris*). Biotropica 16: 223-226.
Beltzer, A. H.1984a.Fidelidad y participación trófica de *Agelaius cyanopus cyanopus* (Aves, Icteridae) en ambientes del río Paraná medio (Argentina). Rev. Bol. Zool. (Brasil) 8:133-136.
Gelain, M. A. 1984a. La avifauna del Cerro Otto. Nuestras aves 3: 4-5.
Salvador, S. A.1984c. Estudio del parasitismo de cría del Renegrido (*Molothrus bonariensis*) en Calandria (*Mimus saturninus*), en Villa María, Córdoba. Hornero 12: 141-149.
Baliño. J. 1984. Aves del Parque Nacional El Palmar, lista sistemática y otras contribuciones a su conocimiento. Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. Zool. 13: 499-511.
De la Peña, M. R. 1984d. Descripción de nuevos nidos para la avifauna argentina. Historia Natural 4 (2): 19.
Fraga, R. M. 1985. Host-parasite interactions between Chalk-browed Mockingbids and Shiny Cowbirds. Pp. 829-844. Neotropical Ornithology. 36: 629-844.
Azategui, A. 1985. Algunos datos sobre el nido del Cardenal amarillo. Nuestras aves 6: 11-12.
Castelino, M. A. 1985a. Mirlo de agua en Jujuy. Nuestras Aves 8: 26.
Castelino, M. A.1985. El Nido del Tangara de antifaz *Pipraeidea melanonota* (Vieillot) (Aves: Thraupidae). Historia Natural 5 (22): 179-180.
Castelino, M. A.1985b. El Nido del Tangara de antifaz *Pipraeidea melanonota* (Vieillot) (Aves: Thraupidae). Historia Natural 5 (22): 179-180.

Klimaitis, J. F.1986c. Un nido dentro de una flor. Nuestras aves 11: 24-25.
Molli, A. F.1986. Nido de Anambé chico. Nuestras aves 11: 24.
Nores, M. 1986b. Nuevos registros para aves de Argentina. Hornero 12: 304-307.
Nores, M.1986a. Diez nuevas subespecies de aves provenientes de islas ecológicas argentinas. Hornero 12: 262-273.
Beltzer, A. H. 1986a. *Cacicus solitarius* hospedante de *Molothrus bonariensis bonariensis* (Aves: Icteridae). Rev. Asoc. Cs. Nat. Litoral 17: 215-216.
Darrieu, C. A.1986. Estudio sobre la avifauna de Corrientes III. Nuevos registros de aves Passeriformes (Dendrocolaptidae, Furnariidae, Formicaridae, Cotingidae y Pipridae) y consideraciones sobre su distribución geográfica. Historia Natural 6 (11): 93.-99.
Di Giacomo, A. G.1986a. Descripción de un nido de la Monterita castaña. Nuestras aves 10: 29-30.
Bremer, E. y P. Bremer.1987. En los alrededores de Punta Rasa. Nuestras Aves 12: 21.
Chebez, J. C. 1987f. Un caso de albinismo en Paroaria coronata . Nuestras aves 14: 13-14.
Lucero, M. M. 1987b. El anillado de aves en la República Argentina 1961-1986. Undécimo informe. Neotrópica 33 (90): 133-138.
Alabarce, E. A. 1987b. Notas sobre la biología de algunos Passeriformes del noreste argentino. Acta Zool. Lilloana 34: 23-27.
Klimaitis, J. F. y F. N. Moschione.1987a. Aves de la Reserva integral de selva marginal de Punta Lara y sus alrededores. Minist. Eco. Prov. Bs. Aires.
Foster, M. S. 1987. Feeding methods and efficiencies of selected frugivorous birds. Condor 89: 566-580.
Abadie, E. 1988. Observaciones sobre aves del sur de Entre Ríos. Nuestras Aves 15: 9-10.
Curtis, W. F. 1988. Highlights of a South Atlantic Tour-1986/87. Sea Swallow 37: 3-7.
Fraga, R. M. 1988. Nest sites and breeding success of Bay-winged Cowbirds (*Molothrus badius*) J. Ornithol. 129: 175-183.
De la Peña, M. R. 1988a. Albinismo en aves de Santa Fe. Nuestras aves 16: 16.
Salvador, S. A. 1988. Datos de peso de aves argentinas. Hornero 13: 78-83.
Straneck, R. 1990e. Canto de las aves de los esteros y palmares. L.O. L.A. Buenos Aires.
Straneck, R. 1990f. Canto de las aves del noroeste, selva y puna. L. O. L.A. Buenos Aires.
Castelino, M. A.1990. Un ave nueva para la República Argentina y segunda mención para otra. Nótulas Faunísticas 21: 1-2.
Parera, A. 1990a. Zorzalito migrador (*Catharus ustulatus*) en Entre Ríos. Nuestras Aves 22: 31.
Salvador, S. A. 1990a. Datos de peso de aves argentinas. 2. Hornero 13: 169-171.
Straneck, R. 1990a. Canto de las aves patagónicas. Mar-Meseta-Bosques. L.O.L.A. Buenos Aires.
Foster, M. S. 1990. Factors influencing bird foraging preferentes hamong conspecific fruit trees. Condor 92: 844-854.
Beltzer, A. H. 1990d.Biología alimentaria del Verdón común *Embernagra platensis platensis* (Aves: Emberizidae) en el valle aluvial del río Paraná medio, Argentina. Ornitología Neotropical 1: 25-30.
Straneck, R. 1990d. Canto de las aves de las serranías centrales. L.O. L.A. Buenos Aires.
Fraga, R. M.1991. The social sydtem of a Communal Breeder, the Bay-winged Cowbird *Molothrus badius* . Ethology 89: 195-210.
Canevari, M., R. Chiesa y G. Lingua. 1991a. Informe de campaña de trabajo Meseta de Somuncurá. FVSA, 31 p.
Fernández, H.1991a. Nuevas aves para la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 24: 26.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1991a. Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina. IV. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Tomo 15 (8): 95-105.
dos Anjos, L. 1991. O ciclo anual de *Cyanocorax caeruleus* em floresta de araucária (Passeriformes: Corvidae). Ararajuba 2: 19-23.
Casas, A. E.1992a. La avifauna de las lagunas Cari Laufquén Chica y Cari Laufquén Grande, departamento 25 de Mayo, Río Negro. Hornero 13: 248-252.
Utges, E. E. 1992. Crianza invernal del Chingolo (*Zonotrichia capensis*). Nuestras aves 27: 35.
Fraga, R. M. 1992. Biparental care in Bay-winge Cowbirds *Molothrus badius*. Ardea 80: 389-393.
Nores, M. 1992. Bird speciation in subtropical South America in relation to forest expansion and retraction. The Auk 109 (2): 346-357.
Camperi, A. R.1992a. Estudio de una colección de aves de la provincia de Entre Ríos. Hornero 13: 225-228.
Marone, L. 1992a. Estatus de residencia y categorización trófica de las especies de aves en la Reserva de la Biosfera de Ñacuñan, Mendoza. El Hornero 13: 207-210.
Marone, L.1992a. Estatus de residencia y categorización trófica de las especies de aves en la Reserva de la Biosfera de Ñacuñan, Mendoza. El Hornero 13: 207-210.
López, H. E.1993b. Algunas observaciones en Villa Gesell, Buenos Aires. Nuestras Aves 29: 30.
Klimaitis, J. F. 1993. Contenido estomacal de algunas aves. Publicación Nº 3. Municipalidad de Berisso.
Vuilleumier, F.1993b. Field study of allopatry, sympatry, parapatry, and reproductive isolation in steppe birds of patagonia. Ornitología neotropical 4 (1): 1-41.
Nellar Ramonella, M. M. 1993. Aves de la provincia de San Luis. Lista y distribución. Ed. Mus. Priv. Cienc. Nat. e Inv. Ornit. "G. E. Hudson". San Luis. Págs. 98.
Herrera, G. A. 1993a. Albinismo en un ejemplar de Saira dorada (*Hemithraupis guira*). Nuestras aves 28: 29.
Montaldo, N. H. 1993a. Dispersión por aves y éxito reproductivo de dos especies de *Ligustrum* (Oleaceae)

de un relicto de selva subtropical en la Argentina. Rev. Chilena de Hist. Nat. 66: 75-85.
Darrieu, C. A. 1994. Dos nuevos registros para la avifauna pampeana: *Tersina viridis viridis* (Emberizidae: Thraupinae) y *Columbina talpacoti talpacoti* (Columbidae). Neotrópica, 40: 56.
De la Peña, M. R. 1994a. Observaciones acerca de agregaciones multiespecíficas de aves en la provincia de Santa Fe, República Argentina. Nótulas Faunísticas 54: 1-5.
Fiameni, M. A.1994. Aves del Partido de Necochea. La Plata. Bs. As. Pág. 1-39.
Tyler, S. J. 1994. The yungas of Argentina : in search of Rufous-throated Dippers *Cinclus schultzi*. Cotinga 2: 38-40.
Blanco, D. E.1995. Parasitismo de cría del Tordo renegrido *Molothrus bonariensis* sobre *Agelaius ruficapillus*, en el este de la provincia de Buenos Aires. Hornero 14: 44-45.
Vidoz, F.1995. Lista de aves Parque Nacional Lago Puelo, Chubut, Argentina (Foll. del PN. Puelo)
Fraga, R. M.1995. Egg size variation in *Molothrus bonariensis*. V Cong. Ornit. Neotropical: 91. Asunción. Paraguay.
Herrera, G. A. 1995. Nueva observación del Pájaro campana en Misiones. Nuestras Aves 31: 19-20.
Mermoz, M. E. y J. C. Reboreda1995a. Nuevo hospedador efectivo de *Molothrus rufoaxillaris* . V Cong. Ornit. Neotropical : 91. Asunción. Paraguay.
Sosa, H. J. 1995d. Actualización de la lista de avifauna de la Reserva Provincial Laguna Llancanelo, Malargüe, Mendoza. Presencia estacional, referencias de hábitat y nidificación. Multequina 4: 65-75.
Yzurieta, D.1995. Manual de reconocimiento y evaluación ecológica de las aves de Córdoba. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables. Córdoba.
Zimmermann, C. E. 1996. Observacoes preliminaries sobre a frugivoria por aves em *Alchonea glandulosa* (Ende. & Poepp.) (Euphorbiaceae) em vegetacao secundaria. Revista Bras. Zool. 13 (3): 533-538.
Fraga, R. M. 1996b. Parasitismo del Tordo gigante *Scaphidura oryzivo*ra aobre el Boyero Cacicus haemorrhous: datos preliminares. IX RAO: 21. Buenos Aires.
Fraga, R. M.1996a. Further evidence of parasitism of Chopi blackbirds (*Gnorimopsar chopi*) by the specialized Screaming Cowbird (*Molothrus rufoaxillaris*). Condor 98: 866-867.
Nores, M.1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. Fauna 1: 255-337.
Chebez, J. C.1996a. Fauna misionera, catálogo sistemático y zoogeográfico de los vertebrados de la provincia de Misiones (Argentina). Monografía Nº 5. Págs. 320. L. O. L. A. Buenos Aires.
Ragusa-Netto, J. 1996. Nesting development, size and juvenile survival *Donacobius atricapillus* (Passeriformes: Troglodytidae). Ararajuba 4: 81-85.
Lyon, B. E. 1997. Spatial patterns of Shiny Cowbird brood parasitisn on Chestnut-capped Blackbirds. Anim. Behav. 54: 927-939.
Vuilleumier, F. 1997a. Status and distribución of *Astnenes anthoides* (Furnariidae), a species endemic to Fuego-Patagonia, with notes on its systematic relationships and conservation. Ornithological Monographs, 48: 791-808.
Martínez, M. M., C. A. Darrieu y G. E. Soave.1997a. The avifauna of Laguna Llancanelo (Mendoza, Argentina), a South American Wetland of internacional importante. Freshwater Forum. Volumen 9: 35-45.
Pizo, M. A. 1997. Seed dispersal and predation in two populations of *Cabralea canjerana* (Meliaceae) in the Atlantic forest of southeastern Brazil. Journal of Tropical Ecology 13: 559-578.
Pizo, M.A. 1997. Seed dispersal and predation in two populations of *Cabralea canjerana* (Meliaceae) in the Atlantic Forest of southeastern Brazil. J.of Tropical Ecology 13: 559-578.
Willis, E. O. y A. Bosso. 1997. A nest of the Cream-Bellied Gnatcatcher, *Polioptila lactea*. Ornitología Neotropical 8: 75-76.
Peris, S. J.1997. Notes on the breeding biology and population density of the Tucuman mountain- Finch (*Poospiza baeri*, Aves: Emberizidae) in Argentina, with description of nest and eggs. Rev. Chilena de Hist. Nat. 70: 221-224.
Paz Barreto, D. 1997b. Aves de la Provincia de Río Negro. II Localidades confirmadas. Consejo de Ecología y Medio Ambiente, Delegación Bariloche. Pp. 1-24.
Fraga, R. M. 1998b. Interractions of the parasitic Screaming and Shiny Cowbirds (Molothrus rufoaxillaris and M. bonariensis) with a shared host, the Bay-winged Cowbirds (M. badius). Pp. 173-193. In Rothstein, S.I. and S.K Robinson (eds.). Parasic birds and their hosts: studies and coevolution. Oxford University Press. Oxford, UK.
Peltzer, P. M.1998. Inventario de flora y fauna del área natural protegida: islote municipal del valle aluvial del Paraná. Natura Neotropicalis 29: 74-78.
Di Giacomo, A. G.1998a. Descripción del nido y huevos de *Emberizoides ypiranganus* y presencia de la especie en Formosa, Argentina. Hornero 15: 51-52.
Straneck, R. J.1999a. Nuevas localidades para Aves de la Argentina. Rev. Mus.Argentino Cienc. Nat, n.s. 1(2): 173-180.
Acerbo, P. E. 2000. Aves del río Neuquén. Autoridad interjurisdiccional de Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. 180 p.
Cueto, V. R. y J. López de Casenave. 2000a. Bird assemblages of protected and exploited coastal woodlands in east-central Argentina. Wilson Bull. 112 (3): 395-402.
Earnshaw, A. y N. Earnshaw. 2000a. Lista de aves avistadas en el safari NOA. www.geicities.com/viajesnat/Calilegua/Lista.htm

Fraga, R. M. 2001b. The avifauna of Estancia San Juan Poriahú, Iberá marshes, Argentina : check-list and some natural history notes. Cotinga 16: 81-86.
Pearman, M.2001. Notes and range extensión of some poorly known birds of northen Argentina. Cotinga 16: 76-80.
Darrieu, C. A. y A. R. Camperi.2001a. Nueva lista de las aves de la provincia de Buenos Aires. Cobiobo Nº 3-Probiota Nº 2. Sec. de Política Ambiental. UNLP. Buenos Aires.
De la Peña, M. R. 2001a. Nidificación de algunas especies de aves en el este de la provincia de Catamarca, Argentina. Hornero 16 (1): 17-21.
Fiameni, M. A.2001. Nuevos registros de nidificación de la Golondrina tijerita (*Hirundo rustica*) en la Argentina. Nuestras Aves 42: 13.
Gelain, M. A. 2001. Lista sistemática de las aves del Municipio de San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. Ed. Grupo Naturalista Sur Patagonia.
Muzzachiodi, N. 2001a. Avifauna de la reserva natural de fauna y flora "Parque Muttio", Paraná, E. Ríos. Natura Neotropicalis 32 (1): 59-64.
Roesler, I. 2001a. Nuevas citas de aves para al partido de General Villegas, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 41: 32-33.
López de Casenave, J. 2001. Estructura gremial y organización de un ensamble de aves del Desierto del monte. Tesis doctoral. Iniv. de B. Aires. B. Aires.
De la Peña, M. R. 2001d. Observaciones de campo en la alimentación de las aves. Rev. FAVE. Vol. 15 N° 1: 99-107.
Döke, J. D.2001. Viuva (*Pipraeidea melanonota*) en Necochea, Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 41: 34.
Fraga, R. M.2002. Notes on new or rarely reported Shiny Cowbird hosts from Argentina. J. Field ornithol. 73: 213-219.
Kirwan, G. M. 2002. Nuevos registros de Garza azul (*Egretta caerulea*) y Golondrina zapadora (*Riparia riparia*) en el sur argentino. Nuestras Aves 44: 11.
De la Peña, M. R.2002a. Observaciones sobre la reproducción de las aves en cajas-nidos, en la Reserva de la escuela Granja (UNL), Esperanza, Argentina. Rev. FAVE. Cienc. Vet. 1 (1): 79-82.
Pautasso, A. A. 2002a. Nuevos registros para aves poco citadas en Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 43: 19-21.
Pautasso, A. A. 2002b. Aves de la Reserva Urbana de la Ciudad Universitaria UNL "El Pozo", Santa Fe.
Savigny, C.2002d. Registros de aves nuevas o poco comunes para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 43: 24-25.
Astié, A. A. 2003. New record of Shiny Cowbird (*Molothrus bonariensis*) parasitism Black-chinned Siskins (*Carduelis barbata*). Wilson Bulletin, 115: 212-213.
Bodrati, A.2003. Predación de Dendrocoláptidos sobre murciélagos, pichones y huevos de aves, y aspectos de la nidificación del Trepador gigante (*Xiphocolaptes major*). Nuestras aves 46: 45-47.
De la Peña, M. R. 2003a. Nidificación simultánea de siete especies de aves (Passeriformes) en un bosque del centro de la provincia de Santa Fe. Revista FAVE. Cias. Veterinarias 2 (1): 41-47.
De la Peña, M. R., P. M. Beldoménico y L. R. Antoniazzi. 2003a. Pichones de aves parasitados por larvas de *Philornis* (Diptera: Muscidae) en un sector de la provincia biogeográfica del de Santa Fe, Argentina. Revista FAVE. Ciencias Veterinarias 2 (2): 141-146.
Sackmann, P. y J. C. Reboreda. 2003. A comparative studie of Shiny Cowbird parasitism in two large hosts: Clark-browed Mockingbird and Rufous-bellied Thrush. Condor, 105: 728-736.
Sackmann, P. y J. C. Reboreda. 2003. A comparative studie of Shiny Cowbird parasitism in two large hosts: Clark-browed Mockingbird and Rufous-bellied Thrush. Condor, 105: 728-736.
Imberti, S.2003. Notes on the distribution and natural history of some birds in Santa Cruz and Tierra del Fuego provinces, Patagonia, Argentina. Cotinga 19: 15-24.
Leveau, L. M. y C. M. Leveau. 2004a. Comunidades de aves en un gradiente urbano de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Hornero 19 (1): 13-21.
Trejo, A. 2004. Una observación de imitación vocal en la Ratona común (*Troglodytes aedon*) en el noroeste de la patagonia argentina. Nuestras Aves 48: 16-17.
Tyler, S. J. 2004. Family Motacillidae (Pipits and Wagtails). Pp. 686-786 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.9. Cotingas to Pipits and Wagtails. Lynx Edicions, Barcelona.
Gorgoglione, C. E. 2005. Guía de campo para la identificación de las aves del Neuquén. Edición del autor. 3º Edición. Junín de los Andes. 279 p.
Fraga, R. M. 2005c. The Brown-Backed Mockingbird (Mimus dorsalis) as a Shiny Coebird (Molothrus bonariensis) host. Ornitología Neotropical 16: 435-436.
Fraga, R. M.2005b. Ecology, behavior and social organization of Saffron-cowled Black birds (Xantopsar flavus). nit. Neotropical 16: 15-29.
Capllonch, P., Lobo, R., Ortiz, D. y R. Ovejero. 2005a. La avifauna de la selva de galería en el noreste de Corrientes, Argentina: Biodiversidad, patrones distribución y migración. Insugeo, Miscelánea, 14: 483-498.
Chatellenaz, M. L. 2005a. Aves del Valle del Río Paraná en la Provincia del Chaco, Argentina : riqueza, historia natural y conservación. Insugeo, Miscelánea 14: 527-550.
De la Peña, M. R. 2005a. Biología reproductiva de la Tacuarita azul, *Polioptila dumicola* en la Reserva de la Escuela Granja (UNL). Esperanza, Santa Fe, Argentina. Rev. FAVE. Ciencias Veterinarias 4 (1 y 2): 61-70.
Fiorini, V. D., A. A. Astié, D. T. Tuero y J. C. Reboreda. 2005a. Éxito reproductivo del Tordo renegrido (*Molothrus bonariensis*) en hospedadores de distinto tamaño corporal. Hornero 20 (2): 173-182.

Santos, M. M., M. Juarez, N. R. Coria y D. Montalti. 2005a. Primer registro del Zorzal patagónico *Turdus falcklandii* en la Antártida. XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes : 152. Buenos Aires.

Savigny, C., J. P. Isacch y M. Favero. 2005a. Reserva de Biosfera de Mar Chiquita. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 49-50. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.

Collar, N. J. 2005. Family Turdidae (Thrushes). Pp. 514-807 en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.10. Cuckoo-shrikes to Thrushes. Lynx Edicions, Barcelona.

Imberti, S.2005e. Aves de Los Glaciares. Inventario Ornitológico del Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Aves Argentinas y Administración de Parques Nacionales. 80 pp.

Cano, P. D. 2005. Albinismo en un ejemplar de Celestino común (*Thraupis sayaca*). Nuestras Aves 49: 32.

Pessino, M. E. M. 2006. Nuevo registro y descripción de híbridos entre Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) y Diuca común (*Diuca diuca*) en la provincia de La Pampa, Argentina. Nuestras Aves 52: 16-18.

Bodrati, A. 2006b. El árbol frutal de la selva misionera, Yabotikaba. Naturaleza y Conservación. 18: 10-15.

Bodrati, A. y K. Cockle. 2006a. Habitat, distribución and conservation of Atlantic Forest birds in Argentina : notes on nine rareor threatenes species. Ornitología Neotropical 17: 243-258.

Maugeri, F. G.2006a. Ampliación del rango de distribución y descripción de aspectos reproductivos de cuatro especies de aves en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Cotinga 25: 43-46.

Pautasso, A. A. 2006b. Notas sobre la nidificación del Arañero cara negra (*Geothlypis aequinoctialis*) en el este de Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 52: 11-13.

Heredia, J. 2006. Aves de las Sierras de Córdoba. Guía de campo. 50 p. La Falda. Córdoba.

De la Peña, M. R. 2006d. Observaciones de campo en la forma de capturar el alimento por algunas aves. Rev. FAVE. Ciencias Veterinarias 5 (1 y 2): 25-35

Matarasso, H. F. 2007. Checklist. Aves del Neuquén.

Capllonch, P.2007a. Aves de Tafí del Valle. Tucumán. Argentina.

Gelaín, M. A. 2007b. Reserva Municipal Isla Huemul. Departamento Bariloche, Río Negro, Argentina. Relevamiento ornitológico. I. Xolmis Nº 2: 26-28.

Ortiz, D. y P. Capllonch. 2007a. Distribución y migración de *Sporophila c. caerulescens* en Sudamérica. Rev. Brasileira de Ornitología 15: 377-385.

Jensen, R. F. 2008. Nuevos registros de Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) para el sureste de la provincia de Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 53:22.

Fraga, R. M. 2008a. Invalid specimen record of Saffron-cowled Blackbird Xanthopsar flavus from Argentina y Paraguay. Bull. B.O.C. 128 (1): 36-37.

Fraga, R. M. 2008b. Notes on the nesting of Chopi Blackbirds (Gnorimopsar chopi) in Argentina and Paraguay. Whith data on cooperative breeding and Broad parasitismo by Screaming Cowbirds (Molothrus rufoaxillaris). Ornitología Neotropical 19: 299-304.

Capllonch, P., D. Ortiz y K. Soria. 2008a. Importancia del litoral fluvial argentino como corredor migratorio de aves. Insugeo, Miscelánea, 17: 107-120.

Cockle, K., C. Maders, G. Di Santo y A. Bodrati. 2008a. The Black-capped Piprites *Piprites pileata* build a spherical moss nest. Cotinga 29: 166-168.

Gelain, M. A. 2008a. Presencia de *Parabuteo unicinctus unicinctus* (Temminck, 1824) (Aves: Accipitridae) en la provincia de San Juan, Argentina. Xolmis Nº 3: 42-45.

Ortiz, D. 2008. Distribución histórica y actual del Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) en el litoral fluvial argentino. Insugeo, Miscelánea, 17: 121-126.

White, E. 2009. El Bailarín naranja. Aves Argentinas. Rev. de Naturaleza y Conservación. Nº 26: 9-11.

Astié, A. A. y J. C. Reboreda. 2009a. Shiny Cowbird parasitism of a low quality host: effect of host traits on a parasite´s reproductive success. Journal of Field Ornithology, 90 (3): 224-233.

Di Giacomo, A. y J. C. Reboreda. 2009a. Éxito reproductivo del Tordo pico corto (*Molothrus rufoaxillaris*) en nidos de un hospedador alternativo el Chopi (*Gnorimopsar chopi*). 2009. XIII RAO: 88.Tafí del Valle, Tucumán.

Manassero, M. y H. Luna. 2009a. Aves de la cuña boscosa. Estancia La Isabel y los bosques mixtos de Santa Fe (Aica SF 01). Biológica. 10: 28-32.

Morici, A. 2009c. Nidificación de la Golondrina tijerita (*Hirundo rustica*) en el partido de Puán, Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 54: 35-36.

Sosa, H. J. 2009a. Avifauna mendocina. Nuevas citas para la provincia de Mendoza de Rara *Phytotoma rara* (Aves: Phytotomidae). Xolmis 4: 26.

Brewer, D. 2009. Cobb´s Wren *Troglodytes cobbi* foraging in penguin burrows. Cotinga 31 OL : 88.

Rizzo, F. 2010. Utilización de nidos de Hornero (*Furnarius rufus*) por el Estornino pinto (*Sturno vulgaris*). Nuestras Aves 55: 33-35.

Curson, J. M. 2010. Family Parulidae (New World Warblers). Pp. 666-800 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 15. Weavers to New World Warblers. Lynx Edicions, Barcelona.

De Mársico, M. C., B. Mahler y J. C. Reboreda. 2010a. Reproductive success and nestling growth of Bay-winged cowbirds parasitized by Screaming and Shiny Cowbirds. Wilson Bulletin, 122: 417-431.

Gelain, M. A. 2010. Aves de la patagonia argentina: atlas ornitológico de Río Negro. San Juan.

La Grotteria, J. 2010. Primer registro de Estornino crestado (*Acridotheres cristatellus*) en la Reserva Natural Estricta, Silvestre y Educativa Otamendi. Ecoregistros. Revista Nº1 Artículo Nº 1: 1.

De la Peña, M. R. 2011e. Diccionario de nombres vulgares de las aves de Argentina. Ed. Biológica. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad. Nº 1. Santa Fe, Argentina, 100 pp.

De la Peña, M. R. 2011f. Atlas ornitogeográfico de la provincia de Santa Fe. Serie Naturaleza y Conservación Nº 4. Pág. 1-500.

Fraga, R. M. 2011a. Giant cowbird (Molothrus oryzivorus) parasitism of Red-rumped caciques (Cacicus haemorrhous) in the Atlantic forest, northeastern Argentina. The Wilson Journal of Ornithology 123: 277-282.

Fraga, R. M. 2011b.Variable Oriole (Icterus pyrrhopterus) breeding in abandoned mests of Red-rumped caciques (Cacicus haemorrhous) in Misiones, Argentina. Ornitología Neotropical 22: 313-315.

Fraga, R. M. 2011c. Family Icteridae (New World Blackbirds) Pp. 684-807 en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 16. Tanager to New world Blackbirds. Lynx Edicions, Barcelona.

Areta, J. I. y M. Repenning. 2011a. Systematics of the Tawny-Bellied Seedeater (*Sporophila hypoxantha*). I. Geographic variation, ecology, and evolution of vocalizations. Condor 113: 664-677.

Cormenzana Méndez, A. 2011. Estudios sobre la avifauna de Maimará, provincial de Jujuy, Argentina. Tesina de grado de la Licenciatura de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Tucumán, 67 pp.

Darrieu, C. A., A. R. Camperi, J. J. Maceda y F. Bruno. 2011a. Avifauna de la provincia de La Pampa, Argentina: lista de especies Passeriformes. Acta Zoologica Lilloana. 55: 187-228.

De la Peña, M. R. 2011a. Observaciones de campo en la alimentación de las aves. Biológica. Naturaleza, Conservación & Sociedad. Edición Especial. Nº 13.

Gómez, A. R. 2011a. Registros de Estornino crestado (*Acridotheres cristatellus*) en la ciudad de Córdoba. Ecoregistros 1, artículo Nº 14: 1-5.

Luna, H., M. Manassero y P. Krug. 2011a. Registros de Capuchino castaño (*Sporophila hypochroma*) y Capuchino corona gris (*Sporophila cinnamomea*) en Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 56: 3-5.

Mancini, J. A. 2011. Inventario de las aves del Parque Escolar Rural Enrique Berduc. Entre Ríos.

Martín, S., C. Robledo y H. Sosa. 2011a. Evaluación sobre la situación poblacional del pepitero de collar o "Siete cuchillos" (Saltador aurantiirostris nasica) en la reserva natural Villavicencio, Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 64: 1-6.

Martín, S., C. Robledo, H. Sosa y A. Zarco. 2011a. ¿Varía la estructura poblacional del Pepitero de collar (Saltator aurantiirostris) en un sitio donde se captura la especie? IX Congreso de Ornitología Neotropical, VIII Congreso Peruano de Ornitología, Libro de resúmenes, 527-528.

Morici, A. 2011. Simpatría de tres subespecies del género *Zonotrichia* en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 61: 1-3.

Pautasso, A. A. 2011. La fauna y su conservación en los Bajos Submeridionales. Ediciones Biológica. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad Nº 5. Santa Fe, Argentina, 278 pp.

Salvador, S. A. 2011c. Parasitismo de cría del renegrido (*Molothrus bonariensis*) en el departamento Gral. San Martín, Córdoba, Argentina. Biológica 14: 49-51.

Rising, J. D. 2011. Family Emberizidae (Bunting and New World Sparrows) Pp. 428-683 in: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 16. Tanager to New World Blackbirds. Lynx Edicions, Barcelona.

Lucero, F. 2012f. Nuevos aportes al conocimiento de la distribución de las aves en la provincial de La Rioja, Argentina. Nótulas Faunísticas 112: 1-6.

Lucero, F. 2012g. Primer registro de la Rara (*Phytotoma rara*) para la provincial de San Juan. Nótulas Faunísticas 109: 1-3.

Lucero, F. 2012h. Nuevos registros y distribución de aves par alas provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja. Parte II. Nótulas Faunísticas. Seguda Serie 97: 1-10.

Pérez, M. 2012. Primeros registros del Frutero cabeza negra (Nemosia pileata) para la provincial de Mendoza, Argentina. Ecoregistros Revista Nº 2. Artículo Nº 10: 1-4.

Cockle, K., K. Martin y G. Robledo. 2012a. Linking fungi, tres and hole-using birds in a Neotropical tree-cavity network: Pathways of cavity production and implications for consrvation. Forest Ecology and Management 264: 210-219.

Gelain, M. A. 2012b. Aves: Provincia de Río Negro, Argentina. Aves de Carri-Laufquen y adyacencias. II. Lista comentada. Xolmis CRO 14: 1-35.

Morici, A. 2012a. Primeros registros de nidificación de la Golondrina tijerita (*Hirundo rustica*) en la provincial de La Pampa, Argentina. Nótulas Faunísticas 96: 1-7.

Morici, A. 2012b. Las aves del área Natural Protegida "Dique Roggero" (Buenos Aires, Argentina). Biológica 15: 24-36.

Salvador, S. A. 2012c. Reutilización de nidos por aves en el área central de Córdoba, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 91: 1-9.

Salvador, S. A. 2012f. Víctimas del Tordo renegrido (*Molothrus bonariensis bonariensis*) en la República Argentina. Historia Natural. Tercera Serie. Vol. 2 (1): 117-138.

Segura, L. N. y J. C. Reboreda. 2012a. Nets survival rates of Red-crested Cardinals increase with nest age in south-temperata forests of Argentina. J. Field Ornithol. 83(4):343–350

Rodríguez, E. D. 2012a. Avistaje de Estornino crestado en Salta. Diario Punto Uno.

Rodríguez, E. D. 2012b. Aves del Cerro San Bernardo y de las Serranías del Este de la Ciudad de Salta. 1º ed. Salta: Fondo Editorial Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta.

Lucero, F. 2013f. Listado de las aves observadas en la Reserva Natural Municipal Articulada: Laguna Guanacache, Laguna del Toro y Bañados del Carau, provincia de San Juan y Laguna Seca y los Bañados del Tulumaya, provincia de Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 137: 1-16.

Lucero, F. 2013g. Nuevas aves, primeras evidencias y localidades para las provincias de San Juan y Catamarca. Ecoregistros Revista, 3 (14): 52-63.

Lucero, F. 2013i. Aves de Sarmiento, provincia de San Juan. Edición del autor. 1ª Ed., Cienaguita, 334 págs.

Zanotti, M. 2013. Presencia del Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*)en la provincia de Mendoza, Argentina. Nuestras aves 58: 5-7.

De la Peña, M. R. 2013a. Citas, observaciones y distribución de aves argentinas. Edición ampliada. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad Nº 7. Ediciones Biológica. Santa Fe, 786 pp.

Gelain, M. A. 2013e. Registro del Boyerito *Icterus cayanensis* en el centro norte de la provincia de San Juan, República Argentina. Xolmis 31: 1-2.

Gelain, M. A. 2013g. El Verdón, *Embernagra platensis* (Gmelin, 1789)en el centro de la provincia de San Juan, República Argentina (Aves: Emberizidae). Xolmis 34: 1-3.

Salvador, S. A. 2013e. Hormigas Isaú (*Atta vollenweideri*)en la alimentación de algunas aves de Villa María, Córdoba, Argentina. Nuestras aves 58: 63-64.

Salvador, S. A. 2013f. Biología del Cortarramas (*Phytotoma r. rutila*)en el departamento Gral. San Martín, Córdoba, Argentina. Nuestras aves 58: 30-32.

Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2013a. Aves víctimas del parasitismo de moscas del género *Philornis* en Argentina. Nuestras aves 58: 16-21.

La Grotteria, J. 2013. *Sporophila "uruguaya*" en Entre Ríos, Argentina. Nuestras aves 58: 34-35.

Villegas, F. 2014. El Fueguero oscuro (*Ramphocelus carbo*) en la costa de río Uruguay, Misiones, Argentina. Ecoregistros Revista, 4(5): 11-13.

Bianchini, M. 2014b. Primer registro de predación de vertebrado por la loica común (Sturn*ella loyca*: Passeriformes: Icteridae) en la Argentina. Acta zoológica lilloana 58 (2): 256–259.

Gelain, M. A. 2014a. Lista preliminar de aves del departamento Angaco, provincia de San Juan, República Argentina. Xolmis 35: 1-27.

Gelain, M. A. 2014h. Cabecita negra austral *Sporagra barbata* (Molina, 1782) en la Reserva Laguna del Diamante, Mendoza. (Aves: Familia Fringillidae). Xolmis CRO, 43: 1-3.

Morici, A. 2014. Composición de las bandadas invernales mixtas en un sector del sudeste bonaerense. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie, 142: 1-7.

Salvador, S. A. 2014a. Peso de las aves del Departamento General San Martín, Córdoba, Argentina.Biológica17: 48-57.

Salvador, S. A. 2014b. Nidos abandonados: utilización para criar por aves en Argentina.Biológica17: 5-19.

Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2014a. Actualización de las víctimas de parasitismo del Tordo Renegrido (*Molothrus bonariensis bonariensis*) en la República Argentina. Biológica 17: 23-35.

Segura, L. N., N. Bogado, C. A. Darrieu y D. Montalti. 2014a. La colección de huevos "Pablo Girard" del Museo de La Plata. Probiotica. FCN y M, UNLP, La Plata, Argentina, Serie Técnica y Didáctica 27: 1-14.

Yngelmo, J. J. 2014. Primer registro de Zorzalito boreal (*Catharus ustulatus*) en la provincia de Santa Fe, Argentina. Ecoregistros.com.ar, 4 (3): 6-8.

Sainz-Trápaga, S. 2014. Aves del noreste de Chubut. Paragonia Argentina. Trelew. Pp.90.

Rodríguez, E. D. 2014b. Observaciones sobre la reproducción, alimentación y coloración del Pepitero colorado (*Saltator rufiventris*). Nuestras Aves 59: 58-60.

Lucero, F. e Izasa, F. 2015. Primeros registros, nuevas localidades, observación de aves con documentación escasa y evidencias de nidificación para las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán, Argentina. EcoRegistros Revista, 5(8): 18-48.

Piantanida, F. 2015b. Aberración cromática en Misto (*Sicalis luteola*) en la Reserva Natural Laguna Chasicó, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 60:83-84.

Bodrati, A. y Salvador, S. A. 2015a. Termitas (Isoptera, Blattodea, Insecta) en la dieta de las aves argentinas. Historia Natural. Tercera Serie Volumen 5 (1): 77-89.

Gelain, M. A. 2015f. Nuevo registro de Pecho colorado en la provincia de San Juan, República Argentina. Xolmis CRO, 50: 1-3.

Salvador, S. A. 2015. Reproducción de aves andinas del noroeste argentino. Historia Natural. Tercera Serie Volumen 5 (1): 49-76.

La Grottería, J. 2015. Reproducción del Capuchino canela (*Sporophila hypoxantha*) morfo "uruguaya" en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 60: 11-12.

Morici, A. 1990a. Aves depredadas por *Tyto alba tuidara* – 1- en San Miguel, Partido de General Sarmiento, Prov. de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 17: 5-8.

Morici, A. 1990b. Aves depredadas por *Tyto alba tuidara* – 2- en Desaguadero, departamento Capital, Provincia de Corrientes. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 18: 18-19.

Murphy, R. C. 1923. Notes sur *Anthus antarcticus*. Hornero 3: 56-59.

Navas, J. R. 1963. Dos aves nuevas para el Chaco. Neotrópica 9: 115-116.

Höy, G.1969a. Addendas a la avifauna salteña. Hornero 11: 53-56.